# Beschreibung und Einteilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung im Mineralogischen Museum zu Berlin.

## Von Gustav Rose.

Auf den Abhandlungen der Königliche Akademie der Wiffenschaften zu Berlin 1863. Mit vier Kupfertafeln.

Verlin. 1864. In Rommission bei F. Dümmlers Verlags-Vuchhandlung Harrvitz und Gossmann.

Internet Archive Online Edition Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

## Inhaltsverzeichnis

1	Eisenn	neteorit.	12
	1.1	Meteoreisen	29
	1.2	Pallafit.	71
	1.3	Mefofiberit	32
2	Stein	meteorit. 8	37
	2.1	Chondrit	37
	2.2	Sowardit	19
	2.3	Chaffignit	28
	2.4	Chladnit	32
	2.5	<b>Shalfit.</b>	c
	2.6	Die Kohligen Meteorit	ŀ5
	2.7	Eufrit	16
3	Shlu	sibemertungen.	52
4	Nacht	rag. 17	77
	4.1	Übersicht der Meteoriten in dem mineralogischen Museum von Berlin 18	4
5	Erfläi	rung der Rupfertafeln.	)5
	5.1	<b>Eafel</b> 1	)5
	5.2	<b>Eafel 2</b>	7
	5.3	<b>Eafel 3</b>	8
	5.4	<b>Eafel 4</b>	C
6	ગ્રીકોલેનો	oungen 20	<u></u>

Geschichte der Meteoritensammlung in dem misneralogischen Museum von Berlin auf Grund deren die neue Einteilung der Meteoriten gesmacht ist.

Die Meteoritensammlung macht einen besonderen Teil des mis neralogischen Museums der Berliner Universität aus. Als bei der Gründung der Universität im Jahre 1810 auch das mineralogische Museum durch übernahme der Mineraliensammlung der früheren General-Bergbau-Direktion gegründet wurde, waren die wenigen Meteoriten, die sich in derselben befanden, noch nicht getrennt und mit den übrigen Mineralien vereinigt. Wie viele Meteoriten sich schon damals in ihr befanden, lässt sich nicht angeben, da darüber die Nachweisungen sehlen, indessen enthielt sie doch schon manche kostbare Stücke, wie ein großes prachtvolles Exemplar von dem Pallas-Eisen, das in einer Sammlung Aussischer Mineralien ents halten war, die Raiser Alexander 1 dem Könige Friedrich Wilhelm 3 im Jahre 1803 zum Geschenk gemacht hatte, so wie ein großes Stück von dem Durango-Eisen, welches Al. von Humboldt auf Meriko mitgebracht und dem damaligen Direktor Dietrich Karsken für die Sammlung übergeben hatte. Weiß, der nach Karstens Tode Direktor des mineralogischen Museums wurde, hatte ein großes Interesse für die Meteoriten und ließ keine Gelegenheit vorübergehen, die sich ihm zur Erwerbung von Meteoriten darbot, doch fand sich dieselbe im Anfang, wo das Interesse für die Meteoriten überhaupt noch nicht so lebhaft war wie jett, nicht häufig. Die

erste größere Bereicherung erhielt das Museum erst durch den Anstauf der Mineraliensammlung von Klaproth nach dessen im Jahre 1817 erfolgten Tode, indem sich darin nach Weglassung aller Arsten, die sich später als unecht erwiesen haben, Steinmeteorit von 12 Fundörtern und Eisenmeteorit von 5 Fundörtern befanden, und mehrere derselben in mehreren Eremplaren vertreten waren. In dem im Jahre 1826 vollendeten Kataloge des Museums sind Meteorit von 31 Fundörtern aufgeführt, und zwar Steinmeteorit von 21 und Eisenmeteorit von 9 Fundörtern. Aber schon im nächsten Jahre vermehrte sich die Sammlung um mehr als das Doppelte durch das Vermächtnis Chladni's, wodurch die ganze berühmte Meteoritenssammlung dieses um die Meteoritensunde so verdienten Gelehrten dem Verliner Museum zusiel. Sie bestand in Steinmeteoriten von 31 und Eisenmeteoriten von 10 verschiedenen Fundörtern, unster denen 18 neue Meteorit sich besanden.

Durch den Ankauf der Sammlung des Medizinal-Naths Vergesmann im Jahre 1837 erhielt das Museum einen Zuwachs an Steinsmeteoriten von 9 und von Eisenmeteoriten von 4 Fundörtern, doch waren darunter nur 2 neue Fundörter. Die späteren Erwerbungen geschahen nun nur durch Rauf, Tausch oder Schenkung einzelner Meteorit, wobei vor Allem das große Verdienst hervorzuheben ist, welches sich All. von Humboldt durch die Schenkung so vieler ausgeseichneter Meteorit um das Museum erworben hat. Bei dem Tode des Prosessor Weiß im Jahre 1856 belief sich die Zahl der verschies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Chladni starb den 3. April 1827 auf einer Reise in Breslau. Er stand in den freundschaftlichsten Beziehungen zu dem damaligen Direktor des Berliner Museums, wie überhaupt zu den Berliner Gelehrten, und dies Verhältnis hatte ihn bei dem Wunsche seine Sammlung gemeinnüßig zu machen, den er in seine Testamente ausgrücklich ausgesprochen hatte, wohl besonders bewogen, seine Sammlung dem Berliner Museum zu vermachen.

benen Meteoriten auf 90; sie ist seit dieser Zeit auf 176 gestiegen.<sup>2</sup> Einen großen Zuwachs erhielt sie noch in der neuesten Zeit<sup>3</sup> durch den Ankauf einer ganzen Meteoritensammlung vom Prof. Shepard in New Haven in den Vereinigten Staaten, zu welchem die Akademie auf das liberalste die Mittel bewilligte.<sup>4</sup> Die Sammlung skammte zum Teil auf der großen Meteoritensammlung des Prof. Lawrence Smith in Louisville, V. St., und enthielt neben vielem Neuen einzelne Stücke von bedeutender Größe wie ein fast vollständiges Exemplar von dem M. von New Concord von 26 Pfund und 24,3 Loth und eine große Platte von dem Toluca-Eisen mit vielen Einschlüssen, die über einen Fuß lang und einen halben Fuß breit ist.

Von vielen Seiten aufgefordert, ein Verzeichnis der in dem Verliner mineralogischen Museum befindlichen Meteoriten bekannt zu machen, schien es mir zweckmäßig in diesem Verzeichnis nicht, wie man gewöhnlich zu tun pflegt, die Eisen- und Steinmeteorit in der zufälligen Ordnung ihrer Fall- oder Fundzeit aufzusühren, sondern das Gleichartige zusammenstellend, sie nach ihrer mine- ralogischen Veschaffenheit zu ordnen. Ich sand zu einer solchen Anordnung umso mehr Veranlassung, als ich beabsichtigte, mit einem solchen Verzeichnis eine neue Ausstellung der Meteoriten des Verliner Museums vorzunehmen. Ich habe deshalb sämtliche Mesteoriten des Museums genau untersucht und dazu sämtliche Stein- und Eisenmeteorit anschleisen lassen, und letztere geätt, da man nur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bobei die mir zweifelhaften Eisenmeteoriten von Scriba, Hemalga, Newstead, Livingstone und Melrose, die in den Katalogen von der Wiener, Göttinger und Londoner Sammlung aufgeführt werden, nicht gerechnet sind.

<sup>3</sup>Roch vor der Lesung des dritten Teils dieser Abhandlung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Vergl. die Monatsberichte der Akademie von 1862, S. 644.

auf diese Weise bei den ersteren einen überblick über die Gemengteil erhalten, bei den letzteren die Struktur erkennen kann, eine Arbeit, die lange aushielt. Außerdem hatte ich von einem großen Zeil der ersteren dünne Platten schleifen lassen, und von den geätzten Flächen der letzteren Hausenblasenabdrücke gemacht, um sie unter dem Mistrossop zu beobachten, und bin nun dadurch zu den Resultaten gelangt, die ich mir erlaube, hiermit der Akademie vorzulegen.

Systematische Anordnungen der Meteoriten sind schon von Partsch,<sup>5</sup> Shepard<sup>6</sup> und in der neusten Zeit von Reichenbach<sup>7</sup> versucht worden. Vartsch teilt die Meteoriten ein zuerst in Steinund Eisenmeteorit, und lettere in normale und anomale; eine Einteilung und Benennung, die Neichenbach sehr tadelt, da man bei Meteoriten von normal und anomal nicht reden könne. Veraleicht man aber die Reihung selbst, so ist diese sehr naturgemäß. Zu den anomalen rechnet er nur 4, die von Alais, Capland, Chassianv und Simonod, von denen die drei ersteren allerdings auch von besonderer Art sind. Den von Simonod kenne ich nicht, er wird von Neichenbach als Meteorit ganz verworfen.<sup>8</sup> Die normalen werden in 2 Abteilungen geteilt, in solche die kein metallisches Eisen enthalten, wie a) die von Juvenas, Stannern, Konstantinopel, Jonzac, die nach der damaligen Annahme auf Augit und Labrador bestehen und b) die von Bialystock, Loutolar, Robleborough und Mäffing, die außerdem noch Olivin enthalten und ein breccienar-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Die Meteoriten oder die vom Himmel gefallenen Steine und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien-Rabinette zu Wien 1843, S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Report on American meteorites (from the Amer. Journ. of Science and arts, 2. Ser). New Haven 1848 p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Anordnung und Einteilung der Meteoriten in Pongendorff Annalen 1859, B. 107, S. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>A. a. D. S. 163.

tiges Ansehen haben, worauf dann die große Schaar derer folgt, die Eisen eingesprengt enthalten. Hätte Partsch die ganze erstere Abteilung noch zu den anomalen gerechnet, so wäre die Einteilung noch passender gewesen, und hätte er die Meteoriten der ersteren Abteilung ungewöhnliche, die der letzteren gewöhnliche genannt, so würden diese Ausdrücke Reichenbach vielleicht weniger Gelegenheit zum Anstoß gegeben haben. Aber die Einteilung ist doch immer noch nicht näher gerechtsertigt und zu unbestimmt.

Das Meteoreisen teilt Partsch in ästiges und derbiges; das erstere erhält durch eingemengten Olivin eine schwammige Gestalt, das letztere hat eine unbestimmte Form und geringe Beimengungen. Bu den ersteren gehören die Meteoriten von Atacama, Krasnojarsk (das Pallas Eisen) und von Brahin, zu den letzteren alle übrigen, die nun noch weiter, je nachdem sie durch ätzung mehr oder weniger deutliche oder auch gar keine Widmanskättenschen Figuren geben, eingeteilt werden.

Die Einteilung von Shepard bezieht sich zwar hauptsächlich nur auf den amerikanischen Meteoriten, nimmt aber doch auch auf einige ausländische Nücksicht. Er teilt den Meteoriten ebenfalls zuerst ein in Eisen- und Steinmeteorit und beide dann weiter wie folgt:

- J. Rlaffe: Eisenmeteorit.
- 1. Ordnung: Dehnbare und gleichartige.
  - (a) Seft.: Reine (Scriba, Walker County).
  - (b) Sekt.: Legierte.
    - i. Feinkörnige (Green County, Texas, Dickson County, Burlington).

- ii. Grobkörnige (De Ralb, Ashville, Guildford, Carsthago).
- 2. Ordnung: Dehnbare und ungleichartige.
  - (a) Sekt.: Blasig-olivinige (Krasnojarsk).
  - (b) Sekt.: Blasig-pyritische (Cambria).
  - (c) Sekt.: Phritisch-graphitische (Code County).
- 3. Ordnung: Spröde.
  - (a) Sekt.: Reine (Redford County, Randolph County).
  - (b) Sekt.: Legierte (Otsego County).
    - 2. Klasse: Steinmeteorit.
- 1. Ordnung: Trachytische.
  - (a) Sekt.: Olivinige.
    - i. Grobkörnige (Weston, Nichmond).
    - ii. Feinkörnige (Robleboro, Little Pinen).
  - (b) Seft.: Augitisch (Juvenas).
  - (c) Seft.: Chadnitisch (Bishopville).
  - (d) Seft.: Rohligen (Cold Boffeveld).
- 2. Ordnung: Trappartige.
  - (a) Sekt.: Gleichartige (Chantonnan).
  - (b) Sekt.: Porphyrartige (Renazzo).
- 3. Ordnung: Bimmsteinartige (Waterville).9

<sup>9</sup> Nicht meteorisch.

Reichenbach gibt wohl den, meiner Meinung nach einzig richtigem Weg zur Einteilung der Meteoriten an, befolgt ihn aber selbst nicht. Er sagt, es wäre am natürlichsten, der Meteorit nach der Verschiedenheit der Mineralspezies, die sie enthalten, einzuteis len, da wir diese aber noch zu wenig kennen, so müssen wir es so machen wie die Botaniker bei den natürlichen Systemen der Pflanzen und die Meteoriten nach der allgemeinen ähnlichkeit reihen. Er teilt demnach dieselben in 9 Sippen und jede wieder in verschies dene Gruppen, indem er mit den eisenfreien Steinmeteoriten von Langref (Chassignn), Bishopville, Jonzac, Juvenas, Stannern, Ronstantinopel anfängt, durch die eisenhaltigen zu den Eisenmeteoriten fortgeht, die noch Olivin enthalten, und mit den auf fast reinem Eisen bestehenden Meteoriten schließt. Es kann nicht fehlen, daff ein so scharfblickender Kenner der Meteoriten, wie Baron Reichenbach, nicht eine Menge neuer interessanter Zusammenstellungen macht und Beziehungen zwischen Meteorsteinen hervorhebt, die früher nicht beachtet waren; sein System ist aber doch nur, wie er selbst das Verfahren der Votaniker nennt, ein "geistreiches Tatonnement", es ist ihm derselbe Vorwurf zu machen, den er dem Partschen Systeme macht, es fehlt ihm ein Einteilungsprinzip; wir scheinen doch hinreichend in der Kenntnis der Meteoriten vorgerückt, um vollskändig die skrengen Grundsäte in Anwendung bringen zu können, die uns bei der Einteilung der Gebirgsarten, mit denen die Meteoriten doch vollständig zu vergleichen sind, leis ten. Wie man dort auf einem jeden selbstständigen Gemenge eine besondere Gebirgsart macht, so muss man es auch hier tun, und wenn man allerdings auch noch nicht vollständig alle Gemengteil der Meteoriten genau kennt, so weiß man davon doch so viel, um das Zusammengehörige zusammenstellen zu können.

Ich behalte zuerst die alte Einteilung in Eisen- und Steinmeteorit bei, je nachdem der Meteorit nur oder vorzugsweise aus Eisen, und zwar Nickeleisen, oder vorzugsweise aus einem Gemenge von Silicaten bestehen, in denen das Nickeleisen nur untergeordnet oder gar nicht enthalten ist.

- 1. Die Eisenmeteorit machen 3 Arten aus, Meteoritenarten kann man sie nennen, wie man in der Petrographie Gebirgsarten oder Felsarten sagt.
- Die 1. Art besteht auf Nickeleisen, das nur in geringer Menge mit einigen Eisenwerbindungen gemengt ist; ich nenne sie Meteoreisen.
- Die 2. Art besteht auf demselben Meteoreisen, worin Kristalle von Olivin porphyrartig eingewachsen sind. Der von Pallas am Jenisei gefundene Eisenmeteorit war der erste der Art, den man kennen lernte; er ist bekannt unter dem Namen Pallas-Eisen und bildet noch immer einen Hauptrepräsentanten dieser Art; ich schlage daher vor, die ganze Art Pallasit zu nennen.
- Die 3. Art ist ein körniges Gemenge von Meteoreisen und Magnetkies mit Olivin und Augit. Ich nenne sie Mesosiderit von  $\mu\varepsilon\sigma\sigma\varsigma$  in der Mitte stehend und  $\sigma\iota\delta\eta\varrho\sigma\varsigma$  Eisen, da sie aus einer ziemlich gleichen Menge von metallischen Eisenverbindungen und Silicaten besteht und so gewissermaßen in der Mitte zwischen den Eisen» und Steinmeteoriten steht.
- 2. Die Steinmeteorit sind in 7 Arten zu teilen, für die ich die folgenden Namen vorschlage:

- 1. Chondrit (von  $\chi o \nu \delta \varrho o \varsigma$ , die kleine Rugel). Sie ist die erste und hauptsächlichste Art, die den größten Teil der Steinsmeteorit enthält. Sie ist durch kleine Rugeln ausgezeichnet, die auf einem noch nicht bestimmten Magnesias Silicat bestehen und in einem feinkörnigen Gemenge eingemengt sind, das aus Olivin, Chromeisenerz, einer schwarzen noch zu bestimmenden Substanz, sowie aus Nickeleisen und Magnetkies besteht.
- 2. Howardit zu Ehren Howards benannt, dem wir die erste Analyse eines Meteorsteins verdanken; ein seinkörniges Gemenge von Olivin mit einem weißen Silicat, möglicher Weise Anorthit, und mit einer geringen Menge von Chromeisenerz und Nickeleisen. Sie enthält die Meteorsteine von Loutolar, Bialystock und Mässing u. s. w.
- 3. Chassignit, von Chassigny, dem Fallorte des einzigen bekannsten Meteoriten dieser Urt; ein kleinkörniger eisenreicher Olivin mit sparsam eingemengten kleinen Körnern von Chromeisenerz.
- 4. Chladnit nach Chladni benannt; ein Gemenge von Shepardit (Mg<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>) mit einem noch näher zu bestimmenden Tonerdes haltigen Silicate mit geringen Mengen von Nickeleisen, Magnetkief und einigen anderen noch zu bestimmenden Substanzen. Hierher gehört auch nur ein Meteorit, der von Vishopville. 10
- 5. Shalkit, der Meteorskein von Shalka, ein körniges Gemenge von vorwaltendem Olivin mit Shepardit und Chromeisenerz.

<sup>10</sup> Mit Chladnit hat zwar Shepard, der diesen Meteorit zuerst untersucht und beschrieben hat, schon das in ihm vorkommende Magnesia-Silicat bezeichnet, doch schien es mir zweckmäßiger, nach Chladni, der sich um die Meteoritenkunde so viele Verdienste erworben hat, einen Meteoriten, als ein Mineral zu benennen, wenn sich dieses auch bis setzt nur in einem Meteoriten gefunden hat. Ich möchte dann weiter vorschlagen, den bischerigen Chladnit: Shepardit zu nennen, der zwar auch schon einer in diesen Meteoriten sparsam vorkommenden Substanz gegeben ist, die nach Shepard Schweselschrom ist, die indessen doch in ihren Eigenschaften noch erst sehr wenig gekannt ist; Vorschläge, mit denen Hr. Shepard selbst sich einverstanden gegen mich erklärt hat.

- 6. Die kohligen Meteorit, wie von Bokkeveld und Alais, die ich nicht genauer untersucht habe und für die ich daher noch einen eigenen Nannen aus Setze.
- 7. Eufrit von  $\varepsilon\nu\kappa\varrho\iota\tau\sigma\varsigma$  wohl bestimmbar, da die mineralogische Beschaffenheit dieser Art bis auf einige Nebendinge ganz flar ist, und ihre wesentlichen Gemengteil vollkommen bestimmbar sind. Ein hauptsächlich auf Augit und Anorthit bestehendes körniges Gemenge mit einer geringen Menge Magnetkies, meistens noch geringerer Menge Nickeleisen, zuweilen mit kleinen, näher zu besstimmenden taselartigen Kristallen (Juvenas) und mit etwas Olivin (Petersburg, B. St.). Es gehören hierhin die Meteoriten von Juvenas, Stannern, Jonzac und Petersburg.

## 1 Eisenmeteorit.

Die ersten bestimmten Angaben über die Natur des Meteoreisens haben wir von Howard im Jahre 1802 erhalten, der bei Gelegenheit der chemischen Analyse des 1798 bei Benares in Bengalen gefallenen Meteorsteins die merkwürdige Entdeckung machte, dass das in demselben eingesprengte Eisen Nickel enthalte. Er fand darin 35 p.C. und einen ähnlichen Gehalt in andern gediegenen Eisenmassen, die für meteorisch angesehen wurden, in dem Eisen von Dtumpa in Brasilien, von Krasnojarst in Sibirien (dem Pallasseisen), dem Eisen aus Böhmen und vom Senegal.

Rlaproth bestätigte später den Nickelgehalt bei der Untersuchung des Meteoreisens von Agram und Ellbogen, wenngleich er die Mensge darin weit geringer fand (nur 3,5 und 2,5 pC.), und man war nun seit der Zeit gewohnt, den Nickelgehalt als ein charakteristisches Rennzeichen des Meteoreisens zu betrachten, und bei zufällig auf der Oberfläche der Erde gefundenen Eisenmassen ihren meteorischen Ursprung erst dann anzunehmen, wenn die chemische Untersuchung einen Gehalt an Nickel nachgewiesen hatte, eine Annahme, wozu man auch jett noch berechtigt ist, da man noch nie ein Meteoreissen ohne Nickelgehalt gefunden hat. Tellurisches gediegenes Eisen enthält keinen Nickel, ist überhaupt eine außerordentliche Seltenheit und wohl zufällig nur durch einen Neduktionsprozess entstanden.

Später fand Stromener in dem Meteoreisen neben dem Nickel etwas Robalt, das ja auch in den tellurischen Mineralien so häufig das Nickel zu begleiten pflegt und darauf auch etwas Rupfer,

<sup>11</sup> Philosophical transactions von 1802 und darauf in Gilberts Annalen.

und Laugier in dem Meteoreisen von Krasnojarst und Brahin etwas Chrom, 0,5 pC., das aber wie das in den Meteorsteinen vorkommende, wo es Laugier schon früher gefunden hatte, von eingemengtem Chromeisenerz herrührt.

Am meisten bereichert wurde unsere Kenntnis von der chemischen Beschaffenheit des Meteoreisens durch die genauen Analysen derselben von Berzelius, die er zuerst auf Beranlassung des Grasen Caspar Sternberg mit dem in Böhmen aufgefundenen Eisen von Bohumilis<sup>12</sup> und dann bei seiner großen Arbeit über die Meteoriten überhaupt, die durch die übersendung der 1833 bei Blansko in Mähren gefallenen Meteorsteine durch Baron von Reichenbach veranlasst wurde, mit dem Meteoreisen von Krasnojarst (dem Pallasseisen) und dem von Elbogen<sup>13</sup> angestellt hatte. Er schied durch Behandlung des Meteoreisens mit verdünnter Salpetersäure einen darin löslichen und einen anderen darin unlöslichen Teil, und fand auf diese Weise bei dem Eisen von Bohumilits (a), Krasnojarst (b), und Elbogen (c):

<sup>12</sup> Pongendorff Annalen von 1833 B. 27, S. 118.

<sup>13</sup>A. a. D. von 1834 B. 33, S. 123.

	a	b	c
Eisen	93,775	88,042	88,231
Nicel	3,812	10,732	7,517
Robalt	0,213	0,455	0,762
Magnesium	","	0,050	0,279
Mangan	","	0,132	Spur
Zinn und Kupfer	","	0,066	Spur
Rohle	","	0,043	","
Schwefel	","	Spur	Spur
Unlösliches	2,200	0,480	2,211
	100,000	100,000	100,000

Der in verdünnter Salpetersäure unlösliche Rücktand bestand auf metallischen Körnern und Schüppchen, die schwer zu Boden liegen, und auf einer feinen verteilten schwarzen kohleähnlichen Masse, die sich leicht in der Flüssigkeit aufschlämmen lässt. Die ersteren waren merkwürdiger Weise Phosphormetalle und bestanden auß

Eisen	65,987	48,67	68,11
Nicel	15,008	18,33	17,72
Magnesium	" <b>,</b> "	9,66	17,72
Phosphor	14,023	18,47	14,17
Riesel	2,037	" <b>,</b> "	<b>",</b> "
Roble	1,422	" <b>,</b> "	<b>",</b> "
	98,477	95,13	100,00

Die lettere, die beim Erhitsen rauchte und sodann verglimmt, wurde nur bei dem Pallas-Eisen quantitativ untersucht und bestand hier aus

Cisen	57 <b>,</b> 18
Nicel	34,00
Magnesium	4,52
Zinn und Kupfer	3 <b>,</b> 75
Rohle	0,55

Eine Spur von Phosphor, die Berzelius fand, glaubt er umsschlossenen Teilen der Phosphorverbindung zu schreiben zu müssen. Bei dem Nückstand auf dem Bohumiliss-Eisen wurden auch noch etwas Riesel und Chromeisenerz gefunden. Dieser feinere Teil des Nückstands ist daher von dem schwereren wesentlich verschieden zussammengesetzt.

Durch Berzelius wurden also in dem Meteoreisen 6 neue Stoffe aufgefunden: Phosphor, Zinn, Mangan, Magnesium, Kiesel und Rohle, von denen der Phosphor ganz besonders bemerkenswert ist, da solche Phosphormetalle, wie sie in dem Meteoreisen hiernach enthalten sind, unter den tellurischen Mineralien nicht bekannt sind.

Nach Berzelius wurden nun noch Analysen von anderen Mesteoreisenmassen und von andern Chemikern nach denselben oder ähnlichen Methoden gemacht, die aber ganz ähnliche Resultate gegesben haben. In allen wurde ein in verdünnter Säure unlöslicher, hauptsächlich aus Phosphornickeleisen bestehender Rückstand erhalten, derselbe war wie bei Berzelius stets nur in sehr geringer und in sehr

<sup>14</sup> Bergl. die Aufzählung berselben in Rammelsbergs Mineralchemie, S. 902.

veränderlicher Menge enthalten, und außerdem waren die Verhältnisse von Phosphor gegen Eisen und Nickel so verschieden, dass sich
eine gemeinschaftliche Formel für die chemische Zusammensekung dieser Verbindung nicht aufstellen lässt. Diesem unlöslichen Rückstand
hat Haidinger bei Gelegenheit der von Patera ausgeführten Analuse des Meteoreisens von Arva, worin derselbe in verhältnismäßig
großer Menge enthalten ist, den Namen Schreibersit gegeben zu
Ehren des früheren Direktors des kaiserlichen Mineralienkabinetts
in Wien, der sich um die Meteoritenkunde durch die Herausgabe
seiner Beiträge zur Geschichte und Kenntnis meteorischer Steinund Metallmassen verdient gemacht hat.

Aber schon viel früher, als Berzelius durch seine chemischen Unstersuchungen die gemengte Beschaffenheit des Meteoreisens dartat, hatte sie von Widmanstätten in Wien auf eine andere Weise beswiesen. Derselbe zeigte nämlich schon 1808, dass wenn man an dem Meteoreisen angeschlissene und polierte Flächen mit einer schwaschen Säure ätzt, gewisse Figuren hervortreten, die man seitdem die Widmanstättenschen Figuren genannt hat. Die Fläche, die vor dem ätzen ganz gleichartig aussieht, oder nur bei höchster Politur und nach dem Anhauchen schwache Andeutungen der Figuren gibt, erscheint nun überall mit schwache, glanzlosen, unter einander parsallelen Streisen bedeckt, die nach verschiedenen Richtungen gehend, sich unter verschiedenen schiesen Winkeln durchneiden, von dünnen, hervortretenden, metallisch glänzenden Leisten eingefasst werden und dunklere matte Felder einschließen, was alles eine sehr kompliziers

 $<sup>^{15}</sup>$  Ef geht dief auf den Berechnungen von Rammelsberg hervor, wonach bei den verschiedenen Analysen auf 1 Atom Phosphor 2, 3 1/2, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 30 Atome Wetall kommen. (A. a. D. S. 948) Es scheint aber nicht, dass man die beiden Arten des Rückstandes, die Berzelius wohl unterschieden, getrennt hat.

<sup>16</sup> öfterreich. Blätter für Lit. 1847, N. 175, S. 644 und N. Jahrbuch für Min. von 1848, S. 698.

te Struktur des Meteoreisens anzeigt. Besonders schön fielen diese Figuren auf dem großen Stücke auf, das 1812 von der Elbogener Eisenmasse abgeschnitten und nach Wien gebracht war. Da die schmalen einfassenden Leisten, die wenig oder gar nicht von der verdünnten Säure angegriffen werden, bei der ätzung auf der übrigen Masse etwas hervortreten, so kam Widmanskätten auf die Idee, die geätzten Eisenmassen wie einen Schriftsat in der Buchdruckerpresse abdrucken zu lassen, was auch vollkommen gelang. Er fonnte dadurch vollkommen naturgetreue Abbildungen liefern, wie sie die Kunst nicht darzustellen vermag. V. Schreibers beschrieb in dem eben genannten Werkelt die einzelnen Teile des Meteoreisens, die Streifen, Einfassungsleisten und Zwischenfelder, und gab auch einen Abdruck von der geätzten Fläche der großen Elbogener Masse def Wiener Mineralien-Rabinetts; die tieferen Stellen sind darin weiß und nur die höheren Stellen, die Leisten, schwarz, zum Teil auch die Zwischenfelder, die oft wieder gestreift erscheinen. Auch von andern Eisenmassen ließ er Abdrücke machen, die später berausgegeben werden sollten, wozu es aber nicht gekommen ist, und die dann nur an einzelne Personen verteilt wurden. Nach v. Schreibers wurden dergleichen Abdrücke nun auch von andern hergestellt, von Partsch in seine Werke die Meteoriten, von Hais dinger in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, von mir selbst in Vongendorff Annalen u. s. w. Außerordentlich schön sind die Abdrücke in den neusten Abhandlungen von Haidinger, die die Figuren des Meteoreisens von Sarepta und Arva darstellen. 18

Indessen geben nicht alle Eisenmeteorit Widmanstättenschen Fis

<sup>17</sup> Beiträge etc. S. 70, vergl. auch Partsch Meteoriten, S. 100.

<sup>18</sup>Sizungsberichte der kaiserl. Akad. d. Wiss. vom 24. Juli 1862.

auren, und namentlich ist dies der Fall bei der im Jahre 1847 bei Braunau gefallenen Eisenmasse, bei welcher Haidinger<sup>19</sup> die merkwürdige Entdedung machte, dass sie in ihrer ganzen Masse nach denselben drei untereinander rechtwinkligen Richtungen parals lel den Flächen des Heraeders spaltbar sei. Es waren zwei Massen gefallen, die beide in die Hände des Prälaten vom Kloster zu Braunau Hrn. Rotter gelangten, der die größere, 42 Pfd. 6 Eth. schwere Masse zerschneiden ließ und einzelne Stücke davon den verschiedenen Museen als Geschenk übersandte.20 An dem Stücke, welchef das k. Mineralien-Rabinett in Wien erhielt, machte Haidinger die obige Beobachtung. Es war wie die übrigen zum Teil durchschnitten und die weitere Trennung durch Zerreißung hervorgebracht, so dass also stellenweise der natürliche Bruch sichtbar war. Da die Spaltungsflächen auf der ganzen Bruchfläche und demnach auch wahrscheinlich durch das ganze Stück in gleicher Richtung forts gehen, so ist das ganze Stück und so auch die ganze Masse, von der ef abgeschnitten, ein Stück eines Individuums, eines Kristalls, des sen äußere Form nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil er beim Durchzuge durch die Luft zerplatt und die einzelnen Stücke an der Oberfläche abgeschmolzen sind, dessen innere Struktur in den Stüden aber erhalten ist. Haidinger ließ das erhaltene Stück anschleifen und äten; es entstanden nun keine Widmanskättenschen Figuren, aber andere gerade und untereinander parallele Linis en nach mehreren Richtungen wurden sichtbar, die nachher von

<sup>19</sup> Berichte der Versammlungen der Freunde der Naturwissenschaften in Wien, 1847 und darauf in Pongendorfff Ann. 1847 V. 72, S. 580.

<sup>20</sup> Auch das Berliner Museum erhielt auf diese Weise ein ausgezeichnet schönes Stück, 2 Pfund 21,3 Loth schwer.

Neumann<sup>21</sup> ihrer Richtung nach forgfältig beschrieben und gedeutet wurden, worauf ich später zurücksommen werde.

Sehr wichtige und interessante Untersuchungen über die Struttur des Meteoreisens hat nun in der letzten Zeit der Baron von Reichenbach, 22 gemacht. Er unterscheidet bei den Eisenmeteoriten, die Widmanskättenschen Figuren geben, vier Gemengteil, die durch die ähung einer angeschliffenen Fläche sichtbar werden und die er mit dem Namen Balkeneisen oder Ramazit, Bandeisen oder Tänit, Külleisen oder Plessit und Glanzeisen oder Lamprit bezeichnet. Das Balkeneisen bildet auf der geäßten Fläche die unter einander parallelen Streifen, die sich unter schiefen Winkeln (von 30, 60 und 120 Graden) durchschneiden und nimmt somit den größten Raum ein: ef wird durch ägung grau und glanzlof und zeigt sich nun mit einer Menge unter einander paralleler Linien nach Art des Braunauer Eisens bedeckt, die Reichenbach Schraffirungslinien nennt und für Andeutungen von Spaltungflächen hält; in vielen Källen erscheint es aber selbst wieder körnig, wie namentlich in dem Eisen von Ruffs mountain. Das Bandeisen fasst die Streifen des Balkeneisens ein und bedeckt sie in papierdünnen Blättern zu beiden Seiten; es wird von der verdünnten Säure schwach rötlichgelb gefärbt, sonst wenig oder gar nicht angegriffen, und ragt daher auf der geäßten Kläche über dem Balkeneisen leistenartig etwas bervor. Das Fülleisen erfüllt die drei oder vierseitigen Felder, die von dem Balkeneisen eingeschlossen werden; es wird von der ätzung wie das Balkeneisen angegriffen und erhält dabei eine noch dunkle

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Naturwissenschaftliche Abhandl. gesammelt von Haidinger 1849 B. 3, Abt. 2, S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Pongendorff Ann. 1861 B. 114, S. 99, 250, 264,477.

graue Farbe, wie dieses. Es ist in manchen Abänderungen wie in dem Eisen von Ruffs mountain gar nicht vorhanden, füllt auch häusig die Felder nicht allein aus, sondern enthält oft noch eine große Menge Blättchen von Vandeisen, die in untereinander parsalleler Richtung enge nebeneinander und bei vierseitigen Feldern gewöhnlich zwei parallelen Seiten, oft aber auch zum Teil den beiden andern parallel liegen, in welchem letzteren Fall die Blätter in einer Diagonale des Vierecks aneinandergrenzen. Reichenbach nennt diese die Zwischenselder ausfüllenden Blätter des Vandeisens Rämme. Das Glanzeisen liegt in einzelnen länglichen Körnern und Streisen in der Mitte des Valkeneisens; es wird durch die verdünnte Säure gar nicht angegriffen und behält den vollen Glanz und die lichte, stahlgraue fast zinnweiße Farbe, die es durch die Politur der Fläche erhalten hat. Es sindet sich nicht in allen Eisenmeteoriten, sehr ausgezeichnet in dem von Lenarto und Arva.

Reichenbach prüfte diese 4 Eisenarten noch weiter nach einer Methode, die schon Widmanstätten angewandt hatte, durch das Anslaufen in der Hike. Er zeigte, dass das Valleneisen zuerst anläuft, dann das Fülleisen und zulet das Vand und Glanzeisen. Da nun auch das erstere von der Säure am leichtesten, die letzteren am schwersten angegriffen werden, so sieht man, dass die Wirkungen der Hike und der Säure gleichen Schritt halten, wie denn auch beide Erscheinungen auf stärferer oder schwächerer Verwandtschaft zum Sauerstoff beruhen. Bei einer Hike, bei welcher das Valkeneisen schwolzen geworden ist, erscheint das Fülleisenbläulichrot und das Vandeisen goldgelb. Stahl läuft aber bekanntlich bei 230° C. gelb, bei 263° purpurrot, bei 290° blau an. Die Hike also, die

das Valkeneisen schon blau macht, färbt erst das Fülleisen purpurrot und das Vandeisen goldgelb.

Eine vollständige Trennung sämtlicher Gemengteil für die chemische Untersuchung konnte Reichenbach nicht bewerkstelligen, doch glückte es ihm wenigstens einigermaßen für einen derselben, für das Bandeisen. Manche dieser Eisenmeteoriten, wie namentlich der von Cosby Creek, die vor ihrer Auffindung vielleicht lange Zeit in der feuchten Erde gelegen haben, sind nämlich an der Oberfläche sehr stark orndiert und zerteilen sich hier parallel den Blättern des Vandeisens in Platten, welche Zerteilung durch leises Hämmern noch vollständiger bewirft werden kann. Die orvdierten Platten des Valkeneisens sind aber hier mit papierdünnen Blättern des Bandeisens bedeckt, die sich nun mit Leichtigkeit von dem Balkeneis sen ablösen und so in hinreichender Menge zur Analyse gewinnen lassen.23 Reichenbach verfuhr so mit dem Eisen von Cosby; das gesammelte Bandeisen untersuchte er zuerst in Rücksicht des spezifischen Gewichtes, er sand dasselbe 7,428, etwas größer als das spezisische Gewicht der ganzen Masse, das 7,260 beträgt, es wurde sodann von seinem Sohne Reinold v. Reichenbach analysiert, der zugleich auch eine Analyse der ganzen Masse machte. Er fand<sup>24</sup> in dem Bandeisen (a) und in der ganzen Masse nach 2 Analysen (b) und (c):

<sup>23</sup> Diese Blättchen von Bandeisen können so zuweilen von bedeutender Größe erhalten werden; so beschreibt Reichenbach ein Stück von dem Losby-Eisen in seiner Sammlung das mit einem Blatte Bandeisen bedeckt ist, das eine Länge von 3 Zoll bei einer Breite von 2 Zoll hat.

<sup>24</sup> Vergl. Pongendorff Ann. 1861 B. 114, S. 258.

	a	$\mathfrak{b}$	c
Cisen	85,714	90,125	89,324
Nicel	13,215	9,786	10,123
Robalt	0,550	9,786	0,422
Schwefel	0,226	Spur	Spur
Phosphor	0,295	0,089	0,131
	100	100	100

Die Analyse gab also in dem Bandeisen einen etwas größer Rickelgehalt, auch etwas mehr Schwefel und Phosphor und dafür weniger Eisen als in der ganzen Masse, welches Verhältnis gegen die übrigen Gemengteil sich noch etwas größer stellen würde, wenn man bei der Analyse der ganzen Masse das Bandeisen hätte entsernen können. Reichenbach glaubte indessen durch diese Analyse noch keine völlige Austlärung über die chemische Veschassenheit des Vandeisens erhalten zu haben, da er bei der Vesichtigung desselben unter dem Mikrostop fand, dass noch eine Menge anders gearteter Körperchen in demselben eingelagert waren.

In den Eisenmeteoriten, die keine Widmanskättenschen Figuren geben, hat nach Neichenbach die eine oder die andere dieser Eissenarten überhandgenommen und die andern kommen dann nur ganz unregelmäßig und untergeordnet und zum Zeil auch gar nicht darin vor. So besteht das Eisen von Braunau fast nur auf Valkeneisen, und das Eisen vom Cap der guten Hoffnung und von Nasgatà ist Neichenbach geneigt, als fast ganz auf Fülleisen bestehend anzunehmen.

Die meisten Abänderungen des Meteoreisens enthalten aber nun

noch einen andern Gemengteil, feine nadelförmige Kristalle oder Radeln, wie sie Reichenbach kurzweg nennt. Wöhler<sup>25</sup> beobachtete sie zuerst bei dem Meteoreisen von einem unbekannten Fundort<sup>26</sup> sowohl auf dessen polierter und geäßter Fläche, als auch in dem Rückstande bei seiner Behandlung mit verdünnter Salpetersäure, wo sie unter dem Mikrostop kenntlich wurden. Reichenbach zeigte,<sup>27</sup> dass sie in den meisten Eisenmeteoriten enthalten sind und bei der äßung einer polierten Fläche derselben zum Vorschein kommen, wobei sie einen ausgezeichneten Parallelismus durch die ganze Masse zeigen. Ihre Länge überschreitet selten 2 Linien. Reichenbach hält sie für eine vollkommenere Ausbildung des Vandeisens.<sup>28</sup>

Außer den genannten, vorzugsweise auf metallischem Eisen bestehenden Einmengungen kommen in den Eisenmeteoriten noch andere, teils gröbere teils seinere, mehr oder weniger häusig vor. Zu den ersteren gehören Schweseleisen, Grafit und besonders Olivin.

Das Schwefeleisen ist nach den Untersuchungen von Smith und Rammelsberg kein Magnetkies, wie man bisher angenommen hatte, sondern einfach Schwefeleisen, FeS, Troilit, wie es Haidinger

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Annalen der Chem. u. Pharm. B. 81, S. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Reichenbach hält dies Meteoreisen für das von Santa Rosa in Columbien, da es aber Widmanstättenschen Figuren gibt, stimmt es wenigstens nicht mit dem überein, welches Boussingault von dort mitgebracht und an v. Humboldt geschenkt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bergl. Poggendorff 1862, B. 115, S. 148.

<sup>28</sup> Ju diesen Einmengungen würden auch noch die kleinen Eisenkügelchen zu zählen sein, die ich zuerst und dann aufführlich Meichenbach beschrieben (Pongendorfff Ann. 1861 B. 113, S. 187 und B. 115, S. 152), und die auch auf der geschliffenen Fläche in ihren Durchschnitten sichtbar werden sollen. Die Annahme von solchen Rügelchen beruht aber, wie ich mich jett überzeugt habe, auf einem Jertum. Die angeblichen runden Rugeln sind nichts anderes als Stellen, die beim äten durch eine ansitzende Luftblase vor dem Angriff der Säure geschützt waren. Die Luftblase bildete sich durch die Art, wie ich das Meteoreisen ätze und die darin bestand, dass ich dasselbe mit der polierten wohl gereinigten Fläche in die verdünnte Säure tauchte und darin eine halbe bis eine ganze Minute hielt, wobei dann öfter eine Luftblase an der Fläche silsen blieb, die den Angriff der Säure verhinderte. Wenn man die Fläche vorher mit Wasser nass macht oder die Fläche nicht mit einem Male unter die Oberfläche der Säure bringt, sondern erst mit einer Seite und sie dann mehr und mehr neigt, bis sie ganz in Wasser eingetaucht ist, so bleiben keine Luftblasen hängen. Daher kommt es, dass, wie Reichenbach erwähnt, er die Eisenkügelchen nur bei den Stücken des Verliner Museums und nicht in den Stücken seiner eigenen Sammlung gesehen hatte.

zu nennen vorgeschlagen hat<sup>29</sup>; also eine Verbindung, die unter den Mineralien der Erde bisher noch nicht bekannt ist. Es besteht nach Rammelsberg<sup>30</sup> in zwei Abänderungen aus dem Eisen von Seeläsgen (a) und Sevier County (b) und nach der Verechnung nach der Formel (c) aus

	a	b	c
Eisen	63,41	62,22	63,64
Nickel	//	1,76	","
Mangan	0,64	" <b>,</b> "	","
Schwefel	<i>35</i> ,91	36,01	36,36
	99,96	99,99	100,0

Es enthält also bald Nickel (Schwefelnickel) bald ist es, obgleich mitten in dem nickelhaltigen Meteoreisen vorkommend, davon frei, wie der Olivin in dem Pallas-Eisen (s. weiter unten), doch scheint das erstere häusiger zu sein, da auch Smith in dem Troilit aus dem Meteoreisen von Tazewell etwas Nickel angibt.

Der Troilit ist bis setzt in dem Meteoreisen nur derb vorgekommen, in mehr oder weniger großen Körnern und unregelmäßigen Massen, zuweilen in der Form von Zylindern von mehr als 1 Zoll Größe und mehreren Linien Dicke, wie Neichenbach beobachtet hat. Er ist im Bruch uneben, zeigt aber öfter dünnschalige Zusammensexungsstücke, wie dies öfter beim Magnetkies, z. B. von

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Jur Erinnerung an den Berichterstatter des Meteoritenfalls von Albareto bei Modena 1766, Domenico Troilit, der schon lange vor Chladni die Tatsächlichkeit der Meteoritenfälle bewies, freilich ohne seiner Meinung Geltung verschaffen zu können. Vergl. Sitzungsbericht d. f. Akad. der Wiss. März 1863.

<sup>30</sup> Monatsber. d. f. Pr. Akad. d. Wiss. 1864, S. 29.

Bodenmais vorkommt; tombakbraun, metallisch glänzend, spezisisches Gewicht 4,787 (Seeläsgen), 4,817 (Sevier County). Diess hohe spezisische Gewicht unterscheidet ihn von dem Magnetkiese, dessen Gewicht nicht über 4,623 hinaußieht. Ebenso unterscheidet er sich durch sein Verhalten gegen Chlorwasserstoffsäure, indem er sich darin ohne einen Nückstand von Schwesel auslöst. Nickeleisen, Chromeisenerz und Grafit kommen öfter in ihm eingemengt vor, doch ist er zuweilen auch davon ganz frei, wie die Analyse des Ervilit von Seeläsgen durch Nammelsberg beweist.

Wenn ef so erwiesen ist, dass einfach Schwefeleisen in dem Meteoreisen vorkommt, so bleibt es doch noch außumachen übrig, ob alles Schwefeleisen in demselben von derselben Art sei oder ob neben diesen nicht auch Magnetkies vorkommt. In den Steinmeteoriten ist, wie bekannt, das Vorkommen dieses letter nicht zweiselhaft, da, wenn darüber auch noch keine chemischen Untersuchungen angestellt sind, das Schwefeleisen in dem Meteorstein von Juvenas kristallis siert vorkommt, und an der Kristallform als Magnetkies erkannt werden kann. Ist es daher möglich, dass dieser auch in den Eisenmeteoriten vorkommt, so ist dies doch noch nicht erwiesen, wie auf der anderen Seite auch das Vorkommen von einfach Schwefeleis sen in den Steinmeteoriten nicht bewiesen ist: ich werde daher bis auf Weiteres das Schwefeleisen der Eisenmeteorit, auch wo es noch nicht untersucht ist, als Troilit und das der Steinmeteorit als Mas gnetkief aufführen. Der Grafit findet sich in kleinen abgerundeten, im Innern auf dicht zusammengehäuften Schüppchen bestehenden Parthien bis zu der Größe einer Haselnuss oder Walnuss, zuweilen

aber auch, wie Haidinger bei dem Eisen von Arva beobachtete<sup>31</sup> in Pseudomorphosen.<sup>32</sup> Der Olivin findet sich in einzelnen abgerundeten Körnern in manchen Abänderungen in großer Menge, wie namentlich in dem Meteoreisen, das Pallas 1776 am Jenisei im östlichen Sibirien gefunden hatte. Viot<sup>33</sup> schloss auf dem optischen Verhalten der Olivin-Körner, dass dieselben wirkliche Kristalle wären, und ich beobachtete,<sup>34</sup> dass die Körner, wie wohl meistenteils, ganz rund, wo sie frei im Eisen liegen, doch schon einzelne sehr glänzende Flächen und in seltenen Fällen sogar in großer Menge enthalten. Außerdem Pallas-Eisen enthalten auch noch das Meteoreisen von Brahin (Gouv. Minst) und von der Wüsste Atacama und andere solche Kristalle.

Wo aber diese Einschlüsse vorkommen, sind sie stets, wie Neischenbach hervorhob, von einer Hülle von Balkeneisen umgeben, und wenn sie sich in einem Meteoriten, der Widmanstättenschen Figuren gibt, sinden, so fangen diese immer erst in einer gewissen Entsernung, die 1 bis 3 Linien beträgt, an, sich regelmäßig zu entwickeln. Dies zeigt sich besonders schön bei den Olivin-Einschlüssen. Sind sie in großer Menge vorhanden, wie in Pallas-Eisen und in dem Eisen von Brahin und Atacama, so dass sie oft nur wenig

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Pongendorff Ann. 1846 B. 67, S. 437.

<sup>32</sup> Haidinger glaubte darin die Form einer Kombination des Dexaeders mit dem Ventagondobekaeder zu erkennen und nimmt daher an, dass die Pseudomorphosen aus Eisenkie entstanden wären, eine Ansicht, die ich jedoch nicht teilen möchte, da Eisenkies mit Sicherheit in den Meteoriten bis jett nicht beobachtet ist, und die Pseudomorphosen selbst, die Hr. Haidinger die Güte hatte, mir zur Ansicht zu schlächen, mir mehr die Form eines Hexaeders mit zu geschärften als mit schief abgestumpsten Kanten zu haben schienen. Man kann nun aber fragen, woraus die Pseudomorphosen dann entstanden wären? Am nächsten liegt bier nun wohl die Annahme, dass dies der Diamant gewesen sei; wenn aber auch dies Annahme durch die Form der Pseudomorphose und die Möglichkeit der Bildung gerechtsertigt wird, so sindet sie doch darin eine große Schwierigkeit, dass eben Diamanten in den Meteoriten bisber noch nicht beobachtet sind.

<sup>33</sup> Bulletin des sciences, par la soc. philomatique. 1820 p. 89.

<sup>34</sup> Pongendorff Ann. 1825 B. 4, S. 186.

Naum zwischen sich lassen, so wird dieser von dem Balken, Band und Külleisen meistenteils ganz ausgefüllt, und zwar so, dass zuerst an dem Olivin sich eine dünne Lage von Balkeneisen anlegt, dann eine viel dünnere Lage von dem Bandeisen folgt und zuleßt das Fülleisen den inneren Naum einnimmt, wie man dies auf einer durch ein solches Meteoreisen gelegten Schnittsläche, die man geäßt hat, sehr gut sehen kann. Sind die Näume zwischen den Olivinkristallen größer, so bilden sich in dem Fülleisen die Widmanskättenschen Figuren; bei den genannten Meteoriten sieht man jedoch diese nur selten, aber bei dem Eisen von Steinbach und Nittersgrün, wo die Olivine kleiner sind und die Eisenmasse zwischen ihnen größer ist, sind auch die Widmanskättenschen Figuren größer, umso mehr als auch nun die Einsassung des Olivins durch das Valkeneisen schmaler ist.

Die Widmanstättenschen Figuren waren früher in den Olivinshaltigen Eisenmeteoriten ganz übersehen, bis sie Partsch in dem Eisen von Steinbach entdeckte, 35 der dadurch auf den gleichen Urssprung von vielen Stücken Meteoreisen, die in den verschiedenen Sammlungen mit der Angabe von verschiedenen Fundörtern aufsgeführt waren, schloss. Sie wurden nachher auch von Reichenbach beschrieben.

Bu den feiner Einmengungen, die sich in den Eisenmeteoriten finden, gehören eine Menge kleiner mikroskopischer, meist farbloser, doch auch farbiger glänzender Steinchen von mehr als Quarzhärte, die Wöhler außer dem Schreibersit als Nückstand bei der Auflösung des Eisens von Rasgata erhielt, jedoch nicht weiter untersuchte und

<sup>35</sup> Die Meteoriten, S. 91.

einige kleine Quarzkristalle, die ich in dem Eisen von Toluca beobachtete<sup>36</sup> und die noch so groß und glänzend waren, dass ich ihre Winkel mit Genauigkeit bestimmen konnte. Sie steckten zwar nur in der äußern orndierten Rinde, doch so, dass man nicht daran zweiseln konnte, dass sie sich in dem Meteoreisen gebildet hatten und nicht erst später hineingekommen waren.

Alle diese Eisenmeteorit, die man zufällig auf der Oberfläche der Erde findet, sind mit solcher Rinde von Eisenorndhydrat umgeben, die sich erst durch Orndation gebildet hat. Diese Orndation geht aber in der Regel nicht weit, und die so entstandene Rinde schützt die Eisenmeteorit vor ihrer Zerstörung und bewirkt, dass sie sich Jahrtausende weiter unversehrt erhalten. Sie ist die Ursache, daff die Eisenmeteorit, die nur so selten fallen, dass man nur die Kallzeit von dreien kennt, doch häufig gefunden werden, so dass man jest in den Sammlungen mehr alf halb so viel Eisen- wie Steinmeteoriten hat. Die Eisenmeteoriten, welche man hat fallen sehen und unmittelbar nach ihrem Falle gesammelt hat, wie die von Agram und Braunau, haben keine solche Rinde von Brauneisenerz; die rundlichen Erhabenheit und Vertiefungen, die sich überall an der Oberfläche derselben finden, sind, wie Reichenbach gezeigt bat, mit einem dünnen überzuge von Magneteisenerz bedeckt, der sich bei dem Durchzuge durch die Luft an der Oberfläche durch Schmelzung und Orndation bildet, 37 und so äußerst dünn ist, weil das gebildete Magneteisenerz beim Schmelzen abtropft und nur das wenigste durch Adhäsion haften bleibt. Unter diesem überzuge

<sup>36</sup> Pongendorff Ann. 1861 B. 113, S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Pongendorfff Ann. 1858 B. 103, S. 637. Reichenbach spricht hier von Eisenorwaul, was wohl nur heißen soll Orwborydul over Magneteisenerz.

findet sich dann eine 1 bis 1 Linien dicke Lage, in welcher das Eisen ganz körnig geworden ist, wie auch schon Reichenbach bei dem Eisen von Braunau beobachtet hat<sup>38</sup> und auch in den Abdrücken dieses Eisens von Haidinger zu sehen ist,<sup>39</sup> was beweist, dass das Eisen vor der Orndation seinen Aggregakustand ändert. Dass sich auf der Oberfläche dieser Eisenmassen beim Liegen in und auf der seuchten Erde nicht bloß Eisenorndhydrat, sondern auch Magneteisenerz bildet, hat Krank gezeigt,<sup>40</sup> der auf der Oberfläche des Eisens von Toluca oktaedrische Kristalle dieser Substanz beobachtet hat.

### 1.1 Meteoreisen.

Das Meteoreisen von den verschiedenen Orten, wo man es zufällig gefunden oder hat fallen sehen, ist von verschiedener Art. Diese Massen sind:

- a) nur Stücke eines Individuums oder eines Kristalls ohne schalige Zusammensetzung,
- b) Aggregate grobkörniger Individuen, ebenfalls ohne schalige Zusammensetzung,
- c) Individuen mit schaligen Zusammensetzungsstücken parallel den Flächen des Oktaeders (Meteoreisen, das durch ätzung Widmsanstättenschen Figuren gibt),
- d) Aggregate mit großkörnigen, schalig zusammengesetzten Individuen,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>A. a. D. 1862 B. 115, S. 135.

<sup>39</sup> Sizunasberichte der math. naturm. Klasse d. f. Akad. der Wissenschaft. 1855 B. 15, S. 354, Fig. 5.

<sup>40</sup> Pongendorff Ann. 1857, B. 101, S. 152.

- e) Aggregate mit feinkörnigen Zusammensekungstücken.
- a) Meteoreisenmassen, welche Stücke eines Kristalls ohne schalige Zusammensetzung sind.

#### Hierher gehört vor Allen:

1) das Eisen von Braunau in Böhmen (gefallen am 14. Juni 1847), das schon oben S. 34 erwähnt ist und an welchem Haidinger die Beobachtung machte, dass es Spaltungsslächen ganz gleicher Art nach drei untereinander rechtwinkligen Richtungen, also nach den Flächen des Hexaeders hat. Das Meteoreisen hat also dieselbe Form, wie das künstlich dargestellte reine Eisen, bei welchem sich auch oft Massen mit körnigen Zusammensetzungsstücken sinden, die Spaltungsslächen des Hexaeders deutlich wahrnehmen lassen. 41

Neumann zeigte, <sup>42</sup> dass, wenn man eine polierte Schnittsläche dieses Meteoreisens mit verdünnter Salpetersäure ätt, sich auf dersselben eine Menge gerader und unter einander paralleler Linien oder liniensörmiger Furchen bilden, die meistenteils eng neben einsander liegen und nach mehreren sich unter verschiedenen Winkeln durchschneidenden Nichtungen gehen, von denen aber die Linien eisner oder zweier Nichtungen stets vorwalten, die Linien der andern Nichtungen nur untergeordnet und mehr stellenweise vorsommen. Er bestimmte mit großer Sorgfalt die Lage dieser Linien und zeigste, dass sie auf einer Hexaedersläche nach sechs Nichtungen gehen, nach den zwei Diagonalen der Hexaedersläche, ac und bb (Tas.

<sup>413.</sup> B. bei dem Eisen, das lange Zeit als Rostbalken gedient hat.

<sup>42</sup> Naturwissenschaftliche Abhandlungen, berausgegeben von Haidinger, 1849, B. 3, Abt. 2, S. 45.

1 Fig. 2) und nach 4 andere Richtungen, die den Linien af, ag, of, und de, die auf 2 benachbarten Winkeln nach den Mitten der gegenüberliegenden Seiten gezogen werden können, parallel ges hen. Die beiden Diagonalen ac und db schneiden sich also unter rechten Winkeln und ebenso je 2 der übrigen Linien, die auf verschiedenen Winkeln der Heraederfläche auflaufen, wie ag und df oder af und de, dagegen die beiden Linien, die aus einem Winkel auslaufen, wie de und df, gegen einander Winkel von 36° 52' und jede dieser Linien mit der benachbarten Seite der Hexaederfläche einen Winkel von 26° 34' macht. 43 Man sieht diese Linien in Fig. 1 (Taf. 1), die eine Zeichnung in vergrößertem Maßstabe von der Heraederecke o an einem Stücke des Braunauer Eisens Fig. 4 ist, an welchem die drei Flächen A, B, C möglichst genau parallel den 3 Spaltungflächen des Eisens geschliffen und darauf geätt sind. Die Akungslinien sind auf Kig. 1 möglichst getreu nach der Natur gezeichnet. Man sieht hier, wie die Linien, die parallel der Richtung ag (Fig. 2) gehen, vorherrschen und gruppenweise wiederkehren, während andere nur stellenweise vorkommen und die erster bald durchschneiden, bald nicht. Noch besser sieht man sie in Fig. 5, die eine kleine Stelle in der Gegend von r auf der Fläche C (Fig. 1) 140-mal vergrößert darstellt. 44 Die Linien derselben

 $<sup>^{43}</sup>$  Neumann gibt wohl nur auf Versehen den ersten Winkel zu  $^{35^\circ}$  14' an, und die Winkel, welche die Linien af und ag oder de und of mit den sie durchschneibenden Diagonalen machen, zu  $^{72^\circ}$  23' und zu  $^{107^\circ}$  37' statt zu  $^{70^\circ}$  34' und zu  $^{108^\circ}$  26'.

<sup>44</sup> Diese Fig. ist auf die Weise gezeichnet, dass von der Fläche C Fig. 4 zuerst ein Hausenblasenabbruck gemacht, von der Stelle r auf ihr, sodann ein unter dem Mikrostop vergrößertes photographisches Vild angesertigt und dasselbe darauf abgezeichnet wurde. Die Richtung der Linien ist daher genau die der Natur, und die Winkel würden bis auf die Sekunde genau sein, wenn die geschlissene Fläche hätte der Hexaeberstäche genau parallel geschlissen werden können. Es ist ein großer übelstand, der die Untersuchung sehr erschwert, dass man das Meteoreisen nicht spalten kann, sondern alle Hexaederstächen, die man haben will, erst anschleisen lussen muss, was immer mühsam ist, und mit großer Genauigkeit doch nicht ausgeführt werden kann. Indessen sind in diesem Fall die Abweichungen von den Winkeln, die man auf der Zeichnung messen kann, nicht sehr abweichend von den berechneten, woraus

Richtung sind in Fig. 5 mit denselben Buchstaben bezeichnet wie in Fig. 2; es sehlen also in Fig. 5 nur die Linien nach den Richtungen ac und af. Die Linien erscheinen hier oft unterbrochen, die einen dicker und die andern dünner, und die einen erscheinen bald von den andern durchsetzt, bald durchsetzen sie die andern.

Es ist schwer zu sagen, wosür man diese Linien halten soll. Sie charakterisieren keineswegs das Meteoreisen allein, sie finden sich vollkommen ebenso bei dem fünstlich dargestellten Eisen, wie Prestel gezeigt hat<sup>45</sup> und, wie ich mich selbst überzeugt habe, unter andern bei einem schönen Spaltungstück von solchem fünstlich dargestellten Eisen, das ich noch Mitscherlich verdanke, bei welchem eine Heraederkante 1 1/2 Zoll lang ist; die Linien sind feiner als bei dem Meteoreisen, sonst von derselben Art. Da sie auf der Heraeders fläche parallel gehen den Durchschnittslinien von einem Bergeder mit 4 andern, die in Zwillingstellung mit dem erster stehen, so dass mit den 4 Eckenaren des erster immer eine Eckenare der 4 andere Individuen parallel ist, um welche diese um 180 gedreht erscheis nen, so hielt sie Neumann bei dem Braunauer Eisen auch für die Durchschnittslinien von 5 auf diese Weise regelmäßig verwachsenen Individuen. Andere halten diese Linien für Anzeigen von versteckten Spaltungsflächen, und allerdings würden die Durchschnitte des Heraeders mit dem Jkositetraeder (a:a:1/2 a) oder dem Triakis oktaeder (1/2 a:1/2 a:a) ganz dieselben Linien geben. Ich möchte sie am liebsten mit den Eindrücken vergleichen, die bei allen Kristallen durch die ätzung entstehen und die namentlich Lendolt, der

hervorgeht, dass die geschlissene Fläche in ihrer Lage wenigstens nicht sehr von der Spaltungsfläche abweicht. Das photographische Bild zu dieser Figur hat Hr. Dr. Hrn. Bogel freundlichst dargestellt.

<sup>45</sup> Sikungsberichte der math. naturw. Klasse der k. f. Akad. der Wiss. 15, S. 355.

sie Vertiefungsgestalten nennt, beim Quarz und Aragonit so schön dargestellt und beschrieben hat. Sie haben bei diesen zwar keine Linienform, sondern erscheinen wie vertiefte Eden, sind aber doch häufig linienartig aneinandergereiht. Man hat diese Eindrücke erst bei so wenigen Körpern genau untersucht; sie werden sich gewiss in den verschiedenen Fällen sehr verschieden verhalten.

Ich habe an dem Stücke Fig. 4 versucht, die Fortsetzung der Linien einer Fläche auf den benachbarten zu verfolgen, um zu entscheiden, ob die Linien den Durchschnitten des Hexaeders mit dem Triakisoktaeder oder dem Leucitoaeder parallel gehen, aber ich sand, dass bald das eine, bald das andre der Fall war, wie aus Fig. 1 zu ersehen ist. Die meisten dieser Linien, wie Im und mn, rs und st, ps und sq, gehen allerdings parallel den Durchschnitten mit dem Leucitoaeder, doch andere wie uv und vw parallel den Durchschnitten mit dem Triakisoktaeder. Es ist freilich oft schwer die zusammengehörigen Linien zu erkennen, doch glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich annehme, dass die Durchschnittslinien nach beiden Formen vorkommen.

Neben den ähungstinien sieht man auf der geähten Schnitt oder Spaltungsfläche bei einiger Aufmerksamkeit überall zerstreut noch kleine nadelförmige, metallisch glänzende Kristalle, wie sie Wöhler und v. Reichenbach auch bei anderen Meteoreisen beobachtet haben (vgl. oben S. 38), hervorragen. Beide Beobachter sahen schon, dass sie häufig untereinander parallel, und die Ursache des Schillerns der geähten Flächen in bestimmten Richtungen sind. Bei dem Braunauer Eisen kann man nun auf das bestimmte sehen, dass sie eine untereinander und in Bezug auf das Eisen, worin sie ein

gemengt sind, ganz bestimmte Lage haben. Ich konnte dies recht gut beobachten bei einem kleinen Stücke, das durch zwei natürlis che Spaltungfflächen und durch eine Schnittfläche begrenzt ist, die ungefähr die Richtung einer Dobekaederfläche hat. Es ist in Taf. 1. Fig. 3 in etwas vergrößertem Maßstabe dargestellt; die zwei natürlichen Spaltungfflächen sind mit A und C, die angeschliffene Fläche mit D bezeichnet; auf der Hinterseite ist das Stück durch die natürliche Oberfläche begrenzt. Man kann hier deutlich sehen, dass kleine prismatische Kristalle auf jeder Spaltungsfläche mit ihren Hauptaren in zwei den Kanten der Spaltungflächen parallelen Richtungen, die Kristalle also in dem ganzen Stücke nach den dreis erlei Heraederkante d. i. nach drei untereinander rechtwinkligen Richtungen liegen. Auf der Schliffsläche, der Dodekaederfläche, sieht man nur Kristalle, die parallel der Heraederkante liegen, als deren Abstumpfungsfläche die Dodekaederfläche erscheint und die auch hier wie die Kristalle auf den Spaltungflächen in ihrer wahren Länge erscheinen. Dreht man die Fläche Dum die ihr parallele Heraederkante, so reflektieren eine große Menge der kleinen Kristalle zu gleicher Zeit das Licht, so wie man in die Richtung der zu der Kante gehörenden Heraederflächen kommt, also der Flächen C und der dritten Heraederfläche B, von der bei dem Stücke auf A immer noch Spuren zu sehen sind; die Seitenflächen dieser kleinen Rristalle sind also selbst wie die Heraederflächen rechtwinklig gegeneinander geneigt, die Kristalle also quadratische Prismen, die nicht nur mit ihren Hauptaren parallel einer der 3 Heraederkante, sondern auch mit ihren Seitenflächen parallel den 2 Hexaederflächen dieser Kante liegen. Indessen schillert das Stück noch in anderen Richtungen dazwischen, so dass sich hieraus nur ergibt, dass die Rristalle entweder noch mehrere Seitenflächen haben oder wenn sie nur quadratische Prismen mit ihren Seitenflächen nicht überall untereinander parallel liegen.

In Fig. 3 sind diese kleinen Kristalle auf den Flächen A, C, D durch kleine Stricke und Punkte bezeichnet, je nachdem man sie im Längs oder Querschnitt sieht; doch soll durch sie nur ihre Lage im Allgemeinen angegeben werden, sie sind willkürlich hineingezeichnet, in der Natur sind sie sehr ungleich verteilt und liegen bald einzeln, bald gruppenweise beisammen. Diess letztere sieht man besonders bei einem Stücke des Braunauer Eisens der Berliner Sammlung, an welchem eine Fläche, ungefähr in der Nichtung einer Oktaedersläche, angeschlissen ist; man sieht hier nur die Querschnitte der Kristalle; durch das gruppenweise Beisammensliegen erscheint aber die Fläche wie gesprenkelt. Bei dem Stücke Fig. 3 sind auf der Fläche D, die der Kombinationskante mit C parallel liegenden Kristalle in großer Menge vorhanden.

Noch deutlicher alf mit bloßen Augen erscheinen die kleinen einsgewachsenen Rristalle, wenn man von der geäßten Fläche einen Hausenblasenabdruck macht und diesen unter dem Mikrostop bestrachtet. In Fig. 5 (Taf. 1) sind diese nadelförmigen Rristalle nur klein, und es sinden sich zufällig hier meistenteils auch nur solche, die auf der Fläche C senkrecht stehen, also nur ihre Querschnitte zeigen. Viel größer als in dem Eisen von Braunau sind sie in dem von Seeläsgen, von dem Fig. 4 Taf. 2 die Zeichnung einer geäßten Schnittsläche in natürlicher Größe ist. Die Fig. 6-8 Taf. 1 sind Zeichnungen von Stellen der Fläche einer anderen ähns

lichen Platte dieses Eisens in 140-maliger Vergrößerung, die wie Fig. 5 Taf. 1 dargestellt sind. 46 Man sieht in denselben Querund Längsschnitten der Prismen, und lettere in zwei untereinander rechtwinkligen Richtungen, worauf sich ergibt, dass die Schnittfläche parallel einer Heraederfläche geht. Die Prismen erscheinen hier auf das bestimmte als quadratische, aber man sieht zugleich, dass, wenn auch ihre Hauptaren einer der Heraederkante, doch ihre Seitenflächen nicht immer den Flächen derselben parallel gehen, und dies scheint überall der Fall zu sein, wie man dies auch beim Drehen der Fläche D Fig. 3 beobachten kann, wie eben gezeigt ist. In Fig. 6 sind zufällig die einen der horizontal liegenden Kristalle außerordentlich groß und scheinen hier an den Enden mit der geraden Endfläche begrenzt zu sein, während sie in Fig. 9 Taf. 1, welche eine Stelle von der Fläche D Fig. 3 darstellt, doch eine andere Endkristallisation zu haben scheinen. In Fig. 5 und 8 Taf. 1 erscheinen die Kristalle nicht mit ganz parallelen Kanten, was hier offenbar davon herrührt, dass die Schnittfläche nicht genau parallel einer Heraederfläche geht.

Es scheint mir zweckmäßig, diese kleinen eingewachsenen Rristalle mit einem besonderen Ramen zu bezeichnen, ich werde sie daher in dem Folgenden mit dem Namen Rhabdit, von  $\rho\alpha\beta\delta$ os [rhabdos] der Stab, benennen.

Außer diesen seinen Rhabdit-Kristallen sinden sich in dem Braunauer Eisen noch andere etwas größere unregelmäßig, zum Teil auch regelmäßig begrenzte Einmengungen, die von der verdünnten Salpetersäure auch nicht angegriffen werden und beim äßen des Ei-

<sup>46</sup> Das Eisenkorn, welches die Fig. 6 Zaf. 1 gezeichnete Stelle, sowie den später zu erwähnenden dreieckigen Einschluss enthält, ist Fig. 7 in natürlicher Größe gezeichnet.

sei der Auflösung des Eisens in Salpetersäure oder Chlorwasserschoffsäure bleiben diese Einmengungen zurück, und man erkennt in dem Rückstande Kristalle mit regelmäßigen Formen. Fischer sah darin längliche, rechtwinklige Tafeln<sup>47</sup>; ich sah unter dem Mikrosstop diese und andere Formen, doch war die angewandte Menge zu gering, um genügende Beobachtungen zu machen.

Von größer Einmengungen finden sich kleine runde oder länglische Parthien von Troilit, auf dessen geäßter Fläche kleine glänzens de Punkte erscheinen, der also wohl Nickeleisen in feinen Teilen beigemengt enthält. In der Nähe dieses Troilit werden auf der geäßten Fläche die äßunglinien wohl feiner, gehen aber in völlig unveränderter Nichtung bis zu ihm fort. Das erstere ist wohl nur eine Folge davon, dass der Troilit viel leichter auslöslich ist als das Meteoreisen, und die Salpetersäure in der Nähe des Troilit durch seine Auslösung noch mehr verdünnt wird, so dass sie auf das Meteoreisen in der Nähe des Troilit nur eine schwächere Einwirkung ausüben kann.

Die beiden oben S. 34 und S. 46 erwähnten Stücke def Braunauer Eisens in dem Berliner Museum haben beide zum Teil noch ihre natürliche Oberfläche mit ihrer rundlichen Erhabenheit und Bertiefungen und ihrer dünnen Decke von Magneteisenerz, und ebenso kann man unter dieser die 1 bis 1 1/2, Linien dicke Lage erkennen, in welcher das Eisen ganz körnig geworden ist. 48

2) Claiborne, County Alabama V. St., gefunden 1838. Eine 3 Zoll lange und 1 Zoll breite geschnittene Platte von Hrn. v.

<sup>47</sup> Pongendorff Ann. B. 73. S. 592.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Vergl. oben S. 42.

Reichenbach in Tausch erhalten. Sie gleicht der Platte des Braunsauer Eisens, die parallel der Oktaedersläche geschnitten ist und zeigt daher außer den ätzungslinien die Querschnitte des eingemengten Rhabdit. Außerdem kommen noch einige größere graue, metalslisch glänzende Einmengungen vor, die teils eine Körnerteils eine Radelform haben. Eine Bruchsläche befindet sich daran nicht.

- 3) Saltillo (Santa Rosa), Neu-Mexico, gefunden 1860. Zwei kleine Platten vom Prof. Shepard durch Tausch erhalten. Sie zeigen die äßelinien und Rhabdit-Kristalle sehr deutlich.
- b) Meteoreisenmassen, welche Aggregate grobkörniger Indivisuen ohne schalige Zusammensezung sind,

## Zu diesen gehört besonders

4) das Meteoreisen von Seeläsgen bei Schwiedus im Reg.» Bezirk Frankfurt in Preußen, gefunden 1847. Dasselbe besteht aus einer Menge größerer und kleinerer anscheinend unregelmäßig begrenzter und unregelmäßig verbundener Zusammensekungstücke, die auf den geäkten Schnittslächen die grüßte ähnlichkeit mit den Schnittslächen des Braunauer Eisens zeigen. Fig. 4 Taf. 2 ist die schon oben S. 47 erwähnte Zeichnung einer geäkten Schnittssläche dieses Eisens auf der Berliner Sammlung. Man sieht auf den einzelnen Zusammensekungsstücken die äkungslinien sehr schön, meistenteils die, weiche den Linien df, ef und db in Fig. 2 Taf. I entsprechen, doch auch die andern angegebenen. Die Linien eis ner Richtung herrschen gewöhnlich vor, aber diese vorherrschenden

Linien und somit alle übrigen liegen in den meisten Zusammensettungstücken untereinander verschieden und nur in einigen fast oder ganz gleich. Man sieht ferner auch ohne Lupe die kleinen Rristalle des Rhabdit sowohl in ihren Längs als Querschnitten als fleine Stricke oder Punkte und erstere auf den Zusammensezungs stücken, bei denen die Schnittfläche ungefähr parallel einer ihrer Spaltungsflachen geht, in zwei ungefähr aufeinander rechtwinkligen Richtungen. Noch besser sieht man sie auf dem Hausenblasenabdruck unter dem Mikrostop, wie sie in den schon oben beschriebenen Fig. 6-5 Tal. I dargestellt sind, Masche Stellen erscheinen auch gesprenkelt, kurz man sieht alle Erscheinungen, die das Eisen von Braunau dargeboten hat. 49 Bei einer bestimmten Beleuchtung erscheinen die einen Zusammensetzungstücke glänzend und von fast dunkel bleigrauer Farbe, während die andern matt und von lichterer stahlgrauer Farbe sind. Diese bekommen dann in anderer Richtung mehr Glanz, wenngleich der Unterschied der Farbe bleibt. Es erhält auf diese Weise die geäßte Fläche das Ansehen von Damast, womit man dieselbe schon öfter verglichen hat. In der Zeichnung Fig, 4 Taf. 2 ist dies dadurch darzustellen versucht, dass den letteren Zusammensekungstuden ein etwas grauer Ton gegeben ist, Die glänzenden Stücke haben zuweilen eine übereinstimmende Streis fung, aber keineswegs immer, was man oft bei zwei dicht aneinander Grenzenden sehen kann. 50 Worauf also diese gleiche Spiegelung beruht, kann ich nicht angeben.

Troilit ist häufig in dem Eisen von Seeläsgen eingemengt und

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Die ätzelinien und Rhabbit-Aristalle sind in der Zeichnung Fig. 4 nur zum Zeil angegeben, es war nicht möglich, alle Einzelheiten rollständig wiederzugeben.

<sup>50</sup> Bei den mit n und l bezeichneten Individuen ist die Streifung und die Lage der eingeschlossenen Kristalle ganz verschieden, während sie Joch bei den Individuen n und m ganz gleich ist; und doch haben aller gleiche Glanz.

fündet sich zuweilen in größeren Partien, die teils eine zylinders förmige, teils kuglige, teils unförmliche Gestalt, doch immer eine ziemlich ebene Obersläche haben. Sie sind mit einer etwa eine halbe bis eine ganze Linie dicken Schicht von einer in verdünnter Salpetersäure unlöslichen Substanz, wahrscheinlich einem nickelreischeren Rickeleisen als das Meteoreisen ist, umgeben, die wohl beim äßen etwas bräunlichgelb anläuft und dadurch wohl einige ähnlichsteit mit Eisenkies hat, Joch nicht damit zu verwechseln ist, wie dies öster geschehen ist. Soch nicht damit zu werwechseln ist, wie dies öster geschehen ist. Soch nicht damit zuweilen in kleinen Parthien in dem Troilit eingemengt vor; aber kein Rickeleisen, und Rickelist überhaupt nicht einmal chemisch verbunden in dem Troilit des Eisens von Seeläsgen enthalten, wie oben angegeben (vergl. S. 39).

- 5) Nelson County, Kentucky, Ver. St. N. A., gefunden 1856, ähnlich dem vorigen.
- 6) Union Ctn, Georgia, Ver. St. N. A., gefunden 1853, ebenso.
- 7) Tucuman (Otumpa), Argentinische Rep. 5, A., gefunden 1788. Mit Angaben dieses Fundorts besitzt das mineralogische Musseum 4 Stücke, die demselben auf verschiedene Weise zugekommen und von verschiedenem Ansehen sind. Das Hauptstück besand sich in einer Sammlung von Mineralien, die von dem preußischen Reissenden Sello, der auf Rosten der Negierung Brasilien und die südlich angrenzenden Freistaaten bereiste, aber auf der Neise starb, geschickt waren; es hatte den beiliegenden Zettel: Meteoreisen auf der Provinz Gr. Chaco, Geschenk des Canonego Dr. Bartholo

<sup>51</sup> Eine foldze Troilityartie mit ihrer Umgebung von dem schwerlösslichen Nickeleisen und den Zusammensetzungsestücken des Wetevreisens ist Fig. 5 Zaf. 2 dargestellt.

Muños zu Buenos Aires; es hat geätzt ein ähnliches Ansehen wie das Meteoreisen von Seeläsgen, und nach ihm ist die Stelle in dem Verzeichnis bestimmt.

Die beiden folgenden Stücke, 0,56 und 0,05 Loth schwer, stammen auf der Chladnischen Sammlung und haben den Zettel: Bezirk St. Jago del Estero, Prov. Chaco Gualambo in 5. Amerika; sie sind klein, besonders das eine, können aber dem Ansehen nach wohl mit dem erster vereinigt werden.

Das vierte Stück, 3,11 Loth, war auch in einer der Selloschen Sendungen enthalten und hat auf dem Zettel keine andere Angabe als Meteoreisen auf Tucuman; es ist ein flaches Stück mit feinkörnigem Bruch, gehört also zur 5. Abteilung. Diese Beschaffenheit. scheint mit der des Wiener Stückes aus Tucuman übereinzustimmen, da Partsch (Meteoriten, S. 129) von diesem anführt, dass es dem Eisen vom Senegal, welches zu dieser Varietät gehört, ähnlichsehe. Es muß daher noch unentschieden bleiben, ob die beiden Selloschen Stücke von einer und derselben Eisenmasse stammen oder ob unter Gran Chaco und Tucuman zwei ganz verschiedene Fundorte gemeint sind. Nimmt man an, dass die Stücke von einer Eisenmasse abstammen, und zwar von der großen Masse, die Rubin de Celis besucht, und deren Gewicht er auf 300 Str geschätt hatte, so würde darauf folgen, dass auch die Eisenmeteorit an einer Stelle feinkörnig und an einer andern großkörnig sein fönnen, was bei den Steinmeteoriten zwar häufig vorkommt, bei den Eisenmeteoriten aber noch nicht beobachtet ist.

c) Meteoreisenmassen, welche Stücke eines Kristalls mit schaliger Zusammensetzung parallel den Flächen des Oktaeders sind, d. h. Eisenmassen, die Widmanstättensche Figuren geben.

Meteoreisenmassen dieser Art sind die gewöhnlichsten, wenngleich die Erscheinung nicht überall gleich regelmäßig und deutlich ist. Sie besteht darin, dass das Eisen in der Form des Oktaeders auf lauter übereinander liegenden Schalen parallel den Flächen des Oktaeders zusammengesett erscheint, zwischen denen sich dünne Blättchen von dem in verdünnter Salpetersäure unlöslichen Nickeleisen, welches Reichenbach Tänit genannt hat, befinden, Sie beweist, dass die Kristallbildung ruckweise vor sich gegangen ist; sie hat von Zeit zu Zeit aufgehört, während welcher Zeit sich dann der Tänit abgelagert hat, natürlich in so geringer Menge, dass er die Anziehung und somit die weitere regelmäßige Ablagerung des Meteoreisens nicht verhindert hat. Es ist also eine Bildung, wie sie sowohl bei aufgewachsenen als auch eingewachsenen Kristallen häufig vorkommt, bei aufgewachsenen z. B. beim sogenannten Cap-Quarz aus Devonshire, wo eine geringe Menge von Eisenoryd die Ursache der Schalenbildung ist; bei eingewachsenen z. B. beim Leucit in den Laven vom Vesuv oder bei dem Magneteisenerz in dem Schwedis schen Eisenglanz von Norberg in Westmanland, bei welchem letztere die Schalen wie bei dem Meteoreisen parallel den Flächen des Ottaeders gehen. Hat das Meteoreisen lange Zeit in feuchter Erde gelegen, so orndiert es sich hier an der Oberfläche und ändert sich in Eisenorydhydrat um; die Drydation folgt den Schalen, und es lösen sich oft ganz deutlich oktaedrische Teile ab, wie man dies sehr

schön bei dem Eisen von Cosby und von Arva sehen kann (vergl. S. 37). Legt man nun Schnittflächen durch solche Massen, poliert und ätzt man dieselben, so ragen die Tänitblättchen mit glänzenden Kanten aus dem matten Grunde der Schnittfläche hervor, und ef bilden sich die Widmanstättenschen Figuren, Auf diesen geätzten Schnittflächen kann man die Stärke und gegenseitige Stellung dieser Schalen am bester erkennen, wenn erstere auch von der Lage des Schnitts gegen die Schalen abhängig ist. Man sieht dann, dass sie in der Regel nur eine halbe Linie, zuweilen aber auch 1 bis 2 Linien dick sind, wie z. B. bei dem Eisen von Bohumilis. Wo sie aber diese Dicke erreichen, haben sie nicht so ebene Flächen, und die Tänitblättchen zwischen den Schalen sind in dem Maaßen unebener. Zuweilen sind sie aber überaus geradslächig, wie z. B. bei dem Eisen von Elbogen, Agram, Teras, Tazewell u. s. w., so dass man: bei den Abdrücken von den geätzten Schnittflächen derselben mit ziemlicher Genauigkeit die Winkel, die die Schalen untereinander machen, messen und danach die Lage des Schnitts in der Eisenmasse bestimmen kann. 52

Durch Einwirkung der verdünnten Salpetersäure zeigen sich auf den Querschnitten der Schalen die äkungslinien mehr oder weniser beutlich und mehr oder weniger eng nebeneinander liegend. Dadurch dass gewisse Richtungen bei diesen Linien vorherrschen und

<sup>52</sup> Bei dem Abdruck 3. B. von der geätten Schnitte der Elbogener Masse, der sich in die oben angeführten Werke von v. Schreibers befindet (vergl. oben S. 34), machen M die drei schmalsten und geradlinigsten Streisen Winkel von 64°, 60 1/2° und 55 1/2° (in der beistehenden Zeichnung mit a, b, v bebe zeichnet), die von den Winkeln eines gleichseitigen Dreiecks nicht viel abweichen, daher der Schnitt der Eisenmasse Seinabe E parallel einer Oktaedersläche geführt ist. Die Schalen, die der vierten Oktaedersläche parallel geben, schneiden daher die Schnittsläche unter einem sehr spissen Winkel, ihre Durchschnitte sind h breiter und unregelmäßiger, und ihre genaue Richtung ist nun auch schwerer zu messen. Sie haben eine solche Nichtung, dass ihre Durchschnitte mit der Schnittsläche einer Linie parallel gehen, die von a auf der gegenüberliegenden Seite so trist, dass sie mit diesem Winkel von ungefähr 80° und 100° bildet und der spisse Winkel d dem Winkel h gegenüber liegt.

diese verschieden liegen in den verschiedenen Schalen, erhalten auch die Schnittflächen dieser Meteoriten das damaskähnliche Ansehen, wie die der vorigen Abteilung. Zuweilen haben aber nebeneinander und auch auf angrenzenden Schnittflächen ganz gleich gelegene Schalen ganz verschieden liegende ätzungslinien, wie ich dies z. B. ganz bestimmt bei dem Eisen von Schwetz beobachtet habe und zuweilen erscheinen selbst dieselben Schalen mit denselben ätzungslis nien auf der einen Hälfte glänzend und auf der andern matt; der Glanz richtet sich oft gar nicht nach den Schalen, die geätzte Fläche ist streifenweise glänzend und streifenweise matt, wie dies bei dem Eisen von Bohumilik zu beobachten ist, und zuweilen erscheint jede Schale körnig und die körnigen Zusammensezungsstücke verschieden gestreift, wie bei Ruff mountain, wo diese Zusammensezung auch Reichenbach hervorhebt. Es sind dies alles Verhältnisse, die noch der Erklärung bedürfen, die aber doch zum Teil von derselben Art sind wie bei dem Eisen von Seeläsgen, wo die Zusammensetzungs stücke, wie es scheint, unregelmäßig nebeneinander liegen, daher es doch wohl sein kann, dass ungeachtet der unregelmäßigen Form der einzelnen Zusammensetzungstücke ihre Lage gegeneinander doch eine gewisse Regelmäßigkeit haben kann.

Wie die ätzungstinien, so sieht man auch die Rhabdit-Aristalle teils in ihren zwei auseinander rechtwinkligen Längsschnitten, höchstens liniengroß, teils in ihren Querschnitten als Punkte; recht deutlich z. V. bei dem Eisen von Miskeca, und es findet hier auch dasselbe statt, was bei den ätzungstinien erwähnt ist, dass ihre Stellung in zwei benachbarten Schalen nicht immer gleich, ja oft ganz entgegengesett ist.

Außer dem Tänit und Rhabdit enthalten die Schalen noch eine andere bei der äßung glänzend bleibende Substanz von stahlgrauer Farbe eingeschlossen. Sie findet sich meistens in plattenförmigen Stücken stets in der Mitte der Schalen und diesen mit ihren breis ten Flächen parallel, und erscheint in manchem Meteoreisen recht häufig, wie z. B. in dem Eisen von Arva, Sarepta, Cosby und Lenarto, und wie dies in den schönen, schon oben S. 33 erwähnten Abdrücken, die Haidinger von den geätzten Schnittflächen der beiden ersten Eisenmassen bekannt gemacht hat, zu sehen ist. Auf der Schnittfläche erscheinen die Körner und Plättchen oft voller fleiner Vertiefungen, was dadurch entsteht, dass sie spröder als die umgebende Masse sind, und daher beim Schleifen des Meteoreisens einzelne Teile von ihnen leicht "herausgerissen werden. Reichenbach hat diese Körner und Plättchen wegen ihres starken Glanzes, den sie auch nach der ätzung behalten, Lamprit genannt; sie sind aber offenbar dasselbe, was Haidinger schon früher bei dem Arva-Eisen Schreibersit genannt hat,53 daher der ältere Name größere Ansprüche hat, beibehalten zu werden.

Der Schreibersit und die Rhabdit-Aristalle sinden sich jedoch nicht in jedem dieser Eisenmeteoriten. Während der Schreibersit in den genannten Meteoriten in verhältnismäßig großer Menge vorkommt; sindet er sich in den Meteoriten von Schweß, Mistesca, Vohumiliß u. s. w. gar nicht, dagegen in diesen letzteren wiederum der Rhabdit: in großer Menge erscheint, Veide Substanzen scheinen sich' demnach einander förmlich außuschließen, In dem Arva-Eisen kommen zwar beide auf eine ausgezeichnete Weise

<sup>53</sup> Vergl. darüber auch Haidinger in den Sitzungsber. d. math. naturw. Kl. d. f. Atad. d. Wiff. von 1862 B. 46.

vor, aber sie finden sich doch auch hier nicht beide in einem und: demselben Stücke, denn die einen enthalten Schreibersit, die ans dern nicht, eine Ungleichheit, die schon Partsch, Reichenbach und Haidinger bei diesem Eisen angegeben haben. Die, welche keinen Schreibersit haben, enthalten dafür den Rhabdit. Es wäre demnach wohl möglich, dass beide nur verschiedene Arten des Vorkommens einer und derselben Substanz wären, und was man von der chemis schen Zusammensetzung dieser Massen kennt, ist dem nicht entgegen. Beide müssen wenigstens Phosphor enthalten, denn dies ergibt sich darauf, daff derselbe sowohl von Reinhold von Reichenbach in der Schreibersit führenden Abänderung des Arva-Eisens,54 alf auch von Berzelius und Rammelsberg in dem Rhabdit führenden Meteoreis sen von Bohumilik gefunden ist. Da nun diese Eisenmassen von den in verdünnter Salpetersäure schwer löslichen Substanzen, so viel man weiß, nur noch den Tänit enthalten, derselbe aber nach Reinhold von Reichenbach keinen oder nur eine unbedeutende Menge von Phosphor enthält (vergl. oben S. 37), so muss er sowohl in dem Schreibersit als auch in dem Rhabdit enthalten sein, Sollte durch fortgesette Untersuchungen es sich bestätigen, dass Schreibersit und Rhabdit dieselbe Substanz sind, so muss natürlich der Name Rhabdit fortfallen.

Von den nach verschiedenen Richtungen gehenden Schalen des

<sup>54</sup> Vergl. Pongendorff Ann. 1863 V. 119, S. 172. Ef ist bier zwar nicht besonders angegeben, dass das untersuchte Stück eine Schreiberstt führende Abänderung des Arva-Eisens ist, doch kann ich dies insofern bezeugen, als das von Reichenbach, dem Sohne, analysierte Stück auf dem Verliner Museum stammt, Reichenbach, der Vater, nämlich, dem bei seiner letzen Anwesenheit in Verlin die vielen eingeschlossenen Schreiberster-Körner in mehreren Stücken des Arva-Eisens des Verliner Museums aussielen, während eine große Masse des Arva-Eisens in seiner Sammlung diese gar nicht enthielten, hat sich eins dieser Verliner Stücke in Austausch gegen ein anderes auf seiner Sammlung auf, um es von seinem Sohne analysieren zu lassen, und so möglicher Weise die Zusammensezung des darin eingeschlossenen Schreiberstif zu erfahren. So entstand die oben angessührte Abhandlung in Vongendorsst Ann., die nun zwar nicht die genaue Zusammensezung des Schreiberstif, doch aber bestimmt aussnachte, dass der Phosphorgehalt dieses Weteoreisens von ihm herrühre.

Meteoreisens werden öfter ectige Näume eingeschlossen (Zwischenfelder, wie sie v. Schreibers nennt), die mit einem Meteoreisen erfüllt find, das mit ganz dünnen, untereinander parallelen Blättchen eis ner in verdünnter Salpetersäure unlöslichen Substanz durchsett wird. Die Blättchen haben in demselben Raum bald eine bald mehrere Richtungen und gehen bald den Schalen, die sie einschließen, parallel, bald nicht. Ef kann fraglich sein, ob sie auf Tänit oder Schreibersit bestehen, doch möchte das erstere wahrscheinlicher sein, was auch die Meinung von Reichenbachs ist (vergl. oben S. 36). Solche Räume sind dieser Abteilung besonders eigen; ich habe zwei solcher nicht weit voneinander liegender Räume, die bei dem Eisen von Bohumilitz vorkommen, mit a und b bezeichnet, in Fig. 6 Taf. 1 in natürlicher Größe und in Fig. 7 25-mal vergrößert dargestellt. In der letteren Kig. sieht man, dass der Raum a eigentlich auf 3 Näumen besteht, deren jeder seine bes sonderen Blättchen hat, die in jedem nach mehreren Richtungen geben, die sich gegenseitig durchschneiden. Auch der Raum 2 ist, soweit er gezeichnet ist, aus zweien zusammengesett, die aber beide nur Blättchen in einer Richtung enthalten. Die Räume a und b sind von den Schalen des Meteoreisens c, d, e, f und g umgeben, die die äkelinien und die Rhabdit-Kristalle zeigen, die aber nur unvollständig in der Fig. wiedergegeben sind.

In der Ede von a Fig. 7 befindet sich noch eine Bildung h, die eine besondere Beschaffenheit hat; sie ist in Fig. 8 besonders und 140-mal vergrößert dargestellt. Sie zeigt auf der Schnittsläche ungefähr parallellaufende gegliederte Streifen, zwischen denen sich kleine Körper befinden, die wie Kristalle aussehen. Dergleichen

Vildungen finden sich in dem Eisen von Bohumilit häufig, oft von noch bedeutenderer Größe, und kommen mit ähnlichen überein, die sich auch in dem Eisen von Seeläsgen finden, wo nur die kleinen Kristallähnlichen Körper sehlen. Eine solche ist in Fig. 7 und 6 Taf. I in natürlicher und 140-maliger Vergrößerung dargestellt.

In dem Folgenden ist das Meteoreisen dieser Abteilung in der Ordnung aufgeführt, dass zuerst die Abänderungen mit den dicken Schalen und dann die mit den dünner folgen.

- 8) Bohumilik, Prachimer Kreis in Böhmen, gefunden 1829. Eine große dicke Platte, an 3 Seiten mit natürlicher Obersläche begrenzt und eine kleine dünne Platte. Fig. 6 Taf. 2. Die Schalen sind 1 bis 2 Linien dick, ziemlich geradslächig, die äkelinien auf denselben sehr deutlich, der eingemengte Rhabdit im Allgemeinen nicht groß, in einigen ziemlich häufig, in andern weniger. Die mit Tänit erfüllten Räume zwischen den Schalen des Meteoreisens (a und b in Fig. 7 Taf. 2) nicht selten, gewöhnlich aber nur klein. Die große Platte enthält mehrere Parthien von Grafit eingemengt, die mit einer bei der ätzung glänzend gebliebenen, stahlgrauen Rinde umgeben sind.
- 9) Brazof, Texaf, V. St. 1856, kleinef Stück, ähnlich dem vorigen.
- 10) Denton County, Texas, V. St. 1856. Kleines Stückebenso.
- 11) Arva (Szlanicza) Ungarn. 1844. Sechs meistens ziemlich große Stücke, teils Platten, teils Stücke, die noch größere Teile der orpdierten natürlichen Oberfläche zeigen. Die Stücke sind insteressant durch ihre ungleiche Struktur (val. oben S. 55). Vier

derselben enthalten in der Mitte der Schalen, die bei allen von gleis cher und von derselben Stärke, wie bei dem Eisen von Bohumilik sind, eine große Menge von Körnern und Platten von Schreis bersit, die nach dem äßen der Masse sehr glänzend hervortreten, während zwei andere deren gar nicht, dagegen den Rhabdit und diesen von einer Größe der Kristalle enthalten, wie ich sie kaum bei einem anderen Meteoreisen. gesehen habe; sie sind zuweilen über eine Linie lang und die guadratische Gestalt ihrer Durchschnitte ist mit der Lupe oft recht deutlich zu sehen. Die ätzelinien sind bei beis den Abänderungen auf: den geätzten Flächen vorhanden, aber in beiden meistenteils nur schwach. Das Meteoreisen ist nach dem äßen nur matt, wenngleich auch hier bei einer bestimmten Beleuchtung bei gewissen Schalen glänzender als bei andern. An einer Platte der zweiten Abänderung findet sich eine platt-zylinderförmige, durch die Dicke der Platte hindurchgehende Masse von Troilit, die feinen Körnchen von Nickeleisen (?) eingemengt enthält, und mit einer Hülle einer auch nach dem äßen metallisch glänzend bleibenden, spiesgelben Substanz umgeben ist.

12) Cosby Creek, Coke County, East-Tennessee, V. St. 1840. Mehrere auf der Oberfläche orydierte oktaedrische Bruchstücke von Hrn. Prof. Troost als Geschenk erhalten, zugleich mit einzelnen kleinen Stücken Grafit und Troilit auf demselben. Die Stücke gleichen der ersten Abänderung des Arva-Eisens außerordentlich, die Menge des eingemengten Schreibersits ist an einem Stücke noch etwas größer. An einem Stücke Grafit ist etwas Troilit eingemengt.

Verschieden von diesem Meteoreisen ist ein anderes, welches Hr. Ehrenberg ohne nähere Angabe des Fundorts als aus Tennessee von

- Hrn. C. T. Adae in Cincinnati Ver. St. erhalten<sup>55</sup> und dem mineralogischen Museum übergeben hatte. Den Erscheinungen der äkung nach würde sich dieses vielmehr den grobkörnigen Abänderungen, wie der von Seeläsgen anreihen lassen. Dies erkannte auch Hr. Shepard, als er das Stück im hiesigen Museum sah, wusste es aber doch keinem anderen bekannten Meteoreisen der Ver. Staaten zu vergleichen, daher ich dies Stück nur als Anhang hier aussühre.
- 13) Sarepta, Gouv. Saratow, Ruffland 1854. Drei Stücke, eine große Platte, die 8 Joll lang, 3 1/2 Joll breit und einen Joll dick ist, ein kleines Stück und eine 2 Joll lange und 1/4 Joll dicke Platte. Die erste Platte ist am Rande rund herum mit natürlicher Oberfläche begrenzt und lässt hier auf der einen Seite die runde Wölbung der gefundenen Masse sehr gut erkennen. 56 Die natürliche Oberfläche hat stellenweise ganz das Ansehen des Braunauer Eisens. und ist hier nur mit einer dünnen Rinde von Eisenoryd-orydul bedeckt, daher die Masse nicht lange Zeit in dem Boden, wenigstens nicht in einem feuchten gelegen haben kann. — Das zweite Stück hat keine, die kleine Platte an den Rändern nur zum Teil natürlis che Oberfläche. Die drei Stücke zeigen aber vollkommen denselben Unterschied wie das Arva-Eisen. Während die beiden ersten Stücke der ersten Abänderung des Arva-Eisens gleichen, enthält die dritte Platte gar keinen Schreibersit, dagegen den Rhabdit in großer Menge.<sup>57</sup> Die Schalen sind bei diesem Stücke noch dicker als bei

<sup>55</sup> Vergl. Monatsber. der k. Pr. Akad. d. Wiff. von 1861, S. 517.

<sup>56</sup> Vergl. die Abbildung und Veschreibung berselben in den Sitzungsberichten der k. Akad. der Wiss. von 1862 V. 46. Das in der Wiener Sammlung befindliche Stück dieses Eisens, wovon Haidinger seiner Abhandlung einen so vortresslich geratenen Abdruck hinzugesügt hat, ist die Hälfte einer ähnlichen Platte, wie die des Verliner Museums.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Die Stüde sind indessen unzweiselhaft von derselben Masse. Dieselbe wurde in der Kalmüdensteppe in der Nähe der Herrnhuterkolonie Sarepta an der Wolga gefunden, und von Hrn. Glitsch nach Moskau gesandt, wo

den beiden andern, und die eine Schnittfläche derselben hat ganz das Ansehen einer Schnittfläche des Seeläsgen-Eisens, und scheint hier ganz aus unregelmäßigen Zusammensekungsstücken zu besteben. Einzelne nach der äkung glänzend bleibende Körnchen, die hier eingewachsen sind, haben eine lichte speisgelbe Farbe, wie die Substanz, die bei dem Eisen von Bohumilik den Grafit umgibt. Die äkelinien sind überall sehr deutlich Bei der großen Platte sindet sich eine über einen halben Zoll große Troilitpartie, die aus dünnschaligen Zusammensekungsstücken ohne merkliche Umhüllung durch eine andere Substanz besteht.

- 14) Sevier County, Tennessee V, St., 1840. Eine 3 1/2 Boll lange schmale Platte. Sie enthält Schreibersit in ungefähr gleicher Menge wie die ersten Abänderungen: der beiden vorigen Meteoriten, doch sind die Schalen des Meteoreisens etwas schmäler. Die Platte wurde von Hrn. v. Reichenbach in Tausch erhalten. Shepard und Haidinger führen dieses Eisen nicht besonders auf, sondern vereinigen es mit dem Cosby-Eisen. Wesentliche Unterschiede in dem Ansehen der beiden Meteoriten sinde ich nicht, doch habe ich die von Reichenbach angenommene Trennung einstweilen beibehalten.
- 15) Rio Bembegó, Capitanie Bahia, Brasilien 1816. Kleines Stück, Geschenk von Al. v. Humboldt, der es von A. F. Mornan erhalten hatte. Die Schalen zeigen äßunglinien und Rhabdit, keinen Schreibersit.
  - 16) Schwet, Reg. Bezirk Marienwerder, Preußen 1850. Das

Hr. Dr. Auerbach sie absormen und sodann zerschneiden ließ. Mehrere Stücke wurden darauf zum Verkaufe nach Herrnhut gesandt; von hier, und zwar durch Hrn. Möschler habe ich die beiden ersten Stücke, die dritte Platte von Hrn. Auerbach selbst erhalten.

Berliner Museum, durch den Baurat Knoblauch, auf die bei dem Durchstich eines Sandhügels für die Ostbahn gefundene Eisenmasse, und deren wahrscheinlich meteorischen Ursprung aufmerksam gemacht, erhielt durch den Geh. Rath Wernich fast die ganze der etwas über 43 Pfund schweren Eisenmasse, Sie war, als sie vom Museum erhalten wurde, schon in 3 Stücke zerschlagen, wobei der Sprung natürlichen Klüften folgte. Das größte jett noch im Museum befindliche Stück, das noch 10 Pfund 1,21 Loth wiegt, ist zum Teil von der natürlichen Oberfläche, zum Teil von der Kluftfläche begrenzt, die an einer Seite unter spizem Winkel zusammenstoßen. Die erstere ist sehr orndiert, die letztere matt und schwarz, sonst aber wohl erhalten; sie ist hakig und zeigt schon die schalige Zusammensetzung der Masse sehr deutlich. Dieselbe gibt beim äten sehr schöne Widmanst. Figuren, wie in dem Abdruck, den ich meiner Beschreibung dieses Eisens in Pongendorffs Ann. 58 hinzugefügt habe, zu sehen ist. Die Querschnitte der Schalen sind darin etwas frumm, was wohl eine Folge, der beim Zerschlagen der Masse angewandten Gewalt ist. In den geätzten Schalen des Meteoreisens sieht man die ätzelinien sowie auch den Rhabdit sehr deutlich. Troilit ist nur in kleinen Partien eingemengt. An einem Stücke der Sammlung findet sich mitten im Eisen ein kleines Korn von Chromeisenerz. Schreibersit ist nicht zu sehen.

17) Ruffs Mountain, Newberry, Süd-Larolina, Ver. St. 1850. Eine dicke Platte, an einer Seite mit natürlicher Oberfläche. Sehr merkwürdig durch die körnige Beschaffenheit der Eisenschalen, wie schon oben S. 35 bemerkt. Die körnigen Zusammensezungsstücke

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> **3.** 83, **5**. 594.

einer und derselben Schale sind bei einer bestimmten Beleuchtung teils glänzend, teils matt; aber es sind nicht einzelne Zusammenssehungsstücke, die auf diese Weise miteinander abwechseln, sondern meistenteils immer wieder körnige Partien, eine schwer zu erklärende Erscheinung. Schreibersit in nicht großer Menge eingemengt.

- 18) Seneca River, New York, Ver. St. 1851. Kleines Stück. Die Meteoreisenschalen ebenfalls körnig, in den dickeren Schreiberssit. Mit dünnen Tänitblättchen ausgefüllte Zwischenfelder häufig.
- 19) Toluca-Thal, Mexico 1784. Von den vielen Eisenmassen, die in dem fast 3 Meilen langen Raume des Toluca-Thales von einigen Unzen bis zu mehreren Etrn. schwer, gefunden sind, und wahrscheinlich alle von einem Falle herrühren, 59 besitzt das Berliner Museum mehrere schöne Stücke; eine große Platte, einen Fuß lang, 7 Zoll breit und 10 Pfund 12,8 Loth wiegend, von Hrn. Shepard erhalten; eine kleinere Platte 5 1/2, Zoll lang und beinahe 4 Zoll breit, von Hrn. G. A. Stein erhalten, der die 230 Pfund schwere Masse, von der sie abgeschnitten, selbst aus Meriko mitgebracht halte; ein überall mit Rinde umgebenes, größeref Stüd von der Form einer plattgedrückten Rugel, von Hrn. Krant erhalten, vor ihrer Teilung in 2 platte Stücke 3 Pfund 1,814 Loth schwer; ein kleineres, mehr zplinderförmiges Stück 24,93 Loth schwer, von dem k. Pr. Minister-Residenten in Washington Hrn. von Gerolt zum Geschenk erhalten, und mehrere andere fleinere Stücke, darunter eins aus der Chladnischen Sammlung, bei welchem freilich nur als Fundort Mexico angegeben war, das über den durch ätzung erhaltenen Figuren nach hierhergehört. Alle

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Bal. Burfart in Leonhard u. Bronnf n. Jahrb. f. Mineral. etc. von 1856, S. 297.

diese Stücke verhalten sich bei der ätzung sehr ähnlich; sie geben alle sehr schöne, überall gleiche Widmanst. Figuren und beweisen dadurch, dass sie alle einem Falle angehören. Die Schalen sind mehr als liniendick, sehr gerade und deutlich gestreift. Der Rhabdit ist darin sehr fein, in den meisten Stücken der Sammlung sieht man größtenteils nur die Querschnitte der kleinen Kristalle, was ein geflecktes Ansehen der Schalen hervorbringt. Bei gewisser Beleuchtung sind dieselben theilf glänzend teils matt, wie besonders bei dem Stücke des Dr. Krank, und zwar sind auch hier nach allen Richtungen laufende Schalen teilf glänzend, teilf matt, Schreibersit findet sich nicht, dagegen noch Partien von Troilit und Grafit. Die große Platte enthält ersteren in großer Menge und in Partien, die über 2 Zoll lang sind. Gewöhnlich kommen Troilit und Grafit miteinander verbunden vor, doch finden sie sich auch voneinander getrennt, und ebenso kommen beide mit einer Hülle einer speisgelb gefärbten, metallischen Substanz umgeben vor, finden sich aber auch ohne dieselbe. Das Steinsche Stück enthält den Troilit nur in kleineren Partien; Grafit habe ich darin nicht bemerkt. Daff in diesem Eisen zuweilen auch Duarz in sehr kleinen Kristallen vorkommt, zeigt das Stück im Besitz des Dr. Nagel in Berlin (vgl. oben S. 42), wo er allerdings nur in der orndierten Rinde beobachtet ist, und endlich haben Wöhler und v. Reichenbach in einem von Stein erhaltenen, ursprünglich 19 Pfund wiegenden Stücke etwas Olivin beobachtet, der indessen in den Stücken der Berliner Sammlung nicht zu sehen ist. Das Krantsche und Geroltsche Stück, welche beide rundum mit natürlicher Oberfläche begrenzt sind, zeigen auf ihr dieselben runden Vertiefungen wie

das Braunauer Eisen, die Oberfläche ist indessen meistenteils schon in Eisenorndhydrat umgeändert, und die durch Schmelzung entstandene Rinde von Magneteisenerz nur stellenweise erhalten. Dass an der Oberfläche des Toluca-Eisens Kranz kleine Oktaeder von Magneteisenerz beobachtet hat, ist oben angegeben (S. 43).

Das Tolucas Eisen ist vielfach chemisch untersucht. Die Analysen, die in Wöhlers Laboratorium nach denselben Methoden mit Teilen von sehr verschiedenen Stücken angestellt sind, 60 haben kein völlig übereinstimmendes Resultat gegeben; die Analysen von Uricoechea und Pugh z. B. Abweichungen im Nickelgehalt von 5,02 bis 9,05 pC., doch bemerkt darüber schon Wöhler, dass bei der gemengten Beschaffenheit des Meteoreisens, wovon immer nur ein sehr kleiner Teil untersucht werden könnte, dies kein Beweis wäre, dass die analysierten Stücke von verschiedenen Meteoriten berührten. Die übereinstimmung der Widmanst, Figuren beweist in diesem Fall besser den gleichen Ursprung aller dieser Massen als. die chemische Analyse. Sind aber die vielen in dem Toluca-Thal gefundenen Eisenmassen eines und desselben Ursprungs, so gehören sie einem der bedeutendsten Meteoritenfälle an, von denen man Runde hat. Bemerkenswert ist, dass Pugh nur in der orpdierten Rinde, die er auch untersucht hat, Rieselsäure, und zwar 7,47 p.C. gefunden hat, In dem Rückstande von Teilen der vom Dr. Stein mitgebrachten Stücke fanden Uricoechea und Pugh auch Körner von Olivin und einigen anderen nicht bestimmten rubinroten und himmelblauen Mineralien. Dergleichen fand auch Böking, ohne sie näher zu bestimmen, und außerdem noch etwas Grafit.

<sup>60</sup> Bgl. Sitzungsb. ber math. \*naturw. Kl. b. f. Akad. b. Wiff. von 1856 B. 20, S. 217 etc.

- 20) Misteca, im Staate Dajaca, Mexico, 1834. Ein parallelepipedisches Stück von 2 Pfd. 13,7 Lth., Abschnitt von eis nem, dem Geh. Bergrath Burkart in Bonn gehörigen Stücke. 61 Es ist von zwei Schnittflächen, einer Bruchfläche und im übris gen von natürlicher Oberfläche begrenzt. Die Schliffslächen zeigen sehr schöne Widmanst, Figuren, die denen des Toluca-Eisens sehr ähnlich, doch dadurch ausgezeichnet sind, dass auf ihnen die eingewachsenen Rhabdit-Kristalle viel größer und zahlreicher sind. Die äkunglinien sind sehr schwach und nur an manchen Stellen sicht bar. Troilit immer in sehr kleinen Partien, doch findet sich auf der einen Schnittfläche eine kleine, krumm zylinderförmige Höhlung, worin Troilit gesessen zu haben scheint. Eine größere runde Rinne auf der Oberfläche war vielleicht früher auch damit gefüllt. Die Bruchfläche ist schwach angelaufen, doch sind darauf die Schalen des Meteoreisens noch aut zu sehen. Die natürliche Oberfläche ist an einer Stelle durch Hammerschläge verlett, an andern zeigt sie die dünne Rinde von Magneteisenerz noch deutlich.
- 21) Sierra blanca, unweit Villa nueva de Huajuquilla in Mexiko, 1784; ein Stück auf der Sammlung des Medizinal-Naths Bergemann, 62 15,28 Loth schwer. Die Widmanst. Figuren sind denen des Toluca-Eisens sehr ähnlich, die ätzunglinien deutlicher, der Rhabdit undeutlicher, kein Schreibersit.
- 22) Tula (Netschaevo) Ruffland 1856. Ein drei Zoll langes, ziemlich quadratisches Prisma mit lauter Schnittslächen bis auf eine der Endslächen, die natürliche Oberfläche ist; von Hrn. Dr. Aus

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Vgl. Burfart a. a. D. S. 305.

<sup>62</sup> Vergl. Burfart a. a. D. S. 278.

erbach in Mostau erhalten. Die Widmanst. Fig. sehr schön, die Schalen so die wie im Toluca-Eisen, die äßunglinien sein, Nhabbit nicht recht sichtbar. Auf einer der Seiten des Prismas sieht man den Durchschnitt einer Einmengung, die sich von einem Ende, fast 5 Linien breit, bis fast zum andern forzieht, wo sie sich auskeilt, Sie besteht aus einem Gemenge von Nickeleisen mit einem harten, schwarzen, matten und undurchsichtigen Silicate. Haidinger hat von dem Stücke der Wiener Sammlung, das mehrere dergleichen Einmengungen enthält, einen Abdruck gegeben, und Auerbach hat neuerdings das Silicat analysiert. Er fand darin:

Eisenorydul	31,64
Magnesia	16,63
Ralk	0,77
Natron	1,22
Rali	0,20
Tonerde	9,93
Rieselsäure	37,76

hält es aber selbst noch für ein Gemenge, da es sich von Chlorwass serstoffsäure nur zum Teil zersetzen lässt.

Was es mit dieser Einmengung für eine Bewandtnis hat, ist schwer zu sagen. Dergleichen Einmengungen sind bei andern Eisenmeteoriten noch nicht vorgekommen. Da die ursprünglich an 600 russische Pfunde schwere Masse, um sie zu zerkleinern, in ein Schmiedeseuer gebracht worden ist, so könnte man glauben, dass die

<sup>63</sup>Sizungsberichte der math. onaturw. Rl. d. f. Afad. d. Wiff. von 1860.

<sup>64</sup> Poggendorff Ann. von 1863, B. 118, S. 363.

Einmengung sich erst durch die Behandlung im Feuer gebildet hat, doch ist das Gemenge des Silicats und des Eisens in demselben so sein, die chemische Zusammensekung des Silicats durch den großen Magnesiagehalt so verschieden von den gewöhnlichen Eisenschlacken, die Widmanst. Fig. in dem Eisen sind so regelmäßig, dass diese Annahme doch ihre Schwierigkeit hat.

- 23) Robertson County, Tennessee, V. St. 1861. Rleines Stück, die Widmanst. Fig. ähnlich denen des Tula-Eisens.
- 24) Carthago, Smith County, Tennessee, V. St. 1844. Ein großes, 1 Pfd. 16,44 Lth. schweres Stück, in Form eines dreiseitigen Prismas, von Hrn. von Neichenbach erhalten. Zwei Seitenflächen sind Schnittslächen, die dritte eine natürliche Klustessiche. Die Widmanst. Fig. sind sehr schön, ähnlich denen des Toluca-Eisens. Troilit ist in kleinen Partien eingemengt. Er hat stets eine kleine Einfassung von Meteoreisen, jenseits welcher erst die Widmanst. Fig. ansangen. In der einen Partie von Troilit ist ein kleines Korn von Chromeisenerz eingemengt (s. oben S. 39).
- 25) Burlington, Otsego County, New York, Ver. St. 1819. Mehrere kleine Stücke, Widmanst. Fig. wie Toluca.
- 26) Marshall County, Kentucky, V. St. 1856, schöne Widmsanst. Fig.; darin ziemlich viel Schreibersit.
- 27) St. Rosa bei Tunja, Columbien, ein ganz kleines Stück, 0,025 Loth schwer, das von Prof. Rarsten aus Columbien mitsgebracht ist. So klein es ist, so konnte ich doch noch eine Fläche anschleifen lassen und ätzen, und daran ganz deutliche Widmanst. Fig. erkennen.

- 28) Drange Fluss, Süd-Afrika, 1856, dünne Platte, ähnlich dem von Marshall Ctv, auch mit etwas Schreibersit.
- 29) Texas (Red River), Ver. St. 1814. Eine 4 Zoll lange, dünne Platte. Geschenk von Hrn. V. Silliman. Schöne Widmsanst. Figuren. Die Schalen etwas schmäler als bei Toluca. Ein wohlgeratener Abdruck von einer geätzten Platte des Texas-Cisens befindet sich in Sillimans Journal.
- 30) Lenarto, Scharosch, Ungarn, 1815. Dicke der Schalen wie bei Texas; sehr seine ätzlinien, in einigen Stücken ziemlich viel Schreibersit, in andern weniger.
- 31) Durango, Mexico, 1804. Ein größeres Stück, 1 Pfd. 2,67 Eth. schwer, und mehrere kleinere, Geschenk von Al. v. Humboldt. Die Widmanst. Fig. noch schmäler als bei dem Texas-Eisen. Troilit in kleinen Partien eingemengt.
- 32) Werchne-Udinst, West-Sibirien, 1854. Eine dicke Platte, 1 Pfd. 4,17 Lth. schwer, an den Rändern bis auf eine Schnittsläche mit natürlicher Oberfläche begrenzt. Lettere ist uneben und mit nur sehr dünner Rinde von Magneteisenerz bedeckt, das in kleinen Vertiefungen, überall aber undeutlich kristallisiert ist. Die Hauptsschen zeigen geätt sehr schöne Widmanst. Fig. Troilit in kleinen Partien hier und da eingeschlossen.
- 33) Elbogen, Böhmen, 1811. Ein 9,92 Lth. schweres Stück, eine dünne Platte und ein aus der Masse geschmiedetes Federmesser; sämtliche Stücke aus der Chladnischen Sammlung. Die Widmanst. Fig. desselben sind aus dem schönen Abdruck in die Werke des Hrn. von Schreibers bekannt.
  - 34) Nebrasta Territorn, Ver. St. 1856.

- 35) Madoc, Ober-Canada 1854.
- 36) Black mountain, Buncumbe Ctv, Nord-Carolina, V. St. 1835.
- 37) Caille, Grasse, Var, Frankreich, 1828. Eine drei Zoll lansge, 5,69 Lth. schwere Platte, Die Widmanst. Fig. sehr geradlinig und schön.
  - 38) Agram (Hraschina), Kroatien, gefallen den 26. Mai 1751.
- 39) Ashville, Buncumbe County, Nord-Carolina, Ver. St. 1839. Schöne Widmanst. Fig., aber sehr schnell rostend.
  - 40) Guildford, Nord-Carolina, Ver. St. 1830.
  - 41) Löwenfluff, Groß Namaqualand, Süd-Afrika 1853.
- 42) Lockport (Cambria), New-York, V. St. 1845. Eine fast zwei Zoll lange Platte. Feine Widmanst. Fig. mit vielen rundslichen, haselnussgrößen Partien von Troilit, die oft zusammensgehäuft, aber stets mit einer dünnen Hülle einer lichten speisgelben Legierung umgeben sind.
- 43) Jewell Hill, Madison County, Nord-Carolina, Ver. St. 1856. Eine ähnliche, nur dickere Platte: ebenfalls sehr feine Widmsanst. Fig.
- 44) Oldham County (Lagrange), Kentucky, Ver. St. 1856. Iwei große, dicke Platten, an den Rändern zum Teil mit natürlischer Oberfläche begrenzt, und eine kleinere Platte. Die Widmanst. Fig. sehr fein.
- 45) Putnam County, Georgia, V. St. 1854. Die Widmsanst. Fig. sehr gerade, sein und zierlich. In dem kleinen Stücke findet sich ein Einschluss von Troilit, in welche kleinen Partien von Rickeleisen eingemengt sind.

- 46) Tazewell, Claiborne County, Tennessee, Ver. St. 1854. Die Widmanst. Fig. sehr geradlinig und in ihnen dünne Streisen von Schreibersit, die sich aber merkwürdiger Weise nur in den Schalen einer Richtung finden, was das Meteoreisen von Tazeswell vor allen übrigen Abänderungen außeichnet. Auch hier kleine Einmengungen von Troilit, der mit einer speisgelben metallischen Einfassung umgeben ist.
- d) Meteoreisenmassen, die Aggregate großkörniger, schalig zusammengesetzter Individuen sind.
- 47) Zacatecas, Mexico, 1792. Ein Meteoreisen von sehr eisgentümlicher Struktur, die nur in einem größeren Stücke erkannt werden kann. Das Verliner Museum besitzt davon neben mehreren kleinen Stücken eine ungefähr rechtwinklige zolldicke Platte, die ungefähr 3 Zoll breit und 3 1/2 Zoll lang, von einem größeren Stücke abgeschnitten ist, das der Geh. Vergrath Vurkart aus Mezico selbst mitgebracht hat. So Die Seiten der Platte werden zum Teil durch natürliche Oberfläche gebildet. Auf der geäßten Hauptssläche, die in Fig. 1 Zaf. 2 dargestellt ist, sieht man, dass dies Meteoreisen aus grobkörnigen Zusammenseßungsstücken besteht, die über zollgroß und unregelmäßig begrenzt sind, und selbst wieder aus Zusammenseßungsstücken bestehen, die parallel den Flächen des Oktaeders liegen, wie bei dem Meteoreisen, das Widmanst. Fig.

<sup>65</sup> Bergl. N. Jahrbuch für Min. etc. von Leonhard und Bronn von 1856, S. 288.

gibt. Diese schaligen Zusammensetzungstücke sind auch nicht sehr regelmäßig begrenzt, ihre Richtung ist aber doch sehr gerade, was man auf dem eingemengten Schreibersit sehen kann, der in der Mitte derselben enthalten ist, und auf der Schnittfläche oft fast zusammenhängende, wenn auch meistenteils sehr dünne Streifen bildet. Unter dem Mikroskop sieht man jedoch, dass diese Streifen stets aus einzelnen Stücken bestehen, die in einer oder mehreren Reihen nebeneinander liegen. Die einzelnen Stücke sind zum Teil regelmäßig begrenzt und liegen in paralleler Stellung nebeneinander, sind also unvollkommen ausgebildete Kristalle. Fig. 2 stellt die Stelle bei a (Fig. 1), Fig. 3 bei b (Fig. 1) bei 90-maliger Vergrößerung in einen der größten Zusammensetzungstücke der Platte dar. In Fig. 1 find die Schalen, worauf die Zusammensetzungsstücke bestehen, nur unvollständig wiedergegeben, da sie sehr fein sind, der Schreibersit ist aber möglichst vollständig dargestellt. Die Schalen zeigen feine, doch deutliche ätzlinien; eingewachsene Rristalle von Rhabdit kommen nicht vor, wenn auch der eingemengte Schreibersit in manchen Zusammensetzungstücken so häufig und fein ist, dass man ihn leicht damit verwechseln kann. Auch hier sieht man bei einer bestimmten Beleuchtung einen Teil der schaligen Zusammensetungsstücke glänzen, einen andern nicht, der dann bei anderer Beleuchtung glänzt, während ef nun bei dem ersten nicht der Fall ist. Troilit in kleinen unregelmäßigen Partien ist häufig eingemengt und in den Figuren durch schwarze Farbe bezeichnet; er hat häufig eine dünne, metallisch glänzende Einfassung, die, soweit man es erkennen kann, von dem Schreibersit nickt verschieden erscheint; auch kleine Partien von Grafit kommen darin vor. Auf

der natürlichen Oberfläche sieht man zwei runde, rinnenförmige Eindrücke, der eine davon 3 Zoll lang und 3/8 Zoll breit, die Baron Neichenbach, der sie hier gesehen, für Höhlungen hält, die durch ausgewitterten Troilit entstanden sind.

e) Meteoreisenmassen, welche Aggregate feinkörniger Zusamsmensetzungstücke sind.

Diese Eisenmassen erscheinen im Bruche seins bis kleinkörnig, zeigen geschlissen und geätt keine Widmanst. Fig., doch treten dann nadels oder taselförmige Kristalle von Rhabdit oder Schreibersit hervor, die gewöhnlich gar keine regelmäßige Lage haben. Troilit ist in einzelnen größeren oder kleineren Partien eingemengt.

- 48) St. Rosa (Tocavita) bei Tunga, 20 spanische Meilen ND. von Bogota in Columbien 1823.
- 49) Rasgatà, bei der Saline Zipaquira bei Bogota, Columbien 1823. Ich führe beide Eisenmassen zusammen auf, weil beide nach den Stücken des Berliner Museums die größte ähnlichkeit mitbeinander haben. Das St. Rosa-Eisen wurde mir 1824 bei meinen Aufenthalten in Paris von Al. von Humboldt, der sie selbst von Boussingault erhalten, für das Berliner Museum übergeben. Es waren ursprünglich 2 vollständige kleine Eisenmassen von plattbugelförmiger Gestalt, wenn auch mit vielen flachen Vertiefungen auf der Oberfläche. Von beiden wurden später einige Stücke abgeschnitten; sie wiegen jett noch 35,26 und 29,93 Loth; ein kleines von dem einen abgeschnittenes Stück ist 3,04 Loth schwer. Die

Dberfläche derselben ist sehr orwdiert, und das Sisen hier in Sisenorwdhydrat umgeändert. Das Sisen selbst ist außerordentlich hart,
im Bruche seinkörnig und nimmt geschlissen, eine sehr gute Politur
an. Geätt wird es im Allgemeinen matt, des eine Stück etwas
fleckig; man sieht nur mit der Lupe kleine runde oder vielmehr
noch in die Länge gezogene Erhabenheit, die auf ihrer Höhe noch
kleinere runde, längliche, oft ganz linienartige, glänzend gebliebene
Teile zeigen.

Von dem Eisen von Rasgatà besitzt das Museum eine 4,79 Loth schwere Platte, die an den Seiten von 2 Schnittslächen, im übrigen von der natürlichen Oberfläche begrenzt ist. Das Berliner Museum hatte sie vom Direktor Partsch aus dem Wiener Rabinette erhalten, wo es von einem Stücke abgeschnitten war, das aus der Meteoritensammlung von Heuland stammt, der es selbst von Mariano de Rivero erhalten hatte. Eigengeäte Schnittsläche gleicht denen der vorigen Stücke; die kleinen glänzend gebliebenen Teile sind vielleicht noch häusiger und vorzugsweise linienartig, zum Teil auch untereinander parallel. Sie sind meistenteils sehr fein, liegen aber wie bei den vorigen Stücken auf schon etwas erhabenen Teilen der Grundmasse.

Die Stücke stammen demnach sämtlich von Boussingault und Mariano de Rivero, weiche beide zusammen an den Fundörtern derselben waren und darüber die erste Nachricht gegeben haben. 67 Sie sahen in St. Rosa bei Tunja, 20 spanische (?) Meilen RD. von Bogota, eine große Eisenmasse, deren Gewicht sie auf 750 Kilogramme schätzen, bei einer Schmiede, der sich ihrer als

<sup>66</sup> Partsch Meteoriten, S. 127.

<sup>67</sup> Ann. de Chimie 1824, t. 25, p. 438.

Amboss bediente. Dieselbe hatte sich auf einem Hügel Tocavita, 1/4 Meile von St. Rosa, mit anderen kleineren Stücken in der Rähe gefunden. Andere Eisenmassen sahen sie in dem Dorfe Rasgatà in der Rähe der Saline Zipaquira bei Bogota, darunter Massen von 41 und 22 Kilogramme.

Das von Prof. Karsten mitgebrachte und oben (S. 64) erwähnte Eisen von Santa Rosa ist ein Stück der großen Eisenmasse, die bei der Schmiede liegt. Prof. Karsten ist zwar nicht selbst in Santa Rosa gewesen, sondern hatte die Stücke von einem Bewohner Santa Rosaf erhalten, den er in Bogota kennen gelernt hatte. Da demselben das Vorhandensein der Eisenmasse bei der Schmiede wohl bekannt war, so hatte Prof. Karsten ihm eine Metallsäge mitgegeben, um mittelst derselben ein Stücken von der Eisenmasse abzulösen und ihm dasselbe bei seiner Rückehr nach Bogota zu bringen, was er nun auch getan hatte, wenn auch das Stück bei der Härte der großen runden Eisenmasse, der er nicht recht beikommen konnte, nur sehr klein ausgefallen ist. Prof. Karsten hatte aber keinen Zweifel an der Echtheit des Stückes; da es nun aber ganz anderer Art ist, als die Stücke von St. Rosa, die Boussingault an Humboldt gegeben, so müsste man annehmen, dass die verschiedenen auf dem Hügel Tocavita bei St. Rosa gefundenen Eisenmassen eine so große Verschiedenheit der Struktur gezeigt haben. Bei der ähnlichkeit der Bouffingaultschen Stücke mit denen von Rasgatà fönnte man an eine Verwechselung der Fundorte denken, die indessen anzunehmen ich keine Berechtigung habe. Vielleicht könnte noch Hr. Boussingault selbst darüber Auskunft geben. Auch würde ef wünschenswert sein, noch andere Beschreibungen der Stücke von

- St. Rosa und Nasgatà zu erhalten. Dass Wöhler bei der Aufelösung des Eisens von Nasgatà eine Menge kleiner mikroskopischer harter Steinchen als Nückstand neben dem Schreibersit erhielt, ist schon oben angeführt (vgl. oben S. 41).
- 50) Chesterville, Süd-Carolina, Ver. St. 1849. Drei Stüde, eins davon in zwei Stüde zerbrochen, ursprünglich 14,93 Loth, ein zweites 8,92 Loth schwer, alle taselartig geschnitten, eins noch zum Teil mit natürlicher Rinde, die schwarz, dünn und uneben ist. Das zerbrochene Stüd zeigt einen seinsörnigen Bruch mit stahlgrauer, ins Bleigraue sich ziehender Farbe. In der seinsörnigen Masse liegen etwas größere, glänzende Körner. Die geäßte Schnittsläche ist matt, mit der Lupe sichte man darauf lauter kleine rundliche Erhabenheit, und dazwischen einzelne unregelmäßig gestaltete, oder runde, auch ganz geradlinige, glänzende Teile. Bei dem durchgebrochenen Stücke eins der Bruch gerade durch ein darin besindliches Stück Troilit von Haselnussgroßsen, so dich wie die Platte selbst; derselbe ist braun, seinsörnig und wird von einer dünnen Hülle glänzender Körner umgeben, die etwas größer sind als die übrigen glänzenden Teile der Masse.
- 51) Tucuman (Otumpa), Argent. Rep. in Süd-Amerika, 1788. Das vierte der oben S. 51 erwähnten Stücke mit feinkörnisgem Bruch.
- 52) Senegal im Lande Siratif und Bambuk, Afrika, 1763. Ein 4,462 Loth schweres Stück, zum Teil mit zwei Schnittflächen und einer Bruchfläche, zum Teil mit der natürlichen Oberfläche begrenzt. Lettere ist uneben und schwarz, die Bruchfläche ist etwas gröber körnig als bei Chesterville; die geäte Schnittfläche zeigt

auch die feine rundliche Erhabenheit von Chesterville, außerdem aber andere dünne, geradlinige, oft 2 Linien lange, die unregelmäßig durcheinanderlaufen, ohne sich zu schneiden, aber nur schwach glänzen, etwa wie bei Chesterville die erhabenen Teile in der nächsten Umgebung der stark glänzenden.

- 53) Salt Niver, Kentucky, V. St. 1851. Eine dünne, quadrasollgroße, 1,197 Loth schwere Platte. Graue matte Grundmasse, worin häufige lichtere längliche Teile schon etwas regelmäßig nach den Seiten eines ungefähr gleichseitigen Dreiecks liegen, in deren Mitte sich glänzende Teile befinden, die auch meistenteils von einer länglichen Form sind. Die eine Hälfte der geäßten Schnittsläche ist bei einer bestimmten Beleuchtung von lichter grauer Farbe, die andere dunkler; bei anderer Beleuchtung umgekehrt, die erste Hälfte dunkel und die andere licht. Das Sisen ist dem vom Senegal zu vergleichen, unterscheidet sich aber durch die regelmäßige Lage der lichtern Teile, die sehr rätselhaft ist. Es wäre wichtig, den Bruch zu sehen, der bei der dünnen Platte nicht zu beobachten ist.
- 54) Cap der guten Hoffnung (zwischen Sonntags und Voschmanns-Fluss), S. A. 1801. Eine dicke Platte (Fig. 9 und 10 Taf. 3) von Hrn. Prof. Breda in Harlem erhalten, und ein kleines Stück auf der Chladnischen Sammlung. Die Platte ist ein Abschnitt der großen, in dem Museum von Harlem ausbewahrten, angeblich 171 Pfd. schweren Masse. Sie ist an einer Seite mit einer Schnittsläche, an den übrigen mit natürlicher Oberfläche begrenzt, die nur eine sehr dünne braune Rinde hat.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Um die bei diesen wie den vorigen Meteoriten angegebenen Erscheinungen zu sehen, ist ef nötig, dass die Schnittsläche gut poliert und dann nur schwach geäßt wird; bei starker äßung bildet sich nur eine körnige, graue Fläche, an der nichts weiter zu erkennen ist.

<sup>69</sup> Vergl. Partsch Meteoriten, S. 132.

Um den Bruch zu sehen, wurde, parallel der Fläche AF, an der gegenüberliegenden Seite der Platte eine Scheibe abgeschnitten und zum Teil abgebrochen, was nicht ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden konnte, da das Eisen sehr weich und sehr dehnbar ist, und darin einen großen Gegensatz mit dem Eisen von St. Rosa (S. 67) bildet. Es muste von zwei Seiten tief eingeschnitten werden, ehe sich die dünne Scheibe abbrechen ließ, so dass nur ein 3 Linien dicker Streifen mit Bruch entstand, an dem man jedoch deutlich seine Beschaffenheit wahrnehmen kann. Er ist ganz feinkörnig und lichte stahlgrau. Das übrig gebliebene, große Stück war wohl an einigen Stellen der Oberfläche angerostet, zeigte aber sonst keine merkliche Verschiedenheit. Als die Schnittflächen AF und AC der Platte geschliffen und poliert wurden, rosteten sie in sehr kurzer Zeit an den 3 Stellen B, D, G, wie in der Fig. angegeben ist, und als sie darauf schwach geätst wurden, zeigte sich der Rost auf denselben Stellen sehr bald wieder, ohne aber später mertlich weiter forkuschreiten; die übrigen Teile der Flächen wurden aber dabei merkwürdig verändert. Man sieht nun verschiedene, abwechselnd lichte und dunkelstahlgraue, mehr oder weniger breite Streifen in paralleler Richtung und mit scharfer Grenze über dieselben fortlaufen, die ihren Farbenton umtauschen, je nachdem das Licht in der einen oder die andere Richtung auf das Stück fällt. Hält man daffelbe so, dass die Rante UV dem Beobachter zugekehrt und ungefähr horizontal ist, so erscheinen die Streifen so, wie sie in Fig. 9 angegeben sind: a, c, e, g sind hell, mit Ausnahme einiger feiner, dunkler Streifen in e und g; a, d, f, h dunkel, mit Ausnahme des hellen, seinen Streifen in d. Hält

man dagegen die Fläche AC so, dass die Streisen dem Beobachter parallel gehen, wie in Fig. 10, so sind die Streisen, die früher hell waren, dunkel; dabei erscheint diese Fläche, wie auch schon in der früheren Lage, gesleckt und auf diesen Flecken teilweise mit seinen Streisen, die die breiten, schräg durchsetzen, gestreist. Hält man die Fläche so, dass sie etwas nach hinten geneigt ist, so ist die Stelle bei B, wie in der Zeichnung angegeben, hell; ist die Fläche AC ganz horizontal, so wird die Ecke bei B dunkel, ist sie nach vorn geneigt, wieder hell.

Unebenheiten, die diese Veränderungen in dem Ton der Streis fen bedingen könnten, sind mit den bloßen Augen und auch kaum mit den Mikroskopen wahrzunehmen. Ich habe von der Fläche AC einen Hausenblasenabdruck gemacht; unter dem Mikroskop erschien der lichte Streifen h Kig. 10 ganz geförnt, wie in Kig. 11; in dem dunklen g waren diese Körner ebenfalls, aber mit andern gemengt, die in die Länge gezogen waren. Die die breiten Streifen durchsezenden feinen Streifen entstehen dadurch, dass die Körner hier gedrängter liegen. Wie dadurch aber der Wechsel von hell und dunkel in den Streifen bewirkt wird, ist nicht einzusehen. Es müssten dazu noch weitere Untersuchungen angestellt, und namentlich noch Schnitte parallel und rechtwinklig auf den breiten Streifen gemacht, auch nachgesehen werden, ob die Lagen, die durch die Streifen auf den Schnittflächen des Stückes Rig. 9 angezeigt werden, durch die ganze Masse des großen Stückes in dem Museum von Harlem, wovon das beschriebene abgeschnitten ist, hindurchgehen.

Die chemische Beschaffenheit dieses so eigentümlichen Eisensist schon mehrsach untersucht, zulest noch durch Uricoechea und

Böhing<sup>70</sup> in Wöhlers Laboratorium, wodurch der große Nischelgehalt desselben bis 15 pC., dem schon Holger und Wehrle gefunden hatten, bestätigt wurde. Als Wöhler im Mai d. J. in dem Verliner Museum das geätzte Stück sah, veranlasste ihn das eigentümliche Ansehen desselben, noch eine neue Analyse zu machen, mit Stücken, die ich ihm mitteilen konnte. Er fand darin:<sup>71</sup>

Rickel 16,215 Robalt 0,727 Phosphor 0,148

außerdem noch Spuren von Rupfer und Chrom, welches letztere auch schon Stromener darin nachgewiesen hatte. Doch ist die Unstersuchung noch nicht abgeschlossen. Das schnelle Rosten an manchen Stellen setzt hier doch eine besondere Beschaffenheit voraus. — Noch ist zu bemerken, dass man in dem Streisen g der Fläche AF, was man so selten zu beobachten Gelegenheit hat, den sechseitigen Durchschnitt eines Kristalls von Troilit, so wie in dem untern Streisen h etwas Schreibersit von der in der Zeichnung angegebenen Gestalt sieht.

55) Babbs Mill, Greenville, Green County, Tennessee, Ver. St. 1845. Zwei kleine flache Stücke; bei dem größeren zwei Schnittflächen, die übrige Begrenzung natürliche Oberfläche, die in Eisenorydhydrat umgeändert ist. Die große Schnittfläche ist geäßt, matt, die eine Hälfte dunkelgrau, die andere viel heller. Beide Schattierungen verlausen ineinander, wie dies auch bei den

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Ann. d. Chem. und Pharm. B. 91, S. 252 und B. 95, S. 246.

<sup>71</sup> Nach einer brieflichen Mitteilung, die ich mit seiner Erlaubnis hier bekannt mache.

Fleden in dem Eisen vom Cap vorkommt; ebenso derselbe Wechsel des Farbentons bei dem Wechsel in der Lage des Stücks; aber die geradlinigen Streisen sind in dem kleinen Stücke nicht sichtbar; ein Bruch auch nicht wahrnehmbar. In dem kleineren Stücke sieht man glänzende Einmengungen in Gestalt von gebogenen Linien, die bei dem größeren nicht sichtbar sind.

Wie in dem äußern Ansehen, so gleicht dies Eisen auch dem vom Cap in der chemischen Beschaffenheit. Es hat ebenfalls einen sehr hohen Nickelgehalt, der nach der von Clark in Wöhlers Laboratorium angestellten Analyse sogar noch etwas höher ist als bei dem Cap-Eisen. Er fand nämlich Eisen 80,590, Nickel 17,104, Robalt 2,037, schwerlösliche Phosphormetalle 0,124; außerdem noch Spuren von Mangan, Silicium und Magnesium.

56) De Kalb County, Tennessee, V. St. 1845. Zwei kleine Stückhen, wonach dies Eisen dem der beiden vorigen Fundörter sehr ähnlich zu sein scheint.

## Anhana.

- 57) Tucson, Sonora, Mexico, 1850. Kleines Stückhen.
- 58) Cranburne, Melbourne, Australien, 1861. Drei kleine Stückhen.

## 1.2 Pallasit.

Gemenge von Meteoreisen mit Olivin. Das Meteoreisen bils det hier eine Grundmasse, in welcher Olivin-Aristalle porphyrartig eingewachsen sind. <sup>72</sup> Es gehören hierher die Eisenmeteorit von Krassnojarsk (das Pallasseisen), von Brahin, Atacama, Steinbach, Rittersgrün, Breitenbach, und Bitburg.

Die Olivin-Rristalle sind bei dem Vallas-Eisen am schönsten ausgebildet. Sie sind hier 2 bis 4 Linien groß und zuweilen noch grösser, und liegen entweder ganz frei in dem Eisen oder zu mehreren nebeneinander, sich gegenseitig in der Ausbildung störend. Im ersteren Kalle sind sie rund und nähern sich der Rugelgestalt mehr oder weniger; oft sind sie in die Länge gezogen und an einem Ende konisch zulaufend, wie man an ihren Durchschnitten auf den Schnittflächen des Eisens, oder an den bei der Lostrennung einzelner Stücke von der größeren Masse mit dem Hammer herausgefallenen Kristallen sehen kann. Ihre Oberfläche ist aber glatt und stark glänzend. Sie sind gelblichgrün und vollkommen durchsichtig, so dass man auf der geschlissenen Fläche des Pallasit auch bei den Durchschnitten größerer Kristalle die hintere Seite deutlich erkennen kann; indessen sind sie doch häufig mit Sprüngen durchsett, und auf diesen und in der Rähe derselben braun gefärbt, und dann mehr oder weniger undurchsichtig. Ungeachtet ihrer Abrundung zeigen sie aber noch einzelne Flächen, die sich gewöhnlich nicht in Kanten schneiden und runde Umrisse haben, aber an den Winteln, die sie miteinander bilden, zu bestimmen sind. Am häufigsten fand ich die Flächen des Längsprisma k (80° 54') und die Zone der Längsprismen ausgebildet, wie z. B. in Fig. 1 Taf. 4, wo

<sup>72</sup> ästig und schwammig, wie es gewöhnlich beschrieben wird, erscheint es nur da, wo die Olivin-Aristalle berausgesallen sind, was bei der Trennung kleinerer Stüde von Größeren mit dem Hammer häusig der Fall ist.
73 Der Eisenweisenst von Merkenkeit kulle ist verkliche beinken das der Verklande Westenwicken die klein der Verklande der Ver

<sup>73</sup> Den Eisenmeteorit von Breitenbach stelle ich vorläufig hierher, da das darin enthaltene Meteoreisen dieselben Bidmanst. Fig. gibt, wie das in den Pallasiten von Steinbach und Nittersgrün, ohne aber die neben dem Meteoreisen vorkommenden Gemengteil schon untersucht zu haben.

diese Zone rund um den Kristall zu verfolgen ist und sich auf der einen Seite die Flächen P, h, k, i, T, i, k (Haüp), auf der entgegengesetten Seite die Flächen h, T befinden; er ist in der den Flächen V und T parallelen Are besonders ausgedehnt. 74 An andern Kristallen fand ich aber auch die Flächen anderer Zonen: ja ich fand sogar einen Kristall, den ich schon bei einer früheren Gelegenheit beschrieben, 75 bei welchem mehrere Reihen von Flächen übereinander vorkommen. Wo sich mehrere Flächen finden oder dieselben schon einige Größe haben, schneiden sie sich auch öfter in scharfen Kanten. So findet sich bei einem Stücke der Sammlung ein in dem Eisen festsitzender Kristall, an welchem 2 Flächen sicht bar sind, die eine 3 Linien lange Kante bilden. Die Flächen sind größtenteils überauf glatt und glänzend, so dass sich die Kristalle zu den schärfsten Messungen eignen, die man bei dem Olivin anstellen fann. Nur die gerade Endfläche P ist bei dem oben erwähnten, sehr ausgebildeten Kristalle parallel der Kante mit dem Längsprisma ges furcht, und Flächen mit solchen Furchen, die also auch wahrscheinlich die Flächen P sind, habe ich auf ansitzenden Kristallen noch öfter bemerkt. Seiten sind die Kristalle um und um ausgebildet, gewöhnlich liegen zwei oder mehrere Kristalle nebeneinander. Sie begrenzen sich dann mit Zusammensetzungsflächen, die sich von den Rristallflächen gleich dadurch unterscheiden, dass sie immer etwas uneben und bei weitem nicht so glänzend wie jene sind. 76 Zuweilen

 $<sup>^{74}</sup>$ Bei d befindet sich keine Kristall» sondern eine Zusammensehungsfläche, in welcher der Kristall an einen andern angrenzte.

<sup>75</sup> Pongendorfff Ann. 1825  $\mathfrak{B}$ . 4,  $\mathfrak{S}$ . 185. Er ift indeffen dort ganz vollständig gezeichnet, obgleich die Flächen nur auf einer Seite aufgebildet sind; über  $\mathfrak{T}$  die Flächen i,  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{P}$  (lettere sehr groß), unter  $\mathfrak{T}$ : i'; neben  $\mathfrak{T}$ : r,  $\mathfrak{k}$ , n, über diesen  $\mathfrak{l}$ ,  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{k}$ , unter ihnen  $\mathfrak{l}$ ',  $\mathfrak{k}$ ',  $\mathfrak{k}$ '.

<sup>76</sup>Sie haben öfter eine fünfseitige Gestalt, wir in dem Stücke, welches Chladni beschreibt, wo drei solcher fünfseitigen Flächen zusammenstoßen, "so dass der Kristall einem Pentagondodekaeder sehr ähnlich ist," wie Chladni

sind die Kristalle nur durch eine schmale Lage von Eisen oder auch Troilit voneinander getrennt.

Betrachtet man die Kristalle mit einer Lupe, so sieht man häufig in ihnen ganz feine, haarförmige Einschlüsse, die ganz geradlinig und untereinander parallel, mehr oder weniger lang in verschiedes nen Söben des Kristalls liegen, und öfter Farben spielen. Besser erkennt man diese Einschlüsse noch, wenn man die Kristalle in dünn geschliffenen Platten unter dem Mikrostop betrachtet, wo sie bei 140-maliger Vergrößerung wie in Fig. 10 Taf. J erscheinen. 77 Sie machen im Allgemeinen den Eindruck von Röhren, haben aber untereinander eine etwas verschiedene Beschaffenheit und erscheinen bei 360-maliger Vergrößerung, wie in der Kig. 2 Taf. 4 dargestellt ist. Um häufigsten erscheinen sie, wie in a Fig. 2, als zwei nebeneinander liegende, gerade Linien, dann sieht man in der Mitte dieser eine stärkere und schwärzere b; dann erscheinen die beiden Linien von a in zwei schwächere geteilt c, so dass man vier Linien sieht. In Innern sind sie teils ungefärbt, teils lichte grau oder dunkelschwarz. Zuweilen sind die Röhren unterbrochen und fangen in einiger Entfernung wieder an, b Fig. 2, oder ef ist nur die Kärbung in der Röhre unterbrochen, wie bei e. Eine ungewöhnlich starte Röhre f erschien der ganzen Länge nach dunkel und nur an den Enden eine kleine Strecke etwas lichter und an dem einen Ende zulest ganz licht. Gewöhnlich erscheinen die Röhren scharf abgeschnitten, zuweilen aber hatten sie eine Endigung wie in b unten angegeben. Fig. 12 Taf. I stellen schiefe Durchschnitte dies

fagt, diese Zusammensekungsflächen mit Kristallflächen verwechselnd. (S. dessen Feuermeteore, S. 322.)

<sup>77</sup> Diese Figur ist die Vergrößerung der kleinen, rechts liegenden hellen Stelle in der Platte Fig. 11, die aus einem sehr klüftigen Olivin-Aristall des Pallas Eisens geschliffen, und in natürlicher Größe dargestellt ist.

ser Röhren in einer auf einen solchen Olivin-Kristalle geschlissenen Platte dar.

Es ist schwer zu sagen, wosür man diese Einschlüsse halten soll. Wenn ich sie Röhren genannt habe, so soll damit nur der Eindruck bezeichnet werden, den sie auf mich gemacht haben. Sie sind aber alle parallel, wenn sie auch nur in geringer Menge und vereinzelt in dem Kristalle liegen, und müssen also, da sie sich untereinander nicht berühren, eine ganz bestimmte Lage in dem Kristalle haben, worin sie liegen. Welche diese aber ist, war schwer außumachen, da man gewöhnlich nur so wenige Flächen bei den Kristallen sieht, doch konnte ich bei einigen Kristallen nicht zweiseln, dass sie eine gegen die Endsläche P rechtwinklige, also eine der Hauptaze parallele Lage haben. Bei einem Kristall z. B., an welchem sich zwei Flächen f und dazwischen die Fläche T befindet, kann man bei hellem Lampenlichte deutlich sehen, dass die Fläche T und die Röhren zu gleicher Zeit das Licht reslektieren, und letztere zugleich rechtwinklig gegen die Aze der Zone f Liegen.

Der Olivin in dem Eisen von Brahin gleicht in Farbe, Durchsticktigkeit und Größe der Körner seigten dem Eisen von Krasnojarsk; einzelne herausgefallene Körner zeigten auch einzelne glatte Flächen wie bei diesem; auf der geschlissenen Fläche waren die Durchschnitte der Kristalle noch eckiger, so dass die Flächen sich vielleicht in noch viel größerer Anzahl finden als bei dem Sibirischen Eisen. Sie sind meistenteils sehr klüftig, zeigen aber auch die eingewachsenen röhrenartigen Einschlüsse sehr ausgezeichnet und in großer Zahl.

Die Olivin-Körner in dem Eisen von Atacama sind meistenteils noch grösser als die in dem Pallas-Eisen, oft 5/8 Zoll groß, aber sie sind noch viel klüftiger, vielleicht auch schon mehr oder weniger zersett, daher sie auf der geschlissenen Fläche keine Politur annehmen.

Der Olivin in dem Eisen von Rittersgrün findet sich in kleineren Körnern, die untereinander noch mehr zusammengehäuft und zu förnigen Partien verbunden sind, als dies bei dem Sibirischen Eisen der Fall ist: wo sie aber an das Eisen angrenzen, sind sie fristallisiert, und noch deutlicher als bei diesem. Bei einem Korne konnte ich die Flächen in der Zone der Längsprismen mit Sicherheit bestimmen, bei andern zeigten sich einzelne Flächen, die aber nicht bestimmt werden konnten; gewiss würde man bei bessern Stücken, als mir bis jest zu Geboten stehen, recht ausgebildete Kristalle finden können. Der gemessene Kristall ist aber hinreichend, um zu beweisen, dass die Kristalle die Winkel des Olivins haben. Andere Rörner waren an der gegen das Eisen angrenzenden Seite rund, aber dabei stets etwas drusia; so glatte Körner wie in dem Vallas-Eisen habe ich hier nicht bemerkt. Die Farbe dieses Olivins ist in den Körnern grüner alf bei dem Pallas-Eisen, doch erscheinen sie häufiger durch anfangende Zersekung braun.

Der Olivin in dem Steinbach-Eisen gleicht dem von Nittersgrün vollkommen; an dem kleinen Stücke des Berliner Museums fand ich ein Korn, das ganz von Eisen umschlossen und völlig rund war, ein anderes, welches mehrere Flächen zeigte, die aber nicht bestimmt werden konnten.

Der Olivin in dem Eisen von Bitburg gleicht, nach dem kleinen Stücke des Berliner Museums zu urteilen, den beiden vorigen; Kristallflächen habe ich nicht beobachtet.

Das spezifische Gewicht des Olivins aus dem Pallas-Eisen wird von Stromener zu 3,332 angegeben in völliger übereinstimmung mit dem der meisten der in den Basalten vorkommenden Olivine, das von dem Olivin von Steinbach nach demselben Chemiker zu 3,276.<sup>78</sup>

Vor dem Lötrohr und gegen Säuren verhält sich dieser Olivin wie der Basalte. Vor dem Lötrohr schmilzt er nicht und verändert sich nicht.

In Rücksicht der chemischen Zusammensetzung ist der auf dem Pallas-Eisen außer Stromener und Walmstedt von Berzelius (1), der von Atacama von Schmid (2) und der von Steinbach (Grimsma) von Stromener (3) analysiert:

	1	2	3
Magnefia	47,35	43,16	25,83
Eisenorydul	11,72	17,21	9,12
Manganorydul	0,43	1,81	0,31
Rieselsäure	40,86	<i>36,</i> 92	61,88
Zinnsäure	0,17	","	","
Chromoryd	","	" <b>,</b> "	0,33
Glühverlust	","	","	0,45
	100,53	99,10	97,92

Die beiden ersteren Abänderungen haben also vollkommen die Zusammensekung des terrestrischen Olivins, die erste enthält etwas weniger Eisenorydul als die zweite und ist:

<sup>78</sup> Jahrb. d. Chem. u. Phys. 1825 B. 14, S. 275. Stromeyer nennt zwar das Eisen, worin dieser Olivin vorkommt, von Grimma, doch hat schon Chladni gezeigt, dass darunter das Eisen von Steinbach zu verstehen sei. Bergl. Chladni Feuermeteore, S. 326 und Partsch Meteoriten, S. 91.

$$(7\mathfrak{Mg} + \mathfrak{Fe})^2\mathfrak{Si}$$

die zweite:

$$(4\mathfrak{Mg} + \mathfrak{Fe})^2\mathfrak{Si}.^{79}$$

Beide sind dadurch ausgezeichnet, dass sie, obgleich mitten in einem nickelhaltigen Eisen vorkommend, kein Nickeloryd enthalten, welches doch Stromeyer, wenn auch nur in geringer Menge, in allen terrestrischen Olivinen nachgewiesen hat, was aber nur beweist, wie auch schon Stromeyer ansührt, dass das Nickeloryd so leicht reduzierbar ist und weniger Verwandtschaft zur Rieselsäure als das reine Metall zum Eisen hat. Merkwürdig ist ferner die, wenn auch nur geringe Menge von Zinnsäure in dem Olivin des Pallasseisens, die aber Verzelius neben etwas Rupseroryd auch in dem Olivin von Voscovich bei Aussig in Vöhmen und in einem aus dem Dep. Pun de Dome gefunden hat. Sie ersett eine geringe Menge der Rieselsäure.

Der Olivin von Steinbach (Grimma) hat dagegen nach Stromeyer eine ganz andere Zusammensekung als der terrestrische Olivin. Da nun aber seine äußern Charaktere mit denen des übrigen Olivins stimmen, wenn auch die Winkel der Kristalle noch nicht bestimmt sind, das spezisische Gewicht auch nicht merklich verschieden ist, und so auch bei andern ächten Olivinen vorkommt, so muss hier offenbar ein Irrtum stattgefunden haben, wenn ich gleich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Bergl. Rammelfberg Mineraldyemie, S. 438 und S. 503.

angeben kann, wodurch derselbe veranlasst ist.80

Das Eisen, welches die Grundmasse bildet, worin die Olivin-Rristalle eingeschlossen sind, findet sich bei den verschiedenen Vallasis ten in größerer oder geringerer Menge. Das erstere ist der Fall bei den Pallasiten von Steinbach und Nittersarün, und bei diesen kann daher seine Struktur am besten erkannt werden. Es zeigt auf den Schnittflächen, geätzt sehr schöne Widmanskättensche Figuren, des ren Streifen sich auf den Schnittflächen bei den einzelnen Stücken def Berliner Museums stets überall parallel bleiben, also beweisen, daff das ganze Eisen jedes dieser Stücke zu einem Individuum bes steht. Ob dies auch bei größeren Stücken der Fall ist, werden diese lehren; möglich, dass diese auf mehreren Stücken bestehen. Dennoch sind immer die einzelnen Körner oder die körnigen Vartien def Dlivins von einer hier nur sehr dünnen Einfassung von dem Meteoreisen umgeben, jenseits welcher erst die Widmanstättenschen Figuren anfangen. Das Eisen von Bitburg gleicht dem vorigen, doch sind die Widmanst. Figuren noch feiner. Bei den Vallasiten von Krasnojarsk, Brahin und Atacama ist der Olivin grösser, der Raum zwischen ihm geringer. Die Einfassung des Olivins von dem Meteoreisen ist im Verhältnis der Größe der Körner dicker, über dieser sieht man die dünne Lage des Sänit, wie dies Reichenbach aufführlich beschrieben (vgl. oben S. 41), worauf nun ein etwas dunkler gefärbtes Meteoreisen erscheint, das Reichenbach zu seinem Külleisen (Plessit) rechnet. Wo diese Räume etwas grösser

<sup>80</sup> Stromeyer hat noch einen andern Olivin, angeblich auf dem Eisen von Olumba (foll wohl heißen Otumpa) auf der Prov. Chaco Gualamba, analysiert (Schweigger, Journ f. Chem. u. Phys. 1825 B. 44, S. 275) Da dieses Meteoreisen aber keinen Olivin enthält, so möchte auch hier ein Irrtum stattgefunden haben, und da dieser analysierte Olivin in der Zusammensekung ganz mit dem Olivin auf dem Pallas Eisen nach Stromeyers Analyse stimmt, so wäre es möglich, dass eine Verwechselung mit diesem die Ursache davon ist.

alf gewöhnlich sind, erscheinen durch ätzung darin noch Widmanst. Figuren. Wenn sich mehrere solcher Räume mit diesen Figuren auf einer geschlissenen Fläche sinden, wie dies besonders bei dem Eisen von Atacama vorkommt, so sieht man selten, dass diese an den verschiedenen Stellen eine gleiche Lage haben, was beweist, dass größere Massen dieser Pallasit aus mehreren Eisenindividuen, wie das Meteoreisen von Seeläsgen, bestehen. Diess wird noch das durch bestätigt, dass die in den Olivin-Rristallen des Pallas-Eisens vorkommenden röhrenartigen Einschlüsse, die in einem Rristall ale untereinander parallel sind, wenn man verschiedene Rristalle miteinander vergleicht, keine parallele Lage haben, was doch wahrsscheinlich der Fall wäre, wenn das Eisen, worin sie liegen, ein Individuum wäre.

Die Einfassung des Dlivins durch das Meteoreisen ist recht merkwürdig. Sie scheint zu beweisen, dass, nachdem der Olivin sich in dem flüssigen Eisen ausgeschieden hat, das den Olivin zunächst Umgebende zuerst fest wurde und denselben mit einer dünnen Hülle umgab, auf welche sich sogleich etwas Tänit legte und nun der inner Raum mit schaligen Lagen von Meteoreisen und Tänit, die die Widmanstättenschen Figuren bilden, oder nur mit dem sogenannten Plessit von Neichenbach ausgesüllt wurde. Aber dieser Plessit scheint selbst nichts anderes zu sein als ein schaliges Meteoreisen, in welchem nur die Schalen recht dünn und die Tänit-Lagen verhältnismäßig dick sind, so dass sie im Ganzen die Erscheinung darstellen, die Neichenbach unter dem Namen der Kämme beschrieben hat, und deren oben S. 36 Erwähnung getan ist. Denn wenn man von der geästen Fläche des Pallasschens einen Hausenblasenabdruck macht

und den Abdruck des Fülleisens unter dem Mikroskop betrachtet, so sieht man das seine Gemenge deutlich und die sich durchschneidenden Lagen, ganz ähnlich denen, die die Widmanskättenschen Figuren bilden.

Außer dem Olivin und dem Meteoreisen, die die wesentlichen Gemengteil des Pallasit bilden, sinden sich in demselben einige unswesentliche, die nur in mehr oder weniger geringen Menge darin vorhanden sind. Zu diesen gehört:

- 1. Troilit oder Magnetkies. Er ist wie in dem Meteoreisen von tombakbrauner Farbe, nur derb, und auch eigentlich nur auf den angeschlissenen Flächen zu erkennen; er sindet sich gewöhnlich nur in kleinen Partien, aber in allen Pallasiten, am größten noch in dem von Krasnojarst und Brahin, wo er doch Körner von 3 bis 4 Linien Durchmesser bildet. Bei einem Stücke des P. von Krasnojarst des Berliner Museums findet sich ein Olivin-Korn, das ganz von Troilit umschlossen ist, bei einem andern ein anderes, das zu 3/4 des Umfangs von Troilit und nur zu 1/4 von Meteoreisen umschlossen ist. Zuweilen sind einzelne Körner, wie sie öfter von haarbreiten Lagen von Meteoreisen getrennt sind, auch durch solche Lagen von Troilit voneinander getrennt.
- 2. Chromeisenerz von samtschwarzer Farbe, unvollkommenem Metallglanz, braunem Strich, und vor dem Lötrohr mit Phosphorsalz ein smaragdgrünes Glas gebend. Es ist in der Regel vollkommen in dem Meteoreisen eingewachsen und grenzt an dasselbe in geraden Flächen, ist also kristallisiert; zuweilen grenzt es aber auch an den Olivin, es bildet dann mit ihm eine unregelmäßige Grenze und nimmt Eindrücke von diesem an, scheint also später als dieser

fristallisiert zu sein. Man erkennt das Chromeisenerz auch nur auf geschlissenen Flächen; es scheint aber überall nur sparsam vorzukom» men; ich habe es bestimmt gesehen nur in den Pallasiten von Brahin und Atacama. Doch muss es auch in den übrigen, wenigstens in dem von Rrasnojarst und Steinbach vorkommen, weil Laugier in dem ersteren und Stromener in dem Steinbach» (Grimma») Olivin etwas Chromoryd angibt, was doch wahrscheinlich von eingemengtem Chromeisenerz herrührt.

#### 1.3 Mesosiderit.

Ein körniges Gemenge von Meteoreisen, Troilit, Olivin und Augit. Es gehören hierher die Eisenmeteorit der Sierra de Chaco und von Hainholz.

1) Sierra de Chaco in der Wüste Atacama, N. von Chile 1862. Ein ursprünglich 28,87 Loth schweres, mit natürlicher Oberstäche und Bruch begrenztes Stück, Geschenk des Prof. Domenko in St. Pago in Chile. 82 Davon wurde ein Teil abgeschnitten; die Sammlung enthält jett noch ein großes Stück von 23,90 und ein kleines von 1,4 Loth. Es sieht im Bruche körnig und im Allgesmeinen grünlichschwarz und glanzlos aus; man erkennt nur einzelne größere Körner von rötlichgelbem Olivin und kleinere schwärzlichs grüne von Augit; das überall sein eingesprengte Eisen ist hier fast

<sup>81</sup>In den angeschlissenen Stüden des Pallas-Eisens von der Berliner Sammlung ist das Chromeisenerz nicht sichtbar, und in der Analyse des Pallas-Eisens von Berzelius wird auch kein Chrom angegeben. Indessen ist beides doch kein Grund, dass nicht Chromeisenerz in dem Pallas-Eisen vorkommen kann, da die angeschlissenen Flächen der Berliner Stüde nicht groß sind, und es zufällig auf diesen kann, und Berzelius das Pallas-Eisen vor der Analyse gehämmert und dadurch alle spröden Gemengteil, wie den Olivin und also auch das etwa vorhandene Chromeisenerz, entsernt hat.

<sup>82</sup> Vergl. Monatsberichte der k. Akad. der Wissensch. 1863 S. 30.

gar nicht wahrzunehmen. Vollkommen aber unterscheiden sich die Gemengteil auf einer geschliffenen und polierten Fläche; das Eisen tritt nun gleich durch seine stahlgraue Farbe und seinen starken Metallglanz hervor, und man sieht nun erst, in welcher Menge es vorhanden ist. Es ist in feinen Teilen überall mit kleinen Teilen der Silicate gemengt, die überall mit ganz unregelmäßigen, edigen und zackigen Oberflächen ineinandergreifen, und zwischen deren der Troilit überall, aber in noch feineren Teilen, durch seis ne tombakbraune Farbe kenntlich, enthalten ist. Dazwischen treten nun in einzelnen größeren Körnern Rickeleisen, Olivin und Augit auf. Geäßt zeigen die größeren Körner des Nickeleisens sehr feine und zierliche Widmanstättensche Figuren von einem eigentümlichen Verhalten; man erkennt darin nicht ein System von Streifen, die einem auf schaligen Zusammensetzungstücken parallel den Flächen des Oktaeders bestehenden Individuum entsprechen, sondern stets mehrere; bei einem am Rande des kleinen Stückes befindlichen Korne von 4 Linien Durchmesser, das aber nur zum Teil auf dem Stücke enthalten ist, sind deren drei zu erkennen, die durch eine halbe Linie dickef nicht gestreiftes Mickeleisen getrennt sind, in welchen nur hier und da kleine Körner oder körnige Partien von Augit liegen. Die kleineren Körner des Nickeleisens zeigen keine Widmanskättens sche Figuren, sondern enthalten in ihrer Mitte nur unregelmäßig gestaltete Teile von der in verdünnter Salpetersäure nicht angegriffenen Substanz. Nach einer vorläufig mitgeteilten Nachricht von Hrn. Domenko enthält dasselbe nach seinen Untersuchungen 88,55 p.C. Eisen und 11,5 Nickel, ist also an dem letzteren Bestandteil sehr reich. Der Olivin ist von grünlichgelber bis rötlichgelber und brauner Farbe und zuweilen von beträchtlicher Größe; auf der äußern Fläche befindet sich ein Korn von 3/4 Zoll im Durchmesser. Er ist zerklüftet und nimmt im Allgemeinen keine so gute Politur an, wie das Augit, vielleicht weil er schon etwas zersett ist. Er schmilzt und verändert sich vor dem Lötrohr nicht, ist also wie der gewöhnlich in den Meteoriten vorkommende Olivin nicht Eisenreich. Das Augit ist olivengrün, auf der geschliffenen und polierten Fläche ganz schwarz und glänzend, in sehr dünnen Splittern aber doch mit grünlichweissem Lichte durchsichtig; er ist deutlich spaltbar nach den Flächen des vertikalen Prismas und seiner Quer- und Längsfläche, und so vollkommen, dass sich die Spaltungsflächen ziemlich genau mit dem Reflexionsgoniometer messen lassen. An deutlichsten ließ sich bei einem Splitter die Neigung der Fläche des vertikalen Prismas zur Längsfläche messen, ich fand sie zu 136° 4'. Vor dem Lötrohr ist dieses Augit nur in dünnen Splittern an den äußersten Kanten zu einem schwarzen Glase schmelzbar; mit Phosphorsalz bildet er unter Abscheidung der Rieselsäure ein Glas, das, solange es heiß ist, grünlichweiß ist, das aber beim Erfalten ganz ausblasst. Rickeleisen wie auch in geringerer Menge Troilit kommen in diesem Augit wie auch in dem Olivin gewöhnlich in sehr feinen Teilen eingemengt vor, wie man auf der geschliffenen Fläche des Meteoriten, wenn man sie mit der Lupe betrachtet, ganz deutlich sehen kann, daher man zu den Lötrohrversuchen diese Silicate erst pulvern, und die anziehbaren Teile mit dem Magnete außiehen muff. Troilit ist in größeren Körnern in dem Meteorit nicht eingemengt.

Die natürliche Oberfläche ist nur wenig uneben; das Nickeleisen ist hier wohl etwas mit braunem Eisenorndhydrat bedeckt, doch

nicht sehr stark; die großen Körner von Augit und Olivin sind ganz deutlich zu erkennen, wenn sie auch aus der Oberfläche nicht hervortreten.

2) Hainholz, Reg. Bez. Minden, Preußen, 1856. Zwei größere platte und zwei kleinere Stücke; erstere durch Zerschneiden eines einzigen Stückes erhalten, sind außer den Schnittflächen mit natürlicher Oberfläche begrenzt. Dem vorigen sehr ähnlich; das Rickeleisen findet sich jedoch nicht in so großen Körnern, und diese zeigen auch beim ätzen keine Wid. Fig., sondern sind matt, und enthalten wohl glänzend gebliebene Teile, die aber nicht in der Mitte der Körner liegen, sondern ganz an den Rand derselben gedrängt sind. Der Troilit ist ferner nicht in so großer Menge und das Augit nicht in so großen Körnern enthalten, dagegen kommt der Olivin hier in noch größeren Individuen vor. An dem einen Stücke der Sammlung findet sich ein Kristall von etwas über Bolllänge, und Reichenbach gibt an, dass ist einem in seinen Besitz befindlichen Stücke sich ein Kristall von 13/4 Zoll Länge und 1 1/2 Zoll Breite befindet.83 Reichenbach beobachtete ferner in den Stücken seiner Sammlung Rugeln und Knollen, die, ohne sich in der Beschaffenheit zu unterscheiden, abgesondert in der Masse vorkommen<sup>84</sup>; bei den Stücken der Berliner Sammlung finden sie sich nicht, doch kommen sie vielleicht auch bei dem Eisen der Sierra de Chaco vor, da man auf der Bruchfläche bei diesem ein Viertel bis einen halben große rundliche Vertiefungen sieht, die wie Eindrücke von solchen Rugeln aussehen.

An der Oberfläche ist dieser Meteorit schon stärker zersett, be-

<sup>83</sup> Ngl. Poggendorff Ann. 1857, B. 101, S. 312.

<sup>84</sup>A. a. D. S. 312.

sonders stellenweise. Dieselbe ist im Allgemeinen braun, einzelne Sisenkörnchen ragen daraus hervor, auch erkennt man auf ihr zum Teil noch die großen Olivin-Aristalle. Als das Stück der Samm-lung durchschnitten wurde, bildeten sich nach nicht langer Zeit auf gewissen Stellen kleine Bläschen von Eisenchlorid. Ich ließ daher die Stücke auf den Rat des Baron Reichenbach einige Zeit in reinem Wasser liegen. Dadurch wurde das Sisen an diesen Stellen noch stärker orndiert und braun, aber obgleich dies schon vor länger als anderthalb Jahren geschah, so hat doch das Rosten seit der Zeit nicht weiter zugenommen. Bei dem Sisen der Sierra de Chaco zeigt sich keine Reigung zum Rosten.

# 2 Steinmeteorit.

#### 2.1 Chondrit.

Diese Art ist unter den verschiedenen Arten der Steinmeteorit die bei weiten zahlreichste und zugleich diesenige, mit der sich Berzelius vorzugsweise beschäftigt hat, der, wenn er auch vorzugsweise nur die chemische Beschaffenheit ermittelte, doch dadurch zugleich die wichtigsten Anhaltspunkte für die Beurteilung der mineralogischen Beschaffenheit gegeben hat.

### äußere Beschaffenheit.

Diese Meteoriten sind besonders durch ihre kugliche Struktur ausgezeichnet, worauf sich ihr Name bezieht. Sie bestehen nämlich aus einer mehr oder weniger feinkörnigen Grundmasse, in der mehr oder weniger häufig kleine Rugeln neben vielen andern Gemengteisten, wie Olivin, Nickeleisen, Magnetkies, Chromeisen und anderen schwarzen Körnern liegen.

Die Grundmasse ist teils bedeutend fest, wie bei dem Chondrit von Errleben, Chantonnan etc., teils weniger sest und sast zerreiblich, wie bei dem von Mauerkirchen, Jowa, Bachmut etc. Sie hat am häusigsten eine lichte aschgraue Farbe, die einesteils ins graulichweiße bis schneeweiße, auf der andern Seite doch seltener ins dunkelgraue und selbst graulichschwarze übergeht, ist aber selten gleichmäßig gefärbt; in der Regel kommen Massen von graulicheweißer und von aschgrauer oder selbst graulichschwarzer Farbe an einem und demselben Stücke vor, und grenzen dann aneinander

teils mit unbestimmter, ineinander, wenn auch schnell verlaufender, teils mit sehr bestimmter scharfer Grenze. Das erstere findet z. B. bei den Chondriten von Chantonnan und Güterslohe, das letztere bei den von Ensisheim und Weston, ganz besonders aber bei einem Stücke von Siena (auf der Klaprothschen Sammlung stammend) statt, von dem in Fig. 9 Taf. 2 eine Zeichnung einer angeschliffenen Fläche desselben gegeben ist, und bei dem auch der Unterschied in der Farbe recht stark hervortritt. Zuweilen kommen scharfe und unbestimmte Grenzen an einem und demselben Stücke vor, wie bei dem Ch. von Bremervörde. Die verschiedenfarbigen Massen liegen teils in größeren Partien nebeneinander (Ch. von Güterslohe und Chantonnay), teils durchzieht die eine wie in Abern die andere; die weiße die schwarze in dem Ch. von Ensisheim, die schwarze die weiße in dem von Agen; die weiße breitet sich stellenweise aus und schließt dann Stücke der schwarzen ein, wie in dem Ch. von Ensisheim, so dass das Gestein hier ein anscheinend breccienartiges Ansehen erhält. Wo die Grundmasse fest ist, ist sie auch so hart, daff sie sich mit dem Messer nicht riten lässt; auch erhält sie in diesem Fall schon einigen Glanz, der ihr sonst fehlt.

Die Rugeln, die in dieser Grundmasse auf eine ähnliche Weise wie in den Varioliten oder vielen roten Porphyren eingewachsen vorkommen und die die kuglige Struktur dieser Meteorit bedingen, sind gewöhnlich nur so klein wie Schrotkörner oder Hirsekörner, zuweilen aber auch grösser, selbst 3 bis 4 Linien groß, wie bei dem Ch. von Ausson und New-Concord. Sie sind ferner mit Ausnahme der größeren, die mehr unregelmäßig gerundet und

<sup>85</sup> In dem von Mezö-Madaras beobachtete Reichenbach sogar eine Rugel eines halben Zolls Durchmesser (Pogsgendorss Ann. 1860 B. 111, S. 366).

in die Länge gezogen sind, gewöhnlich regelmäßig gerundet, sind aber selten an einem Stücke von gleicher oder ungefähr gleicher Größe, besonders wenn darunter solche von der Größe wie in dem Ch. von Ausson und New-Concord vorkommen. Ihre Oberfläche ist rau und selbst drusig (Richmond), seltener glatt (Poltava), und im Bruche erscheinen sie teilf uneben, teilf fastig, im letteren Fall jedoch stets nur sehr feinfastig, indessen doch immer bestimmt erkennbar fastig, besonders unter der Lupe; was mir aber dabei sehr bemerkenswert scheint und sie von den Rugeln der irdischen Gebirgsarten, namentlich der Diorit unterscheidet, nie radial, sondern immer erzentrisch fastig; so bei den Ch. von Errleben, Stauropol, Forsyth, Bachmut, Ausson etc. Ihre Farbe ist wie die der Grundmasse, unterscheidet sich aber doch immer etwas von ihr; sie sind gewöhnlich grünlichgrau oder braun, dabei von einem nur geringen Glanze, der etwas fettartig ist und stets nur äußerst schwach an den Kanten durchscheinend, fast undurchsichtig. Sie sind wie die Grundmasse bald heller, bald dunkler, und gewöhnlich finden sich beide Arten zusammen in einem und demselben Meteoriten, wo denn bald die helleren, bald die dunkleren vorherrschen. Das erstere, was der gewöhnlichere Fall ist, findet z. B. statt bei dem Ch. von Mező Madaras, Ofniny, Cabarras, das lettere bei den von Güterslohe, Ausson. In dem Ch. von Krasnoi-Ugol sah ich auch eine graue Rugel eine kleinere weiße einschließen,86 und in dem von Mauerkirchen, wo meistenteils nur lichtere Kugeln vorkommen, sind dieselben doch öfter nach der Oberfläche zu etwas dunkler gefärbt. Sie sind ferner mit der Grundmasse mehr oder weniger

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Etwaf ähnlichef beobachtete Reichenbach auch bei Kugeln von Zabor und Parma (Pongendorff Ann. 1860 B. 111, S. 377).

fest verwachsen, und ersteres gewöhnlich da, wo die Grundmasse sester, letteres, wo sie zerreiblich ist. Im ersteren Fall fallen sie beim Zerschlagen des Gesteins nicht heraus, und man sieht dann auf der Bruchsläche des Gesteins auch ihren Bruch, in letteren Fall fallen sie heraus oder lösen sich zum Teil von der Grundmasse, so dass man auf dem Bruch die halbkugelförmigen Söhlungen oder Erhabenheit der sich herausgelösten oder sitzengebliebenen Rugeln sieht. Die Rugeln sinden sich in der Regel häusig, in manchen Fällen jedoch nur sparsam, wie in dem Ch. von Errleben, Rlein-Benden, Ensisheim und Chantonnan, in andern aber wiederum so häusig, dass sie ganz gedrängt nebeneinander liegen und sich öfter gegenseitig in der Ausbildung stören, wie in dem Ch. von Timochin, Richmond, Benares und Mezö-Madaras.

Der Dlivin ist nur selten in der Grundmasse erkennbar und sindet sich dann in kleinen, nur höchstens liniengroßen, gelblichgrünen, durchsichtigen Körnern, wie in dem Ch. von Errleben, Klein-Wenden, Krasnoi-Ugol, Timochin und Pultava. Durchschnitte von ausgebildeten Kristallen, und zwar von restangulärer Form, habe ich nur etwa bei dem Olivin in dem Ch. von Pultava und Errleben gesehen.

Das Rickeleisen ist dagegen ein beständiger und häufiger Gesmengteil. Es findet sich in den Meteorsteinen gewöhnlich nur sein eingesprengt, doch kommen unter den seineren Körnern mitunter

<sup>87</sup> Sausmann hält die lichtern Rugeln in dem Bremervörde für undeutliche Kristalle, deren Form nicht näher zu bestimmen ist (Göttinger Nachrichten von 1856, S. 151). "Nach den Durchschnitten derselben, welche selten die Größe von ein paar Linien erreichen, zu urteilen" sagt er, "scheinen sie teils rechtectige teils irregulär sechseitige Prismen, zu sein, wonach auf ein trimetrisches Kristallisationspstem zu schließen sein dürste." Ich habe von Kristallsormen bei diesen Mineralen nicht bemerkt und kann auch einer anderen Angabe von Haufmann, dass es vor dem Lötrohr "ruhig und nicht eben schwer zu Email schmelze" nicht beistimmen. Ich sand es vor dem Lötrohr unschmelzbar und stimme nur darin mit Hausmann überein, dass es beim Erhigen dunkelbraun gefärbt wird. Ich kann daher auch nicht das Mineral, wie Hausmann weiter unten in seiner Abhandlung getan hat, für seldspatartig halten.

einzelne größere vor; so sieht man in einem der Stücke des Ch. von Barbotan ein längliches Korn von 3 Linien Länge, 88 ein ähnliches ragt bei dem von Klein-Wenden auf der Oberfläche hervor, und andere ähnliche, wenn auch nicht ganz so große Körner enthalten die Ch. von Lucé (Toulouse?), Seres und Macao. Die seinen Körner sind zackig und eckig, die größeren haben meistenteils eine rundliche Oberfläche, kristallisiert findet es sich in den Stücken der Berliner Sammlung nicht, daher ich auch die unvollkommenen Heraeder, die Partsch bei dem Nickeleisen der Wiener Stücke des Ch. von Barbotan beobachtet haben will (Meteoriten, S. 77), nur für solche rundliche Körner erklären möchte. Indessen Individuen sind diese Körner doch, denn das oben erwähnte Korn in dem Ch. von Barbotan, wie auch ein anderes in dem von Ausson zeigen geschliffen und geätzt die Linien des Meteoreisens von Braunan.89 Es umschließt auch, wie man auf der geschliffenen Fläche sehen kann, fleine Teile der Grundmasse. Die Menge des eingesprengten Eisens ist oft sehr beträchtlich, wie in dem Ch. von Errleben und Kl. Wenden; wie groß aber die Menge desselben eigentlich ist, erkennt man erst, wenn die Stücke angeschliffen und poliert sind, wo sein Metallglanz und seine stahlgraue in die silberweiße übergehende Farbe erst recht stark hervortreten und es auf diese Weise kenntlich machen. Die ganz feinen Körner sind da überhaupt erst zu erkennen, und man sieht dann, dass solche auch in den Rugeln enthalten sind, wo in solchen feinen Teilen das Nickeleisen nie fehlt, wenn es auch gewöhnlich nur in sehr geringer Menge vorhanden ist In der

<sup>88</sup> Partsch spricht von linsen- und höhnen großen Körnern in den Stücken dieses Meteoriten in dem Wiener Mineralien-Rabinette (Meteoriten, S. 77).

<sup>89</sup> Partsch (Meteoriten, S. 82) und Reichenbach (Pongendorff Annalen B. 111, S. 365) erhielten bei den Eisenkörnern in den Meteoriten von Macao und Blansko selbst Widmanskättensche Figuren.

Umgebung der Rugeln ist es dagegen häufig in größerer Menge angehäuft, wie z. B. in dem Ch. von Mezö-Madaras, Krasnoi-Ugol und Ausson. Der seuchten Luft ausgesetzt, orwdiert sich das Nickeleisen leicht und das gebildete Eisenoryd färbt die Umgebung braun, wie man dies bei so vielen Stücken in den Sammlungen sehen kann. 90

Magnetkief<sup>91</sup> ist ebenfalls ein nie sehlender Gemengteil dieser Meteorit. Er sindet sich wie das Nickeleisen gewöhnlich sein eingessprengt, doch nicht in solcher Menge als dieses, <sup>92</sup> seltener kommt er in größeren Körnern vor, doch auf diese Weise selbst noch häusisger als das Nickeleisen. In solchen sindet er sich in den Ch. von Varbotan, Parma, Zaborcica, besonders aber in dem von Grünesberg, wo in dem größeren Stücke des Verliner Museums ein Korn von ihm enthalten ist, das einen halben Zoll im Durchmesser hat. Wo er sein eingesprengt vorkommt, ist er auf der Bruchsläche des Gesteins kaum oder schwer zu erkennen, aber recht gut auf der geschlissenen Fläche, wo ihn tombakbraune Farbe und geringerer Glanz gleich vor dem Nickeleisen außeichnen. Man sieht dann auch, dass der Magnetkies bald mit dem Nickeleisen verbunden ist, bald in getrennten Körnern vorkommt. In dem Stücke von Zaborcica der

Wie schnell diese Orydation wo sich geht, zeigen die beiden Stücke von dem Ch. von Güterslohe des Berliner Museums. Bon den gefallenen Steinen wurde einer schon am folgenden Tage gefunden, ein anderer erst ein Jahr später, und Stücke von beiden, der erstere fast vollständig, wurden von Krn. Dr. Stohlmann in Güterslohe durch gütige Bermittlung des Hrn. Prof. Dove dem Berliner mineralogischen Museum verehrt. Das erste Stück ist im Bruch aber vollkommen frisch, das andre dagegen durch und durch voller Rostsleete. Hätte es in der seuchten Erde noch länger gelegen, so würde es ganz zerfallen oder unkenntlich geworden sein. Diese schnelle Berwitterung ist auch der Grund, weshalb man noch nie einen Meteorstein gefunden bat, den man nicht hat, fallen sehen, während man doch so viele von den nur so selten fallenden Eisenmassen zufällig gefunden hat oder noch sindet, die durch die entstehende orydierte Ainde vor weiterem Angriss der Atmosphäre geschützt werden (siehe oben S. 42).

<sup>91</sup> Vergl. oben S. 40.

<sup>92</sup> Nach Partsch ist in Nichmond mehr Magnetkies als Nickeleisen; bei dem kleinen Stücke der Berliner Sammlung ist dies nicht der Fall; ef enthält wohl Magnetkies, aber nur in geringer Menge.

Berliner Sammlung schließt ein erbsengroßes Korn von Magnetkies ein Korn von Nickeleisen ein und in einem Stücke von Grüneberg sowie von Krasnoi-Ugoi wird umgekehrt ein Korn Magnetkies von Nickeleisen vollskändig umschlossen. Der Magnetkies dieser Meteorit ist gar nicht oder nur äußerst schwach magnetisch.

In geringer Menge, aber doch vielleicht überall kommen in diesen Meteoriten schwarze Körner vor, die aber gewöhnlich nur sehr flein, und nur zuweilen etwas grösser, und so groß wie etwa ein Hirsekorn sind, so dass man sie herausnehmen und besonders untersuchen kann; sie erweisen sich dann als Chromeisenerz, da sie zerrieben ein braunes Pulver und mit Borar oder Phosphorsalz vor dem Lötrohr geschmolzen ein dromgrünes Glas geben. Db aber nun fämtliche schwarze Körner aus Chromeisenerz bestehen oder neben diesen noch andere schwarze Körner vorkommen, muss ich dahinges stellt sein lassen. Die größten schwarzen Körner beobachtete ich in dem Ch. von Château Renard, doch sind sie auch noch deutlich erkennbar in dem von Errleben, Rlein-Wenden, Tabor, Richmond. Wöhler beobachtete sie auch in dem von Bremervörde. Wo sie sehr klein sind, erkennt man sie am besten auf einer angeschlissenen Fläche, denn auf einer Bruchfläche des Gesteins können sie leicht mit dem Nickeleisen verwechselt werden, da dies auch schwarz erscheint, wenn man es nicht gerade im vollen reflektieren Lichte betrachtet. Sie sind auch teils mit dem Nickeleisen verbunden, teils nicht. Das Chromeisenerz der Meteorit ist überall nicht magnetisch.93

<sup>93</sup> Andre Gemengteil alf die angegebenen habe ich nicht bemerkt, dennoch sind aber solche von anderen Beobachtern öfter beschrieben. Hausmann nahm an, dass der Bremervörde auf einem "feldspatartigen Körper (vergl. oben S. 86), einem Körper der Phrogen-Substanz und Olivin" bestehe, und Wöhler fügte diesen Gemengteilen außer Chromeisenerz noch etwas Grafit in seinen Blättchen hinzu (Göttinger Nachrichten 1856, S. 153), welcher letztere wohl darin enthalten sein kann, da derselbe ja auch in den Meteoreisen vorkommt. Eichwald führt bei

äußerlich hat der Meteorit dieser Abteilung wie die übrigen eine durch Schmelzung der Oberfläche entstandene dünne schwarze Rinste, die indessen hier stets matt und öfters durch das hervorragende, schwer schmelzbare Nickeleisen höckerig ist, wie z. B. bei Aigle u. s. Wicht selten sind sie auch im Innern mit Sprüngen durchsett, auf welchen etwas von der geschmolzenen Oberfläche während des Auges durch die Atmosphäre durch den Oruck der Lust hineinges presst ist, s. wie dei den Ch. von Lissa, Ensisheim, Politz, Château Renard u. s. w. Auch sinden sich öfter glänzende schwarze Abslösungs oder Rutschslächen, auf welchen das Eisen breit gesletscht ist, wie z. B. bei den Ch. von Lissa und Aigle.

Ich will hier nur noch die Beschreibung einiger ausgezeichneten Abänderungen dieser Abteilung von Meteoriten folgen lassen, die gewissermaßen als Typen von ganzen Gruppen von Abänderungen in dieser Abteilung betrachtet werden können, und wähle dazu diesenigen, die in guten Exemplaren in der Berliner Sammlung vertreten sind.

# 1) Der Chondrit von Erzleben, gef. d. 15. April 1812. Er

der Beschreibung des Ch. von Lixna an: "Bon den nicht metallischen Körnern könnte man die helleren, fast weißen für kleine abgerundete Rriftalle von Anorthit oder Labrador, die gelblichbraunen für Olivin oder sehr fleine Granatkriftalle halten und die viel Größeren und Selteneren für Augit nehmen. Diese letteren sind etwa 3/4 Linien groß und bennoch zehn Mal gröffer alf die Kristalle des Dlivins und Anorthits. Sie bilden das nicht metallische Gemenge bes Meteorsteins, in dem die Augitfristalle deutlich eingesprengt erscheinen, während die anderen fleinen Kriffalle seine Sauptmasse ausmachen" (Pongendorff Unn. 1852 B. 85, S. 577). Dufrenon spricht bei dem Ch. von Château Renard von einem unvollkommen blättrigen Mineral, das in einigen Punkten analoge Streifen zeigt, wie fie den hemitropen Massen von Albit oder Labrador eigen sind. Das darin vorkommende Chromeisenerz hält er für ein dem Perlit ähnliches Mineral (Poggend. Ann. 1841 B. 53, S. 413). Abich nennt das Gefüge des Ch. von Stauropol psammitisch und spricht bei der Beschreibung auch von einem Mineral, das fich auf Labrador (oder Sauffurit) zurückführen ließe. Ef hätte eine grünlichgraue Färbung, ließe bei günstiger Berspaltung beutlichen Blätterburchgang erkennen und finde sich in rundlichen, aber auch stumpstantig vorkommenden Fragmenten von gewöhnlich 2, zuweilen aber auch von 8 Millimetern Größe. Eine auf einer Bruchfläche fichtbare Labradormasse von 14 Millimeter im Durchmesser enthielte in ihrem Innern ein fremdartiges Aggregat, aus einem durch Zersetung unkenntlichen weißlichen Mineral, feinen Teilen von Meteoreisen und kleinen, weißgelblichen, mehr fette alf glafglängenden Rriftallfragmenten einef besonderen Mineralf bestebend (bulletin de l'acad. imp. des sc. b. St. Petersbourg 1860 t. 2, p. 412).

<sup>94</sup> Bergl. Reichenbach und Haidinger Ber. d. Wiener Akad. 1859 B. 34 (S.10).

gehört zu den am deutlichsten fristallinischen der Sammlung, und ist daher allen übrigen voranzustellen. Derselbe hat eine lichte, graulichweiße, feinkörnige Grundmasse, die glänzend von Glasglanz, hart und fest ist, und daher geschlissen eine gute Politur annimmt. Darin liegen ziemlich häufig ungefähr liniengroße Kugeln, die gewöhnlich mit der festen Grundmasse fest, in manchen Fällen doch auch weniger stark verwachsen sind und sich von ihr beim Berschlagen des Gesteins ablösen, so dass man auf der Bruchsläche, wenn auch gewöhnlich ihren Bruch, doch auch zuweilen einen Teil ihrer kugligen Oberfläche oder die konkaven Höhlungen, worin sie gesessen haben, sieht. Die Oberfläche der Rugeln, sowie auch die der Vertiefungen ist feinkörnig, die Farbe der Rugeln teils etwas grünlichgrau und etwas dunkler als die der Grundmasse, teils gelblichgrau und lichter als diese. Die Rugeln der ersteren Art sind häufiger und im Bruche uneben, die der letteren weniger häufig und feinfastig. Die Farben treten noch besser als im Bruche auf einer geschliffenen Fläche hervor. Olivin kommt in den Stücken der Sammlung mehr oder weniger deutlich vor, zuweilen noch auf der Bruchfläche des Gesteins geradlinige Umrisse zeigend, doch ist er im Allgemeinen nicht häufig. Nickeleisen ist fein eingesprengt in ziemlich großer Menge in dem Meteorstein enthalten und findet sich in sehr feinen Körnern auch in den Kugeln, besonders den dunklen, wie man auf der geschliffenen Fläche sehen kann. Auf dieser erkennt man auch den Magnetkies, der in feinen Teilen zum Zeil mit Rickeleisen verwachsen vorkommt und im frischen Bruch gar nicht erkannt werden kann; ebenso sieht man auch erst auf der geschliffenen Fläche die schwarzen Körner, die teils einzeln, teils mit dem Rickeleisen verwachsen darin vorkommen, doch muss man Acht haben, sie hier nicht mit den seinen Löchern, die sich auf der Schliffsläche finden und dadurch entstehen, dass Zeilchen von Rischeisen beim Schleisen auf der Fläche herausgerissen werden, wie auch mit den Körnern von Rickeleisen und Magnetkies, welche alle bei gewisser Beleuchtung schwarz aussehen, zu verwechseln.

Dem Chondrit von Errleben ist der von Kl. Wenden (1843, Sept. 16) so ähnlich, dass man beide nicht voneinander unterscheis den kann. Ebenso auch der von Abich beschriebene Chondrit von Stauropol im Raukasuf (1857, März 25), der von Grewingk und Schmidt beschriebene Ch. von Pilliskfer in Livland (1863, April 15) und einige andere.

2) Ensisheim (1492, Nov. 7). Eine seste, seinkörnige Masse, die teils schwärzlichgrau und nur schimmernd, teils graulichweiß und etwas stärker glänzend ist. Beide Massen enthalten eingewachsene Rugeln, die aber stark mit der Grundmasse verwachsen und stets etwas dunkler und glänzender als die Grundmasse gefärbt sind. Die graulichweiße Masse durchzieht die schwarze wie Adern nach allen Nichtungen und teilt sie dadurch in eine Menge eckiger Stücke, während sie selbst, da wo sie breiter wird, wieder eine Menge kleiner eckiger Stücke der schwärzlichgrauen Masse einschließt, so dass dadurch der ganze Meteorit ein breccienartiges Ansehen erhält. Die schwarze und die graulichweiße Masse schneiden scharf aneinander ab. Die schwarze Masse ist indessen bei weitem vorherrschend, und manche kleineren Bruchstücke enthalten nur sie und nichts von der weißen.

Rickeleisen ist in der ganzen Masse eingesprengt, aber nicht so

gleichmäßig und in solcher Menge wie bei den Ch. von Errleben und Klein-Wenden, die Körner sind aber meistenteils sehr fein und dann nur auf einer geschliffenen Fläche zu erkennen; sie werden nur hier und da etwas grösser. Magnetkies ist viel seltener, sindet sich aber in einzelnen größeren Körnern.

Der Stein ist von vielen glänzenden und schwarzen Ablösungs-flächen durchzogen.

Der Ch. von Chantonnan (1812, Aug. 5) ist dem von Ensisheim ähnlich, die Masse hat hier ebenfalls stellenweise eine verschiedene Farbe, eine dunklere und hellere, und erstere ist noch schwärzer als bei dem Ch. von Ensisheim, aber beide liegen in großen Partien aneinander und schneiden nicht so scharf ab. Der Stein nimmt wie der von Ensisheim geschlissen eine gute Politur an.

3) Grüneberg (1841, März 22). Lichte aschgraue feinkörnige und feste Grundmasse, worin eine große Menge von Rugeln von Schrot» und Hirseforngröße mit ihr fest verwachsen liegen, so dass sie auf der Bruchsläche des Gesteins auch ihre Bruchslächen zeigen. Sie sind größtenteils von grünlichgelber, doch zuweilen auch von schwärzlichgrauer Farbe und im Bruch uneben. Viel eingesprengtes Nickeleisen, das meistenteils in kleinen feinen Partien, doch zuweisen auch in 2 bis 3 Linien langen Körnern darin enthalten ist; auch verhältnismäßig viel Magnetkies, der meistenteils in einzelnen noch größeren Partien als das Nickeleisen, seltener in seinen Teilen vorkommt; beide öster miteinander verbunden; an dem kleineren Stücke der Sammlung wird ein Schrotkornsgroßes Korn von Masgnetkies von Nickeleisen fast ganz umschlossen. Die Menge, in der

sich der Magnetkies findet, zeichnet diesen Meteoriten ganz besonders aus. Er hat Ablösungsflächen, die aber nur zum Teil schwarz sind.

Dem Ch. von Grüneberg sehr ähnlich sind eine große Menge von Meteoriten, wenngleich nicht alle so viel Magnetkies enthalten, wie die von Cabarras-County, Mezö-Madaras, Tabor, Toulouse, Varbotan, Tipperary, Seres, Krasnoi-Ugol, Wesseln u. s. w.

4) Mauerfirchen (1768, Nov. 20). Lichte graulichweiße zersteibliche Grundmasse mit sehr vielen eingewachsenen Rugeln von fast gleicher oder nur etwas mehr gelblicher Farbe als die Grundmasse. Die Rugeln sind untereinander meistens von gleicher lichter Farbe, nur zuweilen sinden sich solche, die nach der Obersläche etwas dunkler gefärbt sind; ganz gleichmäßig gefärbte dunklere Rugeln kommen nicht vor. Ungeachtet der nur zerreiblichen Grundmasse sieht man auf der Bruchsläche doch meistens nur den Bruch der Rugeln; dann sein eingesprengtes Nickeleisen, auch etwas ebenso beschaffenen Magnetkies.

Dem Ch. von Mauerkirchen sehr ähnlich sind die von Jowa (nicht zu unterscheiden), Linum, Apt, Bachmut, Lissa, Polit, Rew-Concord, Slobodka u. s. w.

## Mikroskopische Untersuchung.

Wenn man von diesen Meteoriten möglichst dünne Platten schleift, so werden oft mehrere der Gemengteil so durchsichtig, dass man unter dem Mikroskop ihre Struktur und Form erkennen kann. Diess gelingt zwar nur vollkommen bei den seskeren, wie bei den Eh. von Errleben, Klein-Wenden, Stauropol; bei andern, die

weniger fest und mehr bröcklig sind, wie bei den Ch. von Aigle, Mauerkirchen, Timochin, nur teilweise, indem nur einzelne ihrer Gemengteil wie die Rugeln durchsichtig oder zum Teil durchsichtig werden; dennoch sind auch diese belehrend. Ich will daher das Aussehen einiger dieser Platten beschreiben und die Resultate angeben, die diese Art der Untersuchung ergeben hat.

1) Ergleben. Eine kleine, dunn geschliffene Plätte95 ließ schon bei schwacher Vergrößerung erkennen: eine Grundmasse, wasserhelle Rristalle, schwarze undurchsichtige Rörner, eine grau aussehende Rugel und andere graue Partien. Die durchsichtigen Kristalle wie a und b in Fig. 1 und 2 Taf. 3 sind nur hier und da sichtbar; wo sie an die Grundmasse angrenzen, sind sie gewöhnlich nicht scharf und regelmäßig begrenzt; nur einmal auf der kleinen Beobachtungsplatte bildet ihr Umriss ein ziemlich regelmäßiges Sechseck a in Fig. 1; wo sie dagegen an die schwarzen Körner angrenzen, da ist die Begrenzung gewöhnlich ganz scharf und geradlinig. Sie sind größtenteils ungefärbt, nur stellenweise sind sie, wie auch die Grundmasse, etwas olivengrün gefärbt, doch verläuft sich die Farbe nach allen Seiten und scheint mehr von außen eingedrungen zu sein. Die Grundmasse ist im Ansehen von diesen Kristallen wes nig verschieden, sie unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, dass ihre körnigen Zusammensekungsstücke weniger groß als die Kristalle find, doch geben sie in der Größe in diese über. Die Zusammenset zungfflächen sind überall unregelmäßig laufende frumme Flächen, schwarz oder grau, wie dies aber auch der Fall ist bei den Zu-

<sup>95</sup> Sie ist Fig. 7 Taf. 3 in ihrer natürlichen Größe dargestellt; die Fig. 1, 2, 3 sind Abbildungen einzelner Stellen derselben bei 140-maliger Vergrößerung. Ich verdanke das Plättchen noch dem verstorbenen Dr. Oschaß, er diese Art von Präparaten mit großer Geschicklichkeit ansertigte. Indessen werden sie jest von seinem Nachfolger, dem Optiker Krieg, hier in Verlin schon von gleicher Güte gemacht.

sammensekungsflächen der Körner des Marmors von Carara, wenn man eine dünn geschlissene Platte dieser Substanz unter dem Mistrossop betrachtet. Dies rührt in diesem Fall teils von der schrägen Lage der Zusammensekungsflächen gegen die Schlissfläche her, teils aber von einer großen Menge sehr Kleiner schwarzer Körner, die mehr oder weniger zusammenliegen und bei starker Vergrößerung deutlich zu sehen sind. 96

Der schwarze Gemenateil findet sich in kleineren und größeren Körnern und Partien, die größeren mit unregelmäßigen, oft ganz zackigen Umrissen, die kleineren von mehr rundlicher Form. Lettere liegen in großer Menge neben den größeren in der Grundmasse, zum Teil sind sie auch in den durchsichtigen Kristallen eingewachsen.97 Dieser schwarze Gemengteil zeigt, wenn man die Platte bei durchgelassenem Lichte betrachtet, keine oder eine nur sehr undeutliche Verschiedenartiakeit der Teile; schließt man aber dieses ab und betrachtet man ihn nur bei zurückgeworfenem Lichte, am besten bei hellem Sonnenlichte und bei stärkerer, etwa 140 maliger Vergrößerung, so sieht man, dass namentlich die größeren Körner häufig Gemenge von zwei bis drei Substanzen sind, einmal von einer, die auch jett noch schwarz erscheint, einer nun fast bleigrau und metallisch glänzenden, die das Nickeleisen ist (n Fig. 1 und 2) und einer dritten, die schwärzlichbraun matt, aber voller Sprünge oder wenigstens Stellen ist, die das Licht sehr stark reflektieren, und nach Vergleichung mit der direkt gesehenen polierten Platte, Magnetkies ist (m. Fig. 1 u. 2). Im reflektierten Lichte ohne Sonnenschein ist

<sup>96</sup>Siehe Kig. 4, die den Kristall b in Kig. 1 bei 360-maliger Vergrößerung darstellt.

<sup>97</sup> Reben diesen sinden sich auch zuweilen kleine Höhlungen mit einer Flüssigkeit und einer Luftblase angefüllt, wie in irdischen Kristallen. Bergl. Fig. 3, welche den Kristall a Fig. 1 bei 360-maliger Bergrößerung darstellt.

er unter dem Mikroskop von der schwarzen Masse kaum zu unterscheiden. Rickeleisen sindet sich häusiger und in größeren Partien als Magnetkies, der im Ganzen selten solche bildet, wie in Fig. 2. Wo das Rickeleisen mit der schwarzen Substanz gemengt ist, sist diese gewöhnlich in einzelnen kleinen Partien an der Außenseite, und man sindet wohl kaum größere Rickeleisenpartien ohne Verwachssung mit der schwarzen Masse, wenn auch größere schwarze Körner ohne damit verwachsene Eisen vorkommen. Regelmäßige Vegrenzung zeigt Rickeleisen, Magnetkies und der schwarze Körper nicht; wo sie aber an die durchsichtigen Kristalle angrenzen, zeigen alle, wie angesührt, den regelmäßigen Eindruck der Kristalle, sind also alle später wie diese Kristallissiert.

Was dieser schwarze Körper sei, und ob er überhaupt einerslei ist, kann auch mit Bestimmtheit noch nicht ausgesprochen wersden; denn wenn auch die meisten dieser Körner, und überall die kleineren, schwarz und völlig undurchsichtig sind, so scheinen doch einzelne größere ein schwaches dunkelgrünes Licht durchzulassen. Wird dadurch eher Berschiedenheit angedeutet? Es wäre möglich, und dann könnten vielleicht die schwarzen undurchsichtigen Körner Chromeisenerz sein, da in dem Ch. von Erzleben durch die Analyse etwas Chromoryd nachgewiesen ist, das wahrscheinlich von dem Chromeisenerz herrührt, und dieses stelle auch in sehr seinen Teilen undurchsichtig ist. Wosür dann aber die schwärzlichgrün durchscheisnenden Teile zu halten sind, ist schwerer zu entscheiden. Am meisten würde man vielleicht geneigt sein, sie sür Augit zu halten, da dies

<sup>98</sup>Eigentümlich ist der schwarze Körper c in Fig. 1 Zaf. 3. Er zeigt nur an einer Stelle Nickeleisen, die ganze übrige Masse ist bräunlichgrün und ohne Metallglanz; dreht man aber die Platte um, so sieht man hier nur Rickeleisen. Das Korn zeigt also auf der einer Seite die schwarze, nicht metallische Masse und auf der andern Seite Nickeleisen, und die Grenze zwischen beiden muss also zufällig gerade der Schliffsläche parallel geben.

ser durch die Analyse wahrscheinlich gemacht ist und auch ziemlich allgemein als Gemengteil der Chondrit angenommen wird, ohne ihn irgend bestimmt beobachtet zu haben; aber wo der Augit in den Meteorsteinen erkannt ist, wie in dem Eukrit von Juvenas, ist er in dünngeschlissenen Platten immer stark durchscheinend und braun; die sämtlichen schwarzen Körner aber für Chromeisenerz zu nehmen, dafür scheinen sie für die geringe Menge von Chromoryd, die die Analyse stets nachgewiesen hat, in zu großer Menge vorhanden zu sein. Ich muss also die Deutung dieser schwärzlichgrünen Körner noch dahingestellt sein lassen.

Es bleiben nun noch die grauen Partien, die wahrscheinlich Durchschnitte von den Rugeln sind, wiewohl nur eine dieser Partien in dem untersuchten Plättchen (die Partie a in Fig. 7)99 rund und scharf begrenzt ist; die andern unbestimmt begrenzten (d in Fig. 1) scheinen Durchschnitte von nebeneinander liegenden Rugeln zu sein. In der einzelnen runden, scharf begrenzten Partie sieht man graue, untereinander parallele Streifen, die in einer durchsichtigen ungefärbten Masse enge nebeneinander liegen. Die grauen Streifen (Kig. 5) scheinen auf lauter grauen runden Körnern mit unbestimmten Umrissen zu bestehen, die in Reihen nebeneinander liegen, und zwischen denen dann wieder einzelne größere, schwarze, scharf begrenzte Körner von Chromeisenerz und seinere von Nis deleisen enthalten sind. Bei starter (360-maliger) Vergrößerung sieht es aber auf, als wären diese grauen Körner nur durch lauter neben- und übereinander liegende frumme Sprünge entstanden. Bei den andern grauen Partien d in Fig. 1 liegen die grauen

<sup>99</sup>Sie ist in Fig. 7 bei 140maliger Vergrößerung und zum Teil in Fig. 6 bei 360maliger Vergrößerung gezeichnet.

Rörner unregelmäßiger, was wahrscheinlich davon herrührt, dass die Schnittsläche durch diese Rugeln nach anderen Richtungen als in Fig. 5 geht; sie sind aber ebenso mit den schwarzen Körnern gemengt. Was es für eine Bewandtnis mit diesen grauen Streisen hat, lasse ich unentschieden. Die späteren Beobachtungen zeigen, dass die Rugeln auf fasrigen Zusammensetzungstücken bestehen, die auch hier angedeutet zu sein scheinen.

Eine dünn geschliffene Platte von dem Ch. von Klein-Wenden war größer, man konnte mehr sehen; sie verhielt sich aber sonst wie die von dem Ch. von Errleben; scharfe und geradlinige Umrisse der durchsichtigen Kristalle, wo sie an die schwarzen Partien, sei es an das Nickeleisen oder den Magnetkies oder die schwarze Substanz angrenzen, fanden sich auch hier. Rugeln mit grauen Streifen wie Fig. 5 Taf. 3 waren gerade nicht zu sehen, nur solche, die wie d in Fig. 1 dunkle Flecken mit schwarzen Körnern von Chromeisenerz und Nickeleisen enthielten; außerdem fanden sich aber andere, die im Allgemeinen durchsichtig und ungefärbt, aber mit vielen schwarzen Sprüngen durchsett waren, deren zusammenhängende Schwärze sich aber bei starker Vergrößerung wie bei Kig. 4 in fleine, voreinander getrennte, schwarze Körner auflöste. Eine sols che sehr große Rugel hatte das Ansehen von Fig. 8, die schwarzen dicken Sprünge waren untereinander ziemlich parallel; sie wiederholten sich dabei schnell und schlossen, durch Querrisse verbunden, die scharf begrenzten, durchsichtigen Teile ein.

Eine noch größere Platte von dem Ch. von Stauropol zeigte außer den gewöhnlichen Erscheinungen eine noch größere Menge von Olivin-Rristallen und von Rugeln. Die ersteren hatten zum

Teil eine regelmäßige Form wie Fig. 3 u. 4 Taf. 4; sie was ren durchsichtig, ungefärbt, mit schwarzen Sprüngen durchsett und hatten auch schwarze Körner und Partien eingeschlossen. Die Kugeln waren hier recht deutlich zweierlei Art, und diese zwei Arten schon ganz bestimmt mit bloßen Augen oder mit der Lupe auf der dünn geschliffenen Platte zu unterscheiden, da die einen stellenweise durchsichtig, die andern nur grau durchscheinend waren. Auf einem Stücke mit nur angeschliffener Fläche konnte man diesen Unterschied nicht wahrnehmen. Die durchsichtigen Rugeln schlossen sich ganz den Olivin-Rristallen an, sie schienen nur runde Rristalle oder runde Zusammenhäufungen von unausgebildeten oder mehr oder weniger ausgebildeten Kristallen zu sein. Die ersteren was ren mit schwarzen, untereinander ungefähr parallelen Sprüngen durchsett, ähnlich wie bei Fig. 8 Taf. 3,100 die andern hatten unregelmäßigere Sprünge, und bei den dritten waren die Kristalle durch die übrigen Gemengteil, wie Grundmasse, Rickeleisen, Magnetkies und die schwarzen Körner verbunden (wie Fig. 5 Taf. 4, wo die dazwischen eingeschlossene, metallische Substanz zufällig fast nur Magnetkief war, der sonst im Ch. von Stauropol nicht sehr häufig vorhanden ist). Diese letteren Rugeln waren auch viel grösser als die andern, daher Fig. 5 (wie auch Fig. 3 und 4) nur bei 9Dmaliger Vergrößerung gezeichnet sind. Diese Ansicht bestätigte die Untersuchung im polarisierten Licht, da die ersten Kugeln überall eine gleichmäßige Färbung, die zweiten und dritten an verschiedenen Zusammensetzungstücken und Kristallen verschiedene, überall an den Grenzen scharf abschneidende Färbung zeigten. Die

<sup>100</sup> Oder mehr wie bei Fig. 10 Taf. 4, einer Rugel auf dem Ch. von Timochin, bei welchem die Sprünge in den Rugeln gewöhnlich weitläufiger find.

anderen Rugeln, welche mit bloßen Augen betrachtet, grau und nur durchscheinend erschienen, wie die Rugel in dem Ch. von Errs leben Fig. 5 Taf. 3, waren auch unter dem Mikroskop wie diese mit grauen parallelen Streifen gestreift, nur deutlicher (ähnlich wie die Rugel in dem Ch. von Krasnoi-Ugol, Fig. 8 Taf. 4) und an den verschiedenen Stellen nach 2 Nichtungen, die gegeneinans der einen spiken Winkel machten und aneinander scharf abschnitten. Andere Rugeln zeigten nur graue, mehr unbestimmt verlaufende Fleden mit schwarzen, scharf begrenzten Körnern. Zuweilen waren diese so dunkel und undurchsichtig, dass die hellen Räume dazwischen nur sehr klein waren. Eine solche ganz runde Rugel ist Fig. 6 Taf. 4 dargestellt, sie ist noch dadurch ausgezeichnet, dass sie mit einem durchsichtigen, von schwarzen Flecken stellenweise ganz freien Ringe umgeben ist. Dicht neben ihr befindet sich eine kleinere, mehr unregelmäßig begrenzte, mit lichtern grauen und geraden parallelen Streifen (Fig. 7).

Die Patte von dem Ch. von Krasnoi-Ugol war im Allgemeisnen sehr undurchsichtig, zeigte indessen doch die Rugeln sehr deutlich. Diese waren wiederum von der doppelten Art, die grau gestreisten waren aber hier in der Mehrzahl vorhanden. Sie lagen dann teils ganz einzeln in der Masse, teils waren sie zu mehreren zusamsmengehäuft, sich gegenseitig in der Ausbildung störend. Eine solche einzelne, recht runde Rugel, deren Streisen auch recht scharf besgrenzt sind, ist die vorhin erwähnte, in Fig. 8 Tas. 4 dargestellte Rugel; ihre Streisen haben die angegebene Lage, und äußerlich ist sie wieder mit einer ganz hellen Hille umgeben. Neben ihr liegt eine Rugel der ersten Art, die aber viel kleiner ist. Eine

Zusammenhäufung von Rugeln ist Fig. 9 dargestellt.

Auch die Platte von dem Ch. von Ensisheim ist sehr dunkel und schwarz. Hierin fand sich ein sehr großer, ziemlich regelmäßig begrenzter Rristall, der mit von Zeit zu Zeit wiederkehrenden, ziemlich parallelen Sprüngen nach zwei untereinander rechtwinkligen Richtungen durchsett ist, wie dies auch bei den irdischen Olivingen Kristallen öfter der Fall ist, bei denen dann die Sprünge parallel der Quergund Längssläche gehen.

Die Platten von den Ch. von Timochin, Ausson, Aigle und Mauerkirchen nahmen schon keine vollskändige Politur an; nur die Rugeln und das Nickeleisen erschienen glänzend, und nur die ersteren waren durchscheinend, die übrige Masse gar nicht. Auch war es sehr schwer, Platten von einiger Größe zu erhalten, namentlich bei denen, der wie der Ch. von Mauerkirchen nur wenig und sehr sein verteiltes Eisen enthalten. Die Rugeln waren aber überall von der doppelten Art; eine Rugel der ersten Art, die sich in dem Ch. von Timochin fand, und in ihrer Art recht ausgezeichnet war, ist in Fig. 10 dargestellt. Die Ch. von New-Concord und Dharamsala gaben wieder Platten mit vollskändigerer Politur, zeigten aber weiter nichts Neues.

Auf der mikrostopischen Untersuchung der dünn geschlissenen Platten ergibt sich also, dass die unter dem Mikrostop schwarz erscheinende Masse außer Nickeleisen, Magnetkies und Chromeisenerz wahrscheinlich noch eine andere schwarze Substanz enthält, deren Natur noch nicht gekannt ist, und ferner, dass die eingewachsenen Rugeln bestimmt zweierlei Art sind, teils solche, die nur runde, zerklüstete Kristalle und offenbar Olivin-Kristalle, ähnlich denen

in dem Pallas-Eisen oder Zusammenhäufungen derselben sind, teils solche, die auf fasrigen Zusammensekungsstücken bestehen, die, wie auch die Beobachtung dieser Rugeln auf der Bruchfläche der Mesteoriten mit bloßen Augen oder mit der Lupe gelehrt hat, immer erzentrisch fasrig, nie radial fasrig sind.

### Chemische Beschaffenheit.

Rleine Splitter sowohl von der Grundmasse als von den Rugeln in der Platinzange gehalten und vor dem Lötrohr erhikt, verändern wohl die Farbe und werden schwarz, schwelzen aber nicht. <sup>101</sup> Nur das sehr fein geriebene Pulver schwilzt an den äußersten dünnen Rändern zu einer grünlichgrauen oder graulichgrünen Schlacke. <sup>102</sup>

Wenn man kleine Stücken dieser Meteoriten in Chlorwassersstoffäure einige Zeit liegen lässt, so werden Nickeleisen und Masgnetkies unter Entwickelung von Wasserstoff und Schwefelwasserstoff und rötlichgelber Färbung der Säure aufgelöst und die den Meteoriten bildenden Silicate zersett. Nach Verlauf von einigen Tagen ist die Säure schleimig geworden, und es hat sich ein Absat von Rieselsäure am Voden des Gefäßes und auf den Stücken gebildet und auf der Oberfläche der Säure eine geringe Menge Schwefel abgeschieden. Wässch won den Stücken ab, so

<sup>101</sup>Man hat wohl oft von einer Schmelzbarkeit der Masse der Chondrit gesprochen, Hausmann bei dem Ch. von Bremervörde, Dufrenop bei dem von Château Renard, Damour bei dem von Montrejeau (Ausson); ich habe dies nie gesunden.

<sup>102</sup> Das Pulver wird dazu bekanntlich befeuchtet, auf der Kohle zu einer dünnen Platte ausgebreitet, mit dem Lötrohr erhitzt und die nun zusammenhängende Platte mit der Platinzange vorsichtig gefasst, und in der Lötrohrstamme geglüht. Um das Pulver recht sein reiben zu können, wurde aus dem zuerst erhaltenen gröblich Pulver des Meteoriten das darin enthaltene Rickeleisen mit den Wagneten ausgezogen.

<sup>103</sup> Jch habe diese Abscheidung bei mehreren dieser Meteoriten bestimmt wahrgenommen, was die Anwesenheit von Magnetkies in diesen Meteorsteinen beweist. Ebenso sah sie auch Harris bei dem Ch. von Montreseau (Ann. d. Chem. u. Pharm. 1859 B. 109, S. 183).

erscheinen dieselben sehr bröcklig und porös; sie sind weiß und erdig geworden, und die Rugeln, die von der Säure weniger angegrifs fen werden, ragen darauf hervor; sie haben noch ihre Form und ihre graue Farbe behalten, wenn sie vorher so gefärbt waren, wie bei den Ch. von Errleben und Aigle, und könnten bei gehöriger Vorsicht wohl ganz isoliert werden. Bei längerer Einwirkung der Säure wird aber der ganze Stein so mürbe, dass man ihn mit den Fingern gänzlich zu einem feinen Pulver zerdrücken kann. Dasselbe erscheint nun ganz weiß und enthält nur einzelne seine schwarze Teile, die man durch Feinreiben und Schlämmen wohl etwas konzentrieren, aber von den weißen Teilen nicht vollständig trennen fann. Sie sind wahrscheinlich nur Chromeisenerz; denn, wenn man den Rückstand vor dem Lötrohr mit Phosphorsalz schmilzt, so erhält man ein Glas, das, solange es heiß ist, durchsichtig ist und ein Kieselstelett einschließt, beim Erkalten aber opalisiert und eine wenn auch nur schwache doch deutliche chromarüne Farbe erhält.

Betrachtet man die mit kalter Chlorwasserstoffsäure digerierten und abgewaschenen Bruchstücke unter der Lupe, so erkennt man auf der Obersläche einzelne kleine, aber stark demantglänzende Kristalle. Ich habe diese bei vielen dieser Meteorit, ganz besonders aber bei Stücken von Aigle gesehen, die Monate lang in Chlorwasserstoffsäure gelegen hatten. Unter dem Mikrossop bei mäßiger Vergrößerung kann man, wenn man sie im reflektierten Lichte betrachtet, auch die Gestalt einzelner Flächen, von denen gerade das Licht zurückgestählt wird, erkennen, man sieht dann ganz scharf begrenzte Rhomben oder Deltoide, auch Rechtecke u. s. w., doch lässt sich danach die Form der Kristalle mit Sicherheit nicht bestims

men. Rocht man die Stücke mit Wasser oder auch mit kohlensaurem Natron, so verändern sich die Aristalle nicht im Geringsten; aber es gelang mir nicht, die Aristalle zu isolieren. Schabte man die Aristalle von der Obersläche, auf der sie sitzen, ab, so waren sie in dem erhaltenen Pulver nicht wieder zu erkennen. Ich habe so leider über ihre Natur nichts weiter ausmachen können. Wenn man kleine Stücken des Ch. von Aigle mit Chlorwasserstoffsäure kocht und dann sowie vorhin behandelt, so waren die Aristalle viel unvollkomsmener, es scheint also, dass sie nur in kalter Chlorwasserstoffsäure in der angegebenen Vollkommenheit erhalten werden können. 104

Die demische Zusammensetzung dieser Meteorit ist ungeachtet ihres oft verschiedenen Ansehens, doch sehr ähnlich, wie dies schon Berzelius gefunden hat, der sich, wie oben angeführt, mit dies ser Abteilung der Meteorit besonders beschäftigt hat, und wie dies auch alle späteren Analysen ergeben haben. Rammelsberg hat in seiner Mineralchemie (S. 924) diese Analysen neu berechnet und sehr aut zusammengestellt. Sie sind sämtlich nach der zuerst von Berzelius eingeschlagenen Methode, wonach durch Digestion des feis nen Vulvers mit heißer Chlorwasserstoffsäure die davon zersexbaren Gemengteil von den davon nicht zersetbaren getrennt werden, ans gestellt. Eine vollkommene Trennung der Gemengteil lässt sich, wie der Erfolg gezeigt hat, auf diese Weise nicht erreichen, da keiner der Gemengteil, das Chromeisenerz ausgenommen, in Chlorwas serstoffäure vollkommen unlöslich, der eine nur mehr oder minder als der andere löslich ist, also eine stärkere oder schwächere Chlorwasserstoffsäure oder eine längere oder fürzere Digestion damit bei

<sup>1043</sup>ch habe diese Kristalle mehreren meiner Freunde gezeigt, die nie einen Zweifel darüber hatten, dass es Kristalle wären.

höherer oder geringerer Temperatur oft sehr bemerkenswerte Unsterschiede in der Analyse eines Meteoriten hervordringen können; dennoch gewährt diese Methode Anhaltspunkte, die für die Deustung der Resultate von Wichtigkeit sind, und ist daher, wenn auch unvollkommen, immer schätbar. Ich will von den vorhandenen Analysen hier nach den Werken von Rammelsberg<sup>105</sup> nur einige derselben, und zwar die folgenden 4 ansühren, die Meteoriten der vier verschiedenen Gruppen betreffen:

- 1. Klein-Wenden nach Nammelsberg.
- 2. Chantonnay nach Berzelius.
- 3. Blansko nach Berzelius.
- 4. Rakowa nach Harris.

<sup>105</sup> Mineralchemie S. 925 u. s. f.

Allgemeine Zusammensetzung.	1	2106	3	4
Riceleisen	22,90	//	20,13	23,20
Schwefeleisen <sup>107</sup>	5,61	//	2,97	13,14
Chromeisenerz <sup>108</sup>	1,04	","	0,63	0,56
Silicate	70,45	","	76,27	63,21

Zusammensetzung des Rickeleisens.	1	2	3	4
Eisen	88,98	//	90,9	92,24
Nicel	10,35	<b>",</b> "	9,1	7,76
Robalt	10,35	//	//	" <b>,</b> "
Rupfer	0,21	<b>",</b> "	//	","
Sinn	0,35	//	//	","
Phosphor	0,11	","	//	","
	100	<b>",</b> "	100	100

Zusammensezung der Silicate.	1	2	3	4
Magnesia	<i>32,75</i>	27,79	32,49	27,06
Ralf	3,66	1,52	1,22	1,52
Eisenorydul	10,92	19,47	11,45	24,40
Manganorydul	0,08	0,76	0,59	" <b>,</b> "
Riceloryd	","	0,90	","	0,20
Rupferornd	0,21	","	","	","
Natron	0,41	1,24	0,98	1,31
Rali	0,53	1,24	0,24	0,21
Zonerde	5,23	2,95	2,94	2,61
Rieselsäure	46,18	44,16	48,95	44,68
	99,97	98,79	98,96	98,86

# Diese Silicate bestehen in 100 Teilen aus

	1	2	3	4
A. Zersetbaren S.	42,23	51,12	46,13	56,7
B. Unzersexbaren S.	<i>57,77</i>	48,88	<i>53</i> <b>,</b> 87	43,3

## A. Zusammensetzung der zersetbaren Silicate.

	Rl.	Sau	er <b>C</b> hantor	1.Sau	erBlanff	oSau	ei <b>R</b> akov	a Sau
	Wender	Ì						
Magnesia	20,00	9,27	17,56	10,48	19,89	9,77	11,2	10,09
Ralf	0,89	9,27	" <b>,</b> "	","	" <b>,</b> "	" <b>,</b> "	0,7	10,09
Eisenorydul	4,53	9,27	14,72	10,48	6,88	9,77	24,4	10,09
Manganoryd	ud,08	9,27	0,42	10,48	30,25	9,77	","	<b>",</b> "
Niceloryd	","	","	0,23	10,48	3 = <b>,</b> =	" <b>,</b> "	0,2	10,09
Natron	","	","	0,50	10,48	30,48	9,77	","	<b>",</b> "
Rali	","	","	0,50	10,48	30,24	9,77	","	<b>",</b> "
Tonerde	","	" <b>,</b> "	","	","	0,15	9,77	","	<b>",</b> "
Rieselsäure	16,72	8,68	16,67	8,65	18,20	9,45	19,5	10,12
	42,22		50,10		46,09		56,0	

B. Zusammensetzung der unzersetzbaren Silicate.

	Rl.=	Saue	rChantor	ı.Sau	erBlanff	oSau	erRakov	a Sauc
	Wender	I						
Magnesia	12,75	9,9410	910,23	7,19	12,60	7,90	15,86	8,25
Ralf	2,77	9,94	1,52	7,19	1,22	7,90	0,81	8,25
Eisenorydul	6,39	9,94	4,75	7,19	4,57	7,90	","	" <b>,</b> "
Manganoryd	uł,=	","	0,34	7,19	0,34	7,90	","	" <b>,</b> "
Niceloryd	0,21	9,94	0,67	7,19	","	","	","	" <b>,</b> "
Natron	0,41	9,94	0,49	7,19	0,50110	7,90	1,92	8,25
Rali	0,53	9,94	0,25	7,19	","	","	0,26	8,25
Tonerde	5,23	9,94	2,95	7,19	2,79	7,90	2,46	8,25
Rieselsäure	29,46	15,29	27,49	14,27	30,75	15,96	21,74	11,28
	57,75		48,69		<i>5</i> 2 <b>,</b> 77		43,05	

### Hieraus ergibt sich:

Dass das Rickeleisen der Chondrit in seiner chemischen Zusamsmensetzung mit dem für sich vorkommenden in dem Meteoreisen übereinstimmt,

dass die Silicate als Basen vorzugsweise Magnesia und Eisenorndul enthalten, und alle andern, wie Tonerde, Kalk, Kali, Natron sich nur in sehr geringer Menge sinden,

dass die Menge der zersetbaren und unzersetbaren Gemengteil in allen Chondriten ungefähr gleich ist,

dass bei den zersetbaren Silicaten die Basen fast allein aus Magnesia und Eisenorydul in etwas gegeneinander verschiedenen Mengen bestehen, während die nicht zersetbaren dieselben Basen

mit kleinen Mengen von Natron, Kali, Kalk und besonders von Tonerde enthalten.

Bei den zersetbaren Silicaten ist der Sauerstoff der Basen als gleich mit dem Sauerstoff der Rieselsäure anzunehmen. Wenn in der Tat der Sauerstoff der Basen ein klein wenig grösser als der der Rieselsäure ist, so erklären dies Berzelius und Nammelsberg gewiss sehr richtig dadurch, dass wohl immer noch etwas Nickeleisen in diesem Teile der Chondrit zurückgeblieben ist, der mit dem Magnete nicht vollskändig hat ausgezogen werden können, und dass durch die Säure auch schon eine gewisse Menge von dem doch immer nur schwer, nicht völlig unzersetbaren Teile zersett ist, dessen Basen, wie die kleinen Mengen von Tonerde, Kalk und die Alkalien beweisen, nun hier austreten, während die analytische Methode zur Folge hat, dass immer etwas Rieselsäure von dem zersetbaren Teile bei dem unzersetbaren bleibt.

Bei dem unzersetharen Gemengteil ist der Sauerstoff der Basen meistenteils ungefähr halb so groß als der der Säure.

Berzelius schloss daraus, dass der zersetbare Gemengteil Olivin sei. Das Verhältnis des Eisenoryduls zur Magnesia ist bei dem Olivin der verschiedene Chondrit etwas verschieden, doch ist dies auch bei dem terrestrischen Olivin der verschiedenen Fundörter der Fall. Den unzersetbaren Gemengteil hielt er wiederum für ein Gemenge und zwar eines Leucitartigen Minerals, welches die Zonerde und die Alkalien, und eines Augit-artigen, welches die andern Vasen, Magnesia, Kalk und Eisenorydul enthielt, in für welchen ersteren indessen Rammelsberg, wegen seiner Auslöslichkeit in Säuren ein

III Pongendorff Ann. 1836 B. 15, S. 221.

feldspatartiges Mineral und zwar den Labrador annahm, <sup>112</sup> der zwar auch, aber schwerer als der Leucit zersetbar ist und dessen Sauerstoffverhältnis sich nicht viel von dem des Leucits entfernt. <sup>113</sup>

Dieser Annahme ist man nun später teils gefolgt, Teils hat man wieder neue Rombinationen gemacht. So halten es Chancel und Moitessier<sup>114</sup> bei der Analyse des Ch. von Montrejeau (Ausson) für wahrscheinlich, dass darin nicht Labrador und Augit, sonders Oligostas und Hornblende enthalten sei, Sartorius<sup>115</sup> berechnet in dem unzersetzbaren Gemengteil des Ch. von Ratova nach der Analyse von Harris 82,17 Magnesia-Wollastonit und 17,4 Anorthit, und Abich<sup>116</sup> nimmt an, dass die Silicate in dem Ch. von Stauropol Hyalosiderit, Olivin und Labrador seien und ersterer den zersetzbaren, letztere den unzersetzbaren Gemengteil ausmachen.

Bu allen diesen Annahmen gibt aber die mineralogische Untersuchung, wie das eben Angeführte dartut, nicht das mindeste Anshalten. Labrador, Oligoslas und Anorthit mit ihren taselartigen Kristallen und der so charakteristischen Streifung auf den Spalstungsslächen des Querbruchs zeigt sich nie, Augit und Hornblende müssten bei ihrer Unersetbarkeit durch Säuren doch nach Auflösung des zersetbaren Gemengteil in dem unzersetbaren zu sinden sein, in welchem sich wohl etwas Chromeisenerz, aber nichts anderes erstennen lässt. Magnesias Wollastonit ist noch nie beobachtet, müsste aber wie das Wollastonit durch Säuren zersetbar sein, und könnte sich nicht, ebenso wenig wie der Anorthit in dem unzersetbaren

<sup>112</sup> Mineralchemie S. 931.

<sup>113</sup> Der Sauerstoff der Basen zu dem der Kieselsäure ist bei ihm wie 1:11/2.

<sup>114</sup> Comptes rendus, 1859 t. 47, p. 267 et p. 479.

<sup>115</sup> Ber. d. Wiener Acad. 1859, B. 34 (S. 3).

<sup>116</sup> Bulletin de l'acad. d. sciences de St. Petersbourg 1860, t. 2, p. 404.

Gemengteil finden, was schon Wöhler bemerkt hat. Olivin kann bei seiner leichten Zersetbarkeit auch nicht in dem unzersetbaren Gemengteil vorkommen und ihn außerdem in einem Gemenge mit Hvalosiderit anzunehmen, ist nicht zu billigen, da beide isomorph sind und isomorphe Körper in einem Gemenge nie beobachtet sind und auch nicht vorkommen können, da man nicht einsieht, warum sich nicht beide hätten, verbinden und in diesem Falle einen Olivin von mittlerem Eisengehalt hätten bilden sollen. 117

Man sieht, zu welcher Willkür es führt, wenn man Mineralien aus der Analyse eines Mineralgemenges berechnet, die man nicht gesehen hat, und noch dazu das chemische Verhalten dieser Mineralien gar nicht berücksichtigt. Die einzigen Gemengteil, die man mit Sicherheit in diesen Meteoriten annehmen kann, weil man sie sehen kann, sind außer dem Nickeleisen und Magnetkies nur Olivin und Chromeisenerz. Woraus die Grundmasse besteht, ob der schwarze Gemengteil nur Chromeisenerz oder ein Gemenge desselben mit einer anderen Substanz sei, wie die mikrostopische Untersuchung wahrscheinlich macht, und woraus ganz besonders die Rugeln bestehen, wissen wir nicht. Freilich sind diese schon analysiert worden, aber nur in einer frühen Zeit von Howard, 118 dem wir überhaupt die erste Analyse eines Meteoriten verdanken. Derselbe trennte bei der Analyse des Ch. von Benares die Rugeln von der Grundmasse und untersuchte beide besonders, nachdem er auf den letzteren das Rickeleisen mit den Magneten ausgezogen hatte, und fand nun beide ungefähr gleich zusammengesett, nämlich:

<sup>117</sup> Der Beweif, den Abich für die Richtigkeit seiner Annahme aus dem Umstand entnimmt, dass die Summe der spezifischen Gewichte der angenommenen Gemengteil mit den spezifischen Gewichten des Steins stimmt, ist scheinbar, da dergleichen Berechnungen bei den Gebirgsarten auf vielen Gründen noch nie sichere Resultate gegeben haben.

<sup>118</sup> Philos. transactions 1802 und darauf in Gilberts Annalen B. 13, S. 311.

	in den Rugeln	in der Grundmasse
Magnesia	15,00	18,00
Niceloryd	2,5	2,5
Eisenornd	34,00	34,00
Rieselsäure	50,00	48,00

Später sind sie bei der Analyse wenig beachtet. Berzelius stellte bei der Analyse des Ch. von Blansko aus Mangel an Material nur einige Versuche mit ihnen an, auf denen er indessen glaubte denselben Schluss wie Howard ziehen zu können, dass sie mit der übrigen Masse des Meteoriten gleich zusammengesetzt wären. 119 Er fand dabei, dass ein Teil ihres Pulvers gelatiniere, ein anderer von der Säure gar nicht verändert werde. In der neusten Zeit glaubt zwar Damour, dem wir auch eine sorgfältige Analyse des an diesen Rugeln so reichen Meteoriten von Montrejeau (Ausson) verdanken, 120 dass er eine Analyse der Rugeln gegeben habe, indem er der Meinung ist, dass darauf der ganze von Säuren nicht oder schwer zersetbare Teil des Meteoriten bestehe, den er besonders untersucht hat; dies ist aber doch noch zu beweisen, da er die Rugeln für die Analyse nicht besonders ausgesucht hat. Diesen unzersetbaren Teil, den er allein als auf den Rugeln bestehend ans nimmt und den er ähnlich wie bei den oben angeführten Analysen zusammengesett fand, hält er aber nicht für ein einfaches Mineral, sondern für ein Gemenge von Augit und Feldspat, berechnet somit wieder Mineralien, die gar nicht in den Rugeln zu erkennen

<sup>119</sup> Pongendorff Annalen 1834, B. 33, S. 21.

<sup>120</sup> Comptes rendus 1859 t. 49, p. 31.

sind und noch dazu ein Gemenge, das nie beobachtet ist, was ihm auch Leymerie<sup>121</sup> vorwirft, der auf der Analyse von Damour nur den Schluss ziehen zu können glaubt, dass die Rugeln ein Silicat von Magnesia und Eisenorydul mit höherem Rieselsäuregehalt als im Olivin seien, wenn nicht dieser höhere Rieselsäuregehalt von anhängender Grundmasse herzuleiten sei.

Auf der mikrostopischen Untersuchung der Rugeln geht hervor, dass dieselben zweierlei Art ist, die einen vielleicht nur Olivin, die andern mit fasriger Struktur davon verschieden, ein wahrscheinslich Tonerdeshaltiges Doppelsilicat. Es bleiben demnach von wirkslich bestimmten Gemengteilen in den Chondriten immer nur noch Rickeleisen, Magnetkies, Olivin und Chromeisenerz, von nicht bestimmten die fragliche Grundmasse, der schwarze Gemengteil neben dem Chromeisenerz und die Rugeln mit fasriger Struktur, wenn die übrigen Olivin sind.

### 2.2 Howardit.

Zu dieser Art gehören nur wenige Meteorit; von den im misneralogischen Museum befindlichen nur der von

- 1. Loutolar in Finnland, gef. 1813, 13. Dez. 122
- 2. Bialystok in Russland, gef. 1827, 5. Okt.
- 3. Mässing in Bayern, gef. 1803, 13. Der.

<sup>121</sup> Comptes rendus 1859, t. 49, p. 247.

<sup>122</sup> Nicht Lontolag, wie gewöhnlich geschrieben wird (f. Nordenstiöld in der weiter unten zitierten Schrift, auch Berzelius in Poggendorff Ann. 1834 B. 33 lette Seite unter den Berichtigungen, die von Berzelius herrühren. Lautolag, wie hier sieht, ist nur die schwedische Aussprache von Loutolag). Nach Buchner müsste es heißen Luotolass, welches sinnische Wort "Felsenbucht" bedeutet. (Poggendorff Ann. 1862 B. 116, S. 643.)

- 4. Nobleborough in Maine, Ver. St. 1823, 7. Aug.
- 5. Mallygaum in Kandeish, Ostindien 1843, 26. Juli.

Bei der geringen Zahl der Meteoriten dieser Art ziehe ich es vor, sie einzeln zu beschreiben, und fange mit dem Ch. von Loutolag an, da mit diesem schon die meisten Untersuchungen gemacht sind.

1) Loutolar, Wiborgs Län in Finnland. Die Steine, deren nur wenige gesammelt sind, da sie meistenteils auf die Eisdecke eines Seef sielen, in welchen sie beim Tauen einsanken, sind von Nordenskiöld<sup>123</sup> beschrieben und von Berzelius, <sup>124</sup> wenn auch nur unvollständig, untersucht. Das mineralogische Museum besitzt davon nur zwei kleine Stücken, zusammen 0,327 Lth. schwer, welche beide ein Geschenk von Berzelius sind.

Der M. von Loutolax hat eine porphyrartige Struktur und besteht auf einer graulichweißen, seinkörnigen, sehr zerreiblichen Grundmasse mit eingemengten kleinen Körnern von grünlichgelber, weißer und schwarzer Farbe.

Die grünlichgelben Körner sind die häufigsten; sie sind höchstens von der Größe eines Stecknadelknopfes, meistens kleiner und unregelmäßig begrenzt, haben aber ganz das Ansehen wie Olivin, wosür sie auch von Nordenstiöld und Berzelius gehalten sind. Vor dem Lötrohr werden sie dunkler von Farbe und schwärzlichgrün, schmelzen aber nicht.

Die weißen Körner sind seltener und auch nicht grösser und zerbrechen dabei, wenn man sie herausnimmt, in noch kleinere

<sup>123</sup> Bibrag til närmere Kännedom af Finlands mineralier, p. 99 und darauf in: Neues Journ. f. Chem. u. Vhys., T. 1, S. 60.

<sup>124</sup> Pongendorfff Annalen 1834, B. 53, S. 30 und Rammelsbergf Mineralchemie, S. 940.

Stückhen. Sie sind nur unregelmäßig begrenzt, scheinen aber doch spaltbar zu sein. Vor dem Lötrohr sind sie nach Nordenstiöld unschmelzbar und lösen sich nur langsam in Borar und Phosphorsalz auf; mit Phosphorsalz opalisiert die Rugel beim Erkalten; mit Robaltsolution beseuchtet, werden sie blau. Nordenstiöld ist der Meinung, dass sie Leucit sind, doch damit wäre die Spaltbarkeit im Widerspruch. Eher möchte ich vermuten, dass sie Anorthit wären; die Körner waren aber zu klein und die mir zu Geboten stehende Masse zu gering, um weitere Versuche damit machen zu können. Die Entscheidung muss daher noch dahin gestellt bleiben. An manchen Stellen war der Olivin mit diesen weißen Körnern sein gemengt.

Von schwarzen Körnern finden sich einzelne größere und kleinere in der Masse zerstreut. Die ersteren lassen sich meistens leicht auf der Masse, in der sie liegen, herausnehmen und hinterlassen darin den Eindruck ihrer Masse, sind aber doch meistens mit kleinen weißen Körnern gemengt und zerbrechen beim Herausnehmen auch leicht. Sie sind im Bruch matt und dicht, nicht magnetisch, geben ein lichtes braunes Pulver, lösen sich vor dem Lötrohr in Phosphorssalz nur langsam auf und geben ein nur schwach grün gefärdtes Glas, das beim Erkalten opalisiert. Wahrscheinlich sind sie, ungesachtet der nur schwachen grünen Färbung und des Opalisierens, was von der Beimengung herrühren mag, Chromeisenerz. Als ein taselssörmiges solches Korn mit rauer Oberfläche herausgenommen wurde, fand sich die entstandene Höhlung mit kleinen Körnchen gediegen Eisen umgeben, von denen eins, welches heraussiel, die

<sup>125</sup> Berzelius hat diese Körner gar nicht erkannt, er verwechselt sie mit der Grundmasse, und glaubt Nordenskiöld habe diese für Leucit gehalten, was doch nicht der Fall ist.

Größe eines Hirsekorns hatte. Feine Körner, wenn auch für das Auge nicht sichtbar, finden sich noch in der Masse zerstreut, denn auf dem Pulver des Meteoriten kann man mit den Magneten feine Teilden außiehen, die im Mörser sich zu silberweißen, stark metallisch glänzenden Blättchen breitdrücken lassen. Db sie nickelhaltig sind, haben weder ich noch Nordenstiöld untersucht, der ihrer ebenfalls erwähnt. Berzelius leugnet das Dasein dieses gediegenen Eisens und hält die Körner, die er mit den Magneten außog, für Mas gneteisenerz, da sie sich in Chlorwasserstoffsäure ohne Geruch nach Schwefelwasserstoff und ohne Gasentwickelung zu einer dunkelgels ben Flüssigkeit auflösen. Indessen möchte doch der starke metallische Glanz, die fast silberweiße Farbe und die Dehnbarkeit, die beim Zerreiben im Mörser zum Vorschein kommen, keinen Zweisel gestatten, dass die Körner gediegenes Eisen sind. Auf jeden Fall ist dies Verhalten für die Beurteilung ihrer Beschaffenheit geeigneter als das Verhalten gegen Säure, da eine schwache Gasentwickelung bei geringer angewandter Menge leicht übersehen werden kann.

Außer diesem Eisen bemerkte ich auch noch sehr kleine, metallisch glänzende Körner von bräunlichgelber Farbe, die offenbar Magnetskies sind. Sie sinden sich aber nur so sparsam, dass man gewiss wird Stücke auslösen können, ohne den Geruch nach Schwefelwasserstoff zu bemerken. Ein solches Korn Magnetkies sah auch Partsch, der aber wiederum von dem gediegenen Eisen nichts angibt.

Die zerreibliche Grundmasse, in welcher die angegebenen Gesmengteil liegen, schmilzt vor dem Lötrohr zu einem schwarzen Glasse, das nur sehr schwach magnetisch ist und sich in Phosphorsalz nur sehr langsam mit Hinterlassung eines Rücktandes von Kieselsäure

auflöst. Das entstandene Glas ist grünlichweiß, solange es heiß ist, wird beim Erkalten erst wasserhell und opalisiert zulett.

Das spezifische Gewicht des Steins gibt Rummler zu 3,07 an. äußerlich ist der Stein mit einer schwarzen glänzenden Rinde umgeben.

Bei einer leider nur unvollständig gebliebenen Analyse dieses interessanten Meteorsteins zersetzte Berzelius denselben, nachdem alles dem Magnete Folgsame ausgezogen war, mit Königswasser und erhielt nur 6,45 p.C. unlöslichen Nückstand; 93,55 Teile wurden von der Säure zersetzt. Diese bestanden aus

		Sauerstoff
Magnesia	32,92	13,17
Eisenorydul	28,61	6,35
Manganorydul	0,79	0,18
Zonerde	0,26	0,12
Rieselsäure	37,42	19,42
Zinnozid, Kupferozyd, Kali und Natron	Spur	
	100,00	

Hiernach hätte dieser Teil die Zusammensetzung eines Olivins, der 1 Atom Eisenorwaul gegen 2 Atome Magnesia enthält. Indesen ist er doch nicht für ein einsaches Mineral zu halten, da der Augenschein lehrt, dass er ein Gemenge ist.

Die unzersetzen 6.45 wurden mit Flussfäure behandelt, wodurch ungefähr 1 p.C. Chromeisenerz unaufgelöst blieb; das übrige war ein Silicat von Tonerde, Eisenorydul, Manganorydul, Ralf und

Magnesia, nach Verzelius in Verhältnissen, wie sie etwa in dem unzersetzen Teil in dem Meteorstein von Blansko vorkommen.

2) Bialystof (Dorf Knasta) in Russland. Das mineralogische Museum besitzt noch jetzt, nachdem davon ein Teil an das kais. Mineralienkabinett in Wien abgegeben, ein 4,857 Loth schweres Stück, das die kais. Akademie der Wiss. in Petersburg Hrn. A. v. Humboldt verehrte und das von diesem dem mineralogischen Museum in Verlin übergeben ist. 126

Der H. von Bialystock hat die größte ähnlichkeit mit dem vorigen und enthält in der feinkörnigen weißen Grundmasse dieselben Gemengteil, nämlich:

Olivin in einzelnen Körnern von Hirsekorn-Größe bis zu Körnern von anderthalb Linien Durchmesser, ohne regelmäßige Form, die einen unebenen Bruch, verschiedene gelblichgrüne, grasgrüne, holzbraune Farben und Fettglanz haben.

Anorthit (?) in weißen Körnern von höchstens Stecknadelknops-Größe, schneeweiß und von unebenem Bruch; zuweilen sieht man eine Spaltungsfläche, die glatt auch wohl gestreift ist; ebenso bröcklig wie bei dem H. von Loutolar.

Außer diesen Körnern von Olivin und Anorthit, die einzeln in der Grundmasse zerstreut sind, sieht man in derselben aber noch meherere 3-4 Linien große Partien liegen, die ein körniges Gemenge der angeführten Gemengteil sind. Sie sind scharf begrenzt und unregelmäßig von Gestalt, nehmen aber zuweilen fast das Ansehen eines Kristalls an, und erscheinen wie rektanguläre Prismen von Olivin mit ziemlich geraden Flächen, die aber im Innern durchgängig

<sup>126</sup> Val. Reise nach dem Ural, Altai und die kaspischen Meere von G. Rose Th. J. S. 77.

mit den kleinen weißen Kristallen gemengt sind. Diese scheinbaren Kristalle lassen sich vollständig auf der Grundmasse herausnehmen und hinterlassen darin ihrer Form entsprechende Eindrücke (in dem Stücke des min. Museums ist ein solcher scheinbarer Kristall von 6 Linien Breite und Höhe und von 4 Linien Tiese sichtbar). Sie sind wegen des häusig beigemengten Anorthits gewöhnlich von lichter Farbe; es kommen aber auch Partien vor, die eine dunklere, ohne Lupe betrachtet, fast schwärzlichgraue Farbe haben, doch sind diese ebensolche Gemenge nur mit vorwaltendem Olivin.

Es wird hiernach wahrscheinlich, dass auch die Grundmasse wenigstens hauptsächlich nichts anderes als ein eben solches nur seinkörnigeres Gemenge von Olivin und Anorthit ist, wie es die grobkörnigen Partien sind. 127 Der H. von Bialustock verhielte sich also in dieser Rücksicht wie der weiter unten zu erwähnende Eukrit von Stansnern, bei dem sich auch an ein und demselben Stücke seins und grobkörnige Abänderungen sinden; nur mit dem Unterschiede, dass letzterer größtenteils grobkörnig, und nur selten und an einzelnen Stellen seinkörnig ist, der H. von Bialustock dagegen größtenteils seinkörnig, und nur an einzelnen Stellen grobkörnig ist.

Die seinkörnige Grundmasse ist vor dem Lötrohr zu einem schwarzen Glase schmelzbar, das in dünnen Splittern nur bräunlich gefärbt, und durchsichtig ist, wie die Grundmasse von Loutolax. 128

Gediegen Eisen findet sich ebenfalls in dem H. von Bialystock; man sieht es in äußerst kleinen Körnern in den groben körnigen und besonders den dunkleren Partien liegen; besser erkennt man es

<sup>127</sup> Dieff wäre denn auch bei dem Stein von Loutolag zu vermuten.

<sup>128</sup> Diess ist kein Beweis gegen die Annahme von Anorthit und Olivin in derselben, die beide unschmelzbar sind, da ein künstliches Gemenge von Anorthit und Olivin auch vor dem kötrohr schmelzbar ist.

noch, wenn man kleine Stücke zu Pulver reibt, wo man dann die feinen Eisenkörner mit dem Magnete außiehen kann. Ebenso kann man auch einzelne feine Körner von Magnetkief erkennen.

Spezifisches Gewicht nach Rummler 3,17. äußerlich schwarze glänzende Rinde.

Fein gerieben, und mit Chlorwasserstoffsäure in einem Reasgenzglase gesocht, wird er zersett<sup>129</sup> und gelatiniert. Mit Wasser geschüttelt, kann die abgeschiedene Rieselsäure durch Abschlämmen von kleinen schwarzen Körnern, wenn auch nicht vollskändig gestrennt werden, die sehr wahrscheinlich Chromeisenerz sind, doch in zu geringer Menge in der kleinen Probe, die zu den Versuchen genommen, vorhanden waren, um weitere Versuche damit anstellen zu können.

3) Mässing (Dorf St. Nicolas) Landgericht Eggenfelde in Bapern; ein Stück 1,433 Lth. schwer, von den dort einzeln gefalslenen Steinen von 3 1/4 Pfund, 130 aus der Chladnischen Sammslung.

Gleicht dem H. von Bialystock vollkommen. In der graulichen Geischen seines feinkörnigen zerreiblichen Grundmasse liegen häufig Körner von Olivin von verschiedener Größe und Farbe, grünlichgelb bis grasgrün, von der Größe eines Hirsekorns bis zu der eines groben Schrotes, dann wieder größere unvollkommen ausgebildete Kristale won schmukig grünlichgrauer Farbe, die kleine weiße Körner eingewachsen enthalten. Diese liegen auch sonst in der Masse, haben einen unebenen Bruch, und ließen von Spaltbarkeit nichts sehen.

<sup>129</sup> Ob vollständig, habe ich leider nicht untersucht.

<sup>130</sup> Vergl. den Bericht daruber vom Prof. Imhof in Munchen in Gilbertf Annalen von 1804. Bb. 18, S. 330.

Mit den Magneten lassen sich auf der gepulverten Masse Eissenkörner außiehen.

Spezifisches Gewicht nach Rummler 3,21, einer Rugel darauf (wahrscheinlich einer von den eingemengten unvollkommenen Rrise tallen) 3,26.

äußere schwarze glänzende Rinde.

Eine neuere chemische Analyse dieses Meteoriten ist nicht vorhans den, die ältere Untersuchung von Imhof hat folgende Bestandteile gegeben:

Magnesia	23,25
Eisenoryd	32,54
Rieselsäure	31,0
Nidel	1,35
Eisen	1,8
Verlust an Schwefel und Nickel	10,06
	100

Die H. von Robleborough und Mallygaum sind nach den Proben in dem mineralogischen Museum den vorigen sehr ähnlich, doch sind diese Stücke zu klein, um zu einer besonderen Beschreibung dienen zu können.

Hiernach ist also der Howardit wahrscheinlich nur ein mehr oder weniger seinkörniges Gemenge von vorherrschendem Olivin mit Anorthit und einer geringen Menge von Chromeisenerz, Nickeleisen und Magnetkies.

### 2.3 Chassignit.

Zu dieser Art gehört unter den Meteoriten des Verliner Museums nur ein einziger, nämlich der am 3. Oktober 1815 zu Chassigny bei Langres (Dep. der haute Marne) gefallene Meteorit, daher ich nach ihm die Art Chassignit zu nennen vorgeschlagen habe. Nachrichten über die Erscheinungen bei seinem Falle und eine Beschreibung seiner Masse haben Pistolet, Calmelet und Gillet de Laumont, eine chemische Analyse der Masse hat Bauquelin geliefert. Isl Er hatte bei seinem Falle in dem Boden ein Loch von einem viertel Meter Tiese und einem halben Meter Breite eingeschlagen, und zersprang dabei in viele Stücke, die weit herumgeworsen wurden, eins sogar bis zu einer Entsernung von 240 Schritt. Alle Steine, die man gesammelt hat, wogen beinahe 4 Kilogramm. Is2 Das Berliner Museum besitzt davon nur ein kleines 0,79 Loth schweres, jedoch deutliches Stück, das aus der Chladnischen Sammlung stammt, und einige kleine Proben, die später erworben wurden.

Der Chassignit ist hiernach eine kleinkörnige fast gleichartige Masse von nur geringem Zusammenhalt, so dass sie sich schon zwischen den Fingern zerbröckeln lässt. Sie ist von einer grünlichgelben Farbe, die sich etwas ins grau zieht, wenig glänzend von Fettsglanz, nur an den Kanten durchscheinend und von der Härte des Feldspats. Darin sind hie und da kleine bräunlichschwarze Körner eingesprengt, und noch viel sparsamer als diese, noch kleinere fast

<sup>131</sup> Pistolet und Bauquelin in den Annales de Chemie et de Physique, 1816. t. 1, p. 49 und daraus in Gilberts Annalen von 1818, Bd. 58, S. 176; Calmelet und Gillet de Laumont in den Annales des mines, 1816. t. 1, p. 489.

<sup>132</sup> Pistolet, Arzt in Langres, der 2 Tage nach dem Falle an Ort und Stelle war, sammelte noch 60 kleine Bruchstücke, das größte, in dessen Besitz er gelangte, wog beinahe 1 Kilogrammen.

mikroskopische Körner und Kristalle (Hexaeder, wie es scheint) von einer gelben metallisch glänzenden Substanz. Die Rinde ist dünn, glatt und glanzlos; sie wirkt schon schwach auf die Magnetnadel; das Innere nicht. In der unmittelbaren Rähe der Rinde ist der Stein braun gefärbt, wie schon Calmelet bemerkt. 133

Vauquelin fand, dass die Masse mit Chlorwasserstoffsäure gelastiniert, dass sie von Schwefelsäure mit Hinterlassung eines pulversförmigen Rückstandes von Rieselsäure zersett wird, ohne Entwickelung von Wasserstoffgas, wie bei den eisenhaltigen Meteoriten, und eine farblose Auslösung gibt.

Ich fand ihn ferner vor dem Lötrohr schwer schwelzbar zu einer schwarzen magnetischen Schlacke von derselben Beschaffenheit wie die Ninde.

Die Analyse von Vauquelin gab:

Magnesia 32,0 Eisenoryd 31,0 Rieselsäure 33,9 Chromium 2,0 98,9

Nimmt man an, dass das Eisen als Drydul in dem Steine enthalten sei, so verhalten sich die Sauerstoffmengen von

<sup>133</sup> Im Innern der Masse beobachtete Calmelet bei einem Stücke "un indice de cristal plus complet," dessen Korm er für ein niedriges schiefes Prisma hielt. Gillet de Laumont, der das beschriebene Stück von Calmelet eingehändigt bekam, hatte diesen Kristall auf der Masse, worin er steckte, herausgenommen und näher untersucht, und glaubte daran die Form des Augits erkannt zu haben; er gibt seine Höhe zu 4 Millimeter an. Da die Beschreibung aber nur sehr undestimmt ist, gar nicht angeführt wird, dass sich der Kristall von der umgebenden Masse an Farbe unterschieden habe, ein einzelner Augitkristall in der übrigen ganz verschiedenen Masse sehr aussallend wäre, so scheint es mir, dass dem Ganzen nur eine Täuschung zum Grunde liegt, und der angebliche Kristall nur eine zufällig mehr regelmäßige Form eines der Körner sei, die die ganze Masse zusammensezen.

$$\mathfrak{Mg}: \mathfrak{Fe}: \mathfrak{Si} = 12,57:6,19:17,60$$
  
oder von  $\mathfrak{Mg} + \mathfrak{Fe}: \mathfrak{Si} = 18,76:17,6.$ 

d. i. beinahe wie 1:1. Das Silicat ist also Olivin, und zwar ein sehr eisenreicher Olivin, wodurch sich seine Schmelzbarkeit erflärt. 134 Der gewöhnliche Olivin, der 7 bis 12 p.C. Eisenorndul enthält, ist vor dem Lötrohr unschmelzbar, aber der Olivin des Raiserstuhls, der sog. Hnalosiderit, der 28,49 p.C. Eisenorndul enthält, schmilzt wie der Olivin des Chassignit; ihm ist dieser vergleichbar. Auch das spezifische Gewicht stimmt damit; v. Schreibers und Nummler geben das spez. Gewicht des ganzen Steins zu 3,55 an. 135 Das spez. Gew. des gewöhnlichen Olivins ist nach Mohs 3,441, das des eisenreichen ist genau noch nicht gekannt, aber notwendig etwas grösser. 136 Vauguelin hebt noch den Umstand hervor, dass in diesem Meteoriten kein Nickel vorhanden sei, was er der Abwesenheit des Eisens zuschreibt; dass sich aber auch in dem Olivin fein Rickel findet, ist in übereinstimmung mit den übrigen Erscheis nungen, da in allen meteorischen Olivinen, die untersucht sind, kein Nickel gefunden ist.

Die kleinen sparsam eingemengten schwarzen Körner hält Vauquelin für metallisches Chrom. An dem kleinen Stücke des min. Museums konnte ich bei keinem dieser schwarzen Körner nur irgendetwas von regelmäßiger Form wahrnehmen. Sie sind aber

<sup>134</sup> Vergl. die Zeitschrift d. d. geologischen Ges. 1861, Vd. 13, S. 526.

<sup>135</sup> Partsch, Meteoriten, S. 147.

 $<sup>^{136}</sup>$  Die Angabe des spez. Gew. des Hyalosiderit von Balchner = 2,875 ist offenbar unrichtig und zu niedrig.

bräunlichschwarz, von schwachem Halbmetallglanz, ganz undurchssichtig, geben zerrieben ein gelblichbraunes Pulver, sind schwach magnetisch, werden geglüht stärter magnetisch, und lösen sich vor dem Lötrohr in Phosphorsalz und Borax zu einem schönen grünen Glase auf. Diest sind alles Eigenschaften des Chromeisenerzes, daher man auch wohl unbedenklich die schwarzen Körner für dieses nehmen darf.

Schwieriger scheint die Bestimmung der gelben metallisch glänzenden Körner. Sie lösen sich in Salzsäure nicht auf; dieser Umstand und die bei einigen derselben wahrscheinlich vorkommende Hegaedersorm sprechen für Eisenkies; bei der geringen mir zu Geboten stehenden Menge habe ich aber keine weiteren Versuche machen können, und da Eisenkies in den Meteoriten bis setzt noch nicht mit Sicherheit beobachtet ist, so wären allerdings noch weitere Versuche wünschenswert, um über diesen Umstand mit Vestimmtheit zu entscheiden. Dass Vauquelin keinen Schwefel angibt, würde nichts beweisen, da bei der äußerst geringen Menge, in der er nur vorhanden sein könnte, er ihm leicht entgangen sein kann.

Der Meteorit von Chassigny ist hiernach ein derber eisenreicher Olivin mit sparsam eingemengtem Chromeisenerz und einer noch geringeren Menge einer Substanz, die möglicher Weise Eisenkiessein könnte. 137

<sup>137</sup> Eine Analyse dieses Meteoriten, die Damour nach meiner ersten Beschreibung desselben in der d. d. geol. Ges. und nach der Lesung dieser Abhandlung in den Comptes rendus (1862, t. 4, p. 591) bekannt gemacht hat, bestätigt dies Resultat vollkommen. Sie gibt an:

#### 2.4 Chladnit.

Die vierte Art enthält wie die dritte nur einen Meteoriten, den, welcher zu Bishopville im nördlichen Teil des Sumter-Distrikts in Süd-Carolina im März 1843 gefallen ist. Es siel dort nur ein Stein von ungefähr 13 Pfd., der bald nach seinem Falle in den Besitz des Prof. Shepard gelangte, dem wir auch die erste Besichreibung und Analyse dieses merkwürdigen Steins verdanken. Nachher haben noch Sartorius und Nammelsberg Untersuchungen damit angestellt. Die Berliner Sammlung besitzt davon ein größeres Stück von 4,86 Loth und mehrere kleinere.

Der Stein ist von äußerst geringem Zusammenhalt und zerfällt in Stücke bei dem geringsten Druck. Er ist im Allgemeinen von porphyrartigkörniger Struktur. In einer hellgrauen, weiß gestleckten, kleinkörnigen Grundmasse finden sich außer einigen andern Sinmengungen von geringerer Bedeutung nur schneeweiße Kristalle von verschiedener Größe und in großer Menge eingeschlossen, oft sich gegenseitig begrenzend und in der Ausbildung sich störend.

		Sauerstoff
Magnefia	37,76	12,48
Eisenorydul	26,70	5,93
Manganorydul	0,45	0,1
Rali	0,66	
Chromoryd	0,75	
Rieselsäure	35,20	18,33
Chromeisenerz u. Augit	3 <b>,</b> 77	•

Ef folgt hierauf die genauere Formel

$$(2\mathfrak{M}\mathfrak{q}+\mathfrak{Fe})^2\mathfrak{Si}$$

welche die des Hvalosiderit vom Kaiserstuhl ist. Der in der Analyse angeführte Augit ist nur angenommen, nicht bewiesen. Das spezifische Gewicht gibt Damour zu 3,57 an.

<sup>138</sup> Silliman American Journal of Science and arts, sec. Ser. t. 2, p. 337.

<sup>139</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. B. 79, S. 369.

<sup>140</sup> Monatsber. d. f. Akad. d. Wiff. zu Berlin 1861, S. 895.

Der größte Kristall auf den Stücken des Berliner Museums zeigt auf der Bruchfläche des Gesteins einen Durchschnitt von der Ges stalt eines Rechtecks mit schwach abgestumpften Eden, dessen Länge einen halben Zoll beträgt und dessen Breite etwas geringer ist; ein anderer zeigt den eines symmetrischen Sechsecks mit zwei parallelen längeren Seiten, das etwas über einen halben Zoll lang und etwas weniger als ein Viertel Zoll breit ist; doch sind bei beiden die Seiten der Durchschnitte nicht sehr geradlinig, die Umrisse aller übrigen Kristalle indessen noch undeutlicher. Die beiden ersteren Rristalle sind parallel einer Spaltungsfläche durchgebrochen, die aber nicht sehr vollkommen, sondern durch unebenen Bruch unterbrochen ist. Die Bruchfläche ist glänzend von Verlmutterglanz und wird von matten Streifen parallel den längeren Seiten der Durchschnitte durchzogen. Wodurch diese hervorgebracht werden, kann ich nicht angeben, man sieht aber dasselbe Aussehen auch bei den Durchschnitten anderer Kristalle, dagegen wieder andere ganz glatte Spaltungflächen in einer Richtung zeigen. Endlich finden sich auch runde weiße Körner von verschiedener bis Erbsengroße, die beim Herausnehmen runde, aber unebene Höhlungen in dem Gestein hinterlassen, auch nur durchscheinend sind, aber Glasglanz haben. Nimmt man die Kristalle oder Körner auf dem Gestein berauf, so zerfallen sie in kleine Stückhen, da sie mit vielen geraden und frummen Klüften nach den verschiedensten Richtungen durchsett sind, und dann ist ef nicht mehr möglich, die einzelnen Teilchen zu unterscheiden.

Es ist wahrscheinlich, dass die Körner von den Kristallen versschieden sind und bei diesen sich vielleicht auch noch die mit glatten

und gestreiften Spaltungsslächen unterscheiben. Shepard erwähnt auch der runden Körner und trennt sie von den Kristallen; er erklärt die ersteren für Anorthit, ohne jedoch etwas anders zu ihrer Charafterisierung anzuführen als einige Lötrohrversuche, die keine wesentlichen Verschiedenheiten von den mit den Kristallen angestellten gaben. Die Kristalle bezeichnet er als eine neue Mineralgattung, der er, wie schon S. 29 angeführt, den Ramen Chladnit gegeben hat und den ich mir erlaubt habe, wie ebenfalls angegeben, in den von Shepardit umzuändern. Von der Form dieses Shepardit macht Shepard auch nur unbestimmte Angaben, wenngleich er Rristalle beobachtet hat, die nach seiner Angabe beinahe einen Boll im Durchmesser haben. Im Allgemeinen haben sie nach ihm das Ansehen der gewöhnlichen Formen des Feldspats oder Albits; die primitive Form wäre ein doppelt schiefes Prisma; durch Spals tung, die sich mit Leichtigkeit bewerkstelligen ließe, wären Winkel von 120° und 60° zu erhalten.

Auch Sartorius spricht von der Form dieser Kristalle, und versgleicht sie mit der des Wollastonits, ohne weitere Winkel anzugeben; indessen hat er sie nur bei kleinen mikroskopischen Kristallen bemerkt und auch nicht angeführt, wie diese vorkommen.

Die Härte des Shepardit ist nach diesen Beobachtern die des Feldspats, das spezissische Gewicht nach Shepard 3,116, nach Sartorius 3,039.

Vor dem Lötrohr schmilzt der Shepardit nur an den Kanten zu einem weißen Email<sup>141</sup>; in Vorax löst er sich in Pulversorm leicht zu einem klaren Glase auf; in Phosphorsalz in Stücken langsam,

<sup>141</sup> Nach Shepard schmilzt er ohne Schwierigkeit.

in Pulverform leicht zu einem Glase, das, solange es heiß ist, wasserhell ist und ein Rieselskelett einschließt, beim Erkalten aber opalisiert.

Von heißer Chlorwasserstoffsäure wird der Shepardit nur sehr schwer angegrissen. Dies ist auch mit den runden Körnern der Fall, die Shepard für Anorthit hält; sein gerieben und mit Chlorwasserstoffsäure längere Zeit gekocht, gibt die verdünnte und filtrierte Auflösung derselben mit Ammoniak erst nach einiger Zeit einige bräunliche Flocken und das zurückbleibende Pulver knirscht nach wie vor mit dem Glasstab. Wenn ich Körner derselben Art wie Shepard untersucht habe, so können diese kein Anorthit sein; denn dieser gibt gepulvert und mit Chlorwasserstoffsäure gekocht sehr leicht eine Gallerte. 142

Die chemische Zusammensetzung des Shepardit wird von Shepard (a), Sartorius (b) und Rammelsberg (c) folgendermaßen angegeben:

<sup>142</sup> Veral. darüber die Anmerkung beim Anorthit def Eukrit.

	a	b	c
Magnefia	28,25	27,12	34,80
Ralf	","	1,82	0,66
Natron	1,39	" <b>,</b> "	1,14
Rali	","	" <b>,</b> "	0,70
Manganorydul	","	" <b>,</b> "	0,2
Zonerde	","	1,48	2,72
Eisenoryd	","	1,70	1,25
Rieselsäure	70,41	67,14	<i>57,5</i> 2
Wasser	","	0,67	0,80
	100,95	99,93	99,79

Nach Shepard wäre also der Shepardit, abgesehen von der geringen Menge Natron, nur eine Verbindung von Rieselsäure mit Magnesia. Shepard allein hat keine Tonerde gefunden, was wahrscheinlich daher rührt, dass er die reinsten Kristalle zur Analyse genommen hat, wie er auch die größte Masse zu seiner Venutzung hatte und bei den analysierten Proben der beiden andern Chemiser, die nur kleinere Bruchstücke anwenden konnten, noch ein anderes Silicat beigemengt gewesen ist. Der Shepardit hat hiernach also dieselben Vestandteile wie der Olivin, nur in anderen Verhältnissen; bei dem Shepardit ist der Sauerstoff der Magnesia (mit Einschluss des Natrons) zu dem der Rieselsäure wie 1:3, während er beim Olivin nur wie 1:1 ist. Der Shepardit ist also anderthalb kieselsaure Magnesia:

$$\mathfrak{M}\mathfrak{g}^2\mathfrak{S}\mathfrak{i}^3$$

und die berechnete Zusammensetzung:

Magnesia 30,2 Rieselsäure 69,8

während der Olivin nur eine halb kieselsaure Magnesia ist:

 $\mathfrak{M}\mathfrak{q}^2\mathfrak{S}\mathfrak{i}$ 

Sartorius von der Ansicht ausgehend, dass er ein Gemenge analysiert habe, nimmt an, dass die gefundene Tonerde von eis nem sogenannten Kalf-Labrador, d. i. von einem solchen Labrador berrühre, der nur Kalkerde als einatomige Basis enthielte. Er berechnet nach der Tonerde einen solchen Labrador, dessen Menge etwa 5 p.C. beträgt, zieht diesen von dem Ganzen ab und findet nun für den Rücktand, den seiner Meinung nach reinen Shepardit, dieselbe Formel wie Shepard. Dessen ungeachtet scheint mir eine solche Annahme nicht gerechtfertigt; denn einmal kennt man einen Labrador von solcher Zusammensetzung überhaupt nicht, und dann kann man Kristalle von der Form des Labradors nicht allein nicht in dem Chladnit erkennen, derselbe ist auch noch nie in den Meteoriten beobachtet worden. Eher könnte man als Beimengung Anorthit annehmen, da dieser doch in gewissen Meteorsteinen bestimmt beobachtet ist; aber auch diese Annahme ist nach dem oben Ungeführten nicht wahrscheinlich.

Rammelsberg, um zu sehen, ob seiner zu analysierenden Probe etwas Auflösbares beigemengt sei, digerierte das seine Pulver zuerst mit konzentrierter warmer Chlorwasserstoffsäure und schloss nachher den Rückstand mit kohlensaurem Natron auf. Da er aber durch die Säure nur 7,55 p.C. außiehen konnte, die hauptsächlich auf Rieselsäure und Magnesia ohne Tonerde bestanden, so war ef wahrscheinlich, dass diese nur von einer anfangenden Zersetzung des Shepardit herrührten, und er rechnete daher das durch Chlorwasserstoffsäure Ausgezogene den Bestandteilen des Rückstandes zu. Er überzeugte sich aber auf eine andere Weise, dass er ein Gemenge untersucht habe, indem er eine besondere Menge von dem Pulver der ausgesuchten weißen Kristalle schlämmte, das Leichteste und Schwerste für sich analysierte und in beiden eine nicht unbeträchtliche Verschiedenheit in der Zusammensetzung fand. Bei der Schwierigkeit, die Beimengung zu bestimmen, unterlässt es daher Rammelsberg ganz, für die Zusammensetzung des Ganzen eine Formel aufzustellen. Wenn ef demnach nun auch nicht zu bezweifeln ist, daff in dem Chladnit ein eigentümliches Mineral wie der Shepardit vorkommt, so ist es doch auch ebenso wahrscheinlich, dass neben ihm sich noch ein anderes Tonerdeshaltiges Mineral beigemengt findet, das man noch nicht kennt, wie auch von dem Shepardit selbst noch vieles, wie z. B. seine Form, fast ganz unbekannt ist.

Die übrigen nur in geringer Menge vorkommenden Gemengteil sind:

1. Nideleisen, das teils in der Grundmasse, teils in und zwischen den weißen Kristallen eingemengt ist, gewöhnlich nur sparsam und in kleinen Körnern, nach Shepard doch zuweilen von der Größe einer Erbse. Ich selbst beobachtete in den Stücken der Berliner Sammlung mehrere nicht viel kleinere Körner. Das Eisen ist aber stets mit Eisenorydul bedeckt, und dies hat auch die umgebende Masse braun gefärbt, und zwar noch stärker als bei den meisten

übrigen Meteoriten. Bei Jen erwähnten größeren Körnern kann man aber durch Schaben mit dem Messer den Metallglanz und die lichte skahlgraue Farbe des Innern erkennen.

- 2. Magnetkies in kleinen Körnern selten.
- 3. Ein schwarzes Mineral, das nach Shepard Schwefelchrom ist. 143 Es sindet sich in kleinen Rörnern oder kleinen Gängen, die den Chladnit durchseken, nach Shepard auch in kleinen prismatischen Rristallen, die auf den Seitenflächen gestreift und nach diesen Spuren von Spaltungsflächen zeigen. Sie sind unvollkommen mestallisch glänzend, undurchsichtig, von der Härte des Flussspats. Vor dem Lötrohr schmilzt dies Mineral schwer zu einem schwarzen Glase, das magnetisch ist; im Rolben erhikt, bildet sich ein Sublimat von Schwesel. Mit Vorax und Phosphorsalz bildet es grüne Gläser; die Farbe ist im Allgemeinen intensiv, aber skärker im Voraxglase als im Phosphorsalze und besonders bei der Schmelzung in der Inneren Klamme und nach Zusak von Zinn.
- 4. Rleine gelbe Kristalle zwischen den Körnern des Chladnit, vor dem Lötrohr unschmelzbar; sie werden weiß und verhalten sich wie Shepardit und sind vielleicht nur durch Eisenornschnstrat gefärbter Shepardit.

Weiter habe ich nichts beobachtet. Shepard gibt ein blaues Misneral an, was er Jodolith nennt und vielleicht das ist, was ich Grundmasse genannt habe, ein honiggelbes, Apatit ähnliches Misneral, Apatoid genannt, und Spuren von Schwefel. Außerdem gibt er auch noch das ungefähre Verhältnis an, in welchem die von

<sup>143</sup> Shepard nannte ef nach Hrn. von Schreibers Schreibersit, welchen Namen dann Haibinger in den von Shepardit umgeändert hat und wofür nun nach dem Obigen nach vollständigerer Kenntnis dieses Gemengteil ein neuer Name zu machen wäre.

ihm angeführten Gemengteil in diesem Meteoriten enthalten sind; ich führe es indessen nicht an, da diese ganze Angabe zu hypothetisch ist.

Die äußere glasige Ninde ist sehr merkwürdig; ganz unähnlich der der übrigen Meteorsteine ist sie, wie sie auch Shepard beschreibt, gesleckt, schwarz, weiß, bläulichgrau, die schwarzen Stellen glänzend und Obsidiansähnlich, die weißen und grauen meistenteils matt, die weißen doch auch glänzend und durchscheinend wie Porsellan und Email. Sie ist von einer Menge Nisse und Sprünge durchzogen.

#### 2.5 Shalkit.

Diese Art enthält auch nur einen Meteoriten, den M. von Shalka in Bankoora, Ostindien, nach welchem Fundort ich den Namen der Art gebildet habe. Haidinger hat die Nachrichten darüber zusammengestellt und den Stein beschrieben. 144 Er siel den 30. November 1850 als ein einziger Stein und schlug in den nicht harten Boden gegen 4 Fuß ein, wobei er in viele Trümmer zerschellte, und Bruchstücke bis 20 Fuß weit umherslogen. Der Stein mochte einen Umfang von 3 1/2 Fuß gehabt haben; die schwarze Ninde war stellenweise abgetrennt. Haidinger erhielt durch die k. Ussatische Gesellschaft in Bengalen mehrere Stücke zusammen über 199 Centigr. schwer; ein größeres Stück von 6 Pfund 3529 Grains wurde an das Britische Museum in London gesandt, von welchem Dr. Auerbach aus Moskau einige Stücke erhielt, von denen er

<sup>144</sup> Sizungsber. d. math. naturw. Kl. d. f. Afad. d. Bis. 1860. Bd. 41. S. 251.

mir ein kleines haselnussgroßsen Stück überließ. Späterhin erhielt ich selbst durch Hrn. Maskelpne aus dem Britischen Museum ein viel größeres Stück von 4,79 Lth. Gewicht.

Nach diesen Stücken ist die Masse ein kleinkörniges Gemenge von kleinen schneeweißen, in einer Richtung deutlich spaltbaren Rörnern mit andern meistens etwas größeren grünlichgrauen, worin wieder noch größere, oft ganz scharf begrenzt liegen, die eine schwärzlichgrüne Farbe haben. Beide Farben geben aber stellenweise bei denselben Körnern in eine lichtere grünlichgelbe über, in welchem Fall dann die Körner eine große ähnlichseit mit Olivin erhalten, wie auch schon der erste Beschreiber dieses Meteorsteins, Piddington in Calcutta, bemerkt hat. 145 Die grünen Körner haben zuweilen einen Durchmesser von einem Zoll, sind dann aber sehr klüstig; sie haben einen kleinmuschligen Bruch, Glasglanz, der in den Fettglanz übergeht, sind an den Kanten mehr oder weniger durchscheinend, bei lichterer Farbe mehr, und unvollkommen nach einer Richtung spaltbar. Die Masse zum Zeil sehr bröcklig, das kleine Stück, was auch im Allgemeinen seinkörniger ist, mehr als das große.

Nach Haidinger besteht dieser Meteorstein ebenfalls auf seinstörnigen weißlichen mit gröber körnigen dunkelaschgrauen Teilen, die bis 2 Linien in jeder Nichtung groß sind und selbst wieder in kugligen Massen von mehrzölligem Durchmesser in den weißen seinkörnigen eingeschlossen sind, oder von denselben wie Gangweise durchsett werden. Bei den größeren Körnern sah er eine ziemlich deutliche Spaltungssläche, die einen unvollkommene Winkel von 100° und 80° macht, ihre Härte ist 6,5; indessen ist Haidinger der

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>A. a. D. S. 257.

Meinung, dass diese ganze Masse nur eine einzige Spezies bilde, da ihre Teile zwar eine verschiedene Farbe hätten, aber vollkommen ineinander übergingen.

In dieser Masse kommen nun noch Körner von Chromeisenerz eingemengt vor, die zwar gewöhnlich nur sehr klein und sein, doch in dem größeren Stücke fast die Größe einer kleinen Erbse erreichen. Sie sind schwarz, stark glänzend von unvollkommenem Metallglanz, haben einen braunen Strich, und sind gewöhnlich unregelmäßig begrenzt, doch auch in Oktaedern kristallisiert. R. v. Hauer beobachtete schon ein solches in dem größeren Stücke sind deren mehrere enthalten; ihre Flächen sind so glänzend, dass man mit ziemlicher Genauigkeit ihre Winkel messen kann. Körner und Kristalle kommen öfter in den grünen Körnern eingewachsen vor, sie sind schwer aus denselben vollskändig herausulösen, da auch sie klüstig und bröcklig sind.

Haidinger fand das spezisische Gewicht eines ziemlich reinen Stückes (d.h. wo wohl weniger Chromeisenerz eingemengt war) 3,412, Piddington gibt 3,66 an.

Der Stein hat eine dünne schwärzlichbraune ganz matte Rinde, die aber doch uneben und sein adrig ist, und auf dem Körner von Chromeisenerz herausragen.

Die von dem eingemengten Chromeisenerz möglichst befreite Masse ist von R. v. Hauer chemisch untersucht worden, sie besteht hiernach aus

<sup>146</sup>A. a. D. S. 257.

		Sauerstoff
Magnesia	19,00	7,60
Ralf	1,53	0,43
Eisenorydul	20,65	4,58
Tonerde	Spur	
Rieselsäure	57,66	30,50
	98,84	

Haidinger, der die Masse für gleichartig hält, betrachtet sie hiernach für eine besondere Spezies, die mit dem Olivin und Shepardit in qualitativer Hinsicht übereinstimmend, in quantitativer Hinsicht zwischen beiden steht. Denn während des Sauerstoffs der Basis zur Säure sei

beim Slivin 
$$= 1:1$$
, und beim Shepardit  $= 1:3$ , wäre er bei dieser Spezies  $= 1:2,42$ .

Dieses Verhältnis nähere sich dem, welches Stromener bei dem olivinähnlichen Mineral auf der angeblich von Grimma (Steinbach) stammenden Eisenmasse gefunden habe, wo jenes Verhältnis = 1:2,6 ist, und für welches Mineral Rammelsberg die Formel  $\mathbb{RSi} + 2\mathbb{R}^2\mathbb{Si}^3$  aufgestellt habe. <sup>147</sup> Er schlägt demnach für dies Mineral den Ramen Piddingtonit vor.

Dieser Meinung von der Gleichartigkeit der Masse möchte ich nicht beistimmen. Die Farbe der dunklen Körner geht wohl in

 $<sup>^{147}</sup>$  Diess gibt das Verhältnis = 1 : 2,8; besser passt zu dem obigen die Formel  $\Re \text{Si} + \Re^2 \text{Si}^3$ .

die grünlichgelbe über, aber nicht in die weiße. Die Körner mit grünlichgelber bis schwärzlichgrüner Farbe haben alle Eigenschafeten des Olivins; ist dies aber der Fall, dann können die weißen Körner nichts anderes als Shepardit sein, und der Shalkit wäre hiernach ein Gemenge von Olivin, Shepardit und Chromeisenerz, und von dem Chassignit nur durch die Anwesenheit des Shepardit verschieden.

Mit dieser Annahme stimmt auch das chemische Verhalten überein, denn sehr fein zerrieben, wird er von heißer Chlorwassersstoffsäure zum Teil zersetzt, wie ein Gemenge von Olivin und Shepardit; das seine Pulver ist nur an den äußersten Kanten schmelzbar, noch schwerer als der Chassignit, und wird wie dieser schwarz.

Legt man die Hauersche Analyse zum Grunde, so würde der Shalkit auf 1 Atom Olivin 2 Atome Shepardit enthalten, also aus

$$\mathfrak{R}^2\mathfrak{S}\mathfrak{i}\,+\,2\mathfrak{M}\mathfrak{g}^2\mathfrak{S}\mathfrak{i}^3$$

bestehen, denn in diesem würde der Sauerstoff von  $\Re$  : Si sein = 6:14, d. i. = 1:2,33.

Der Shalkit ist hiernach ein Gemenge von basisch und saurer kieselsaurer Magnesia oder von 2 Silicaten, die gleiche Basen in verschiedenen Sättigungsstusen enthalten, ein Gemenge wie es der Art unter den Gebirgsarten der Erde nicht vorkommt, wenngleich der Granit, wenn er Feldspat und Kaliglimmer enthält, etwas ähnliches darstellt. Das Gemenge des Shalkit ist aber noch dadurch

ausgezeichnet, dass die beiden Silicate in demselben in einem sehr einfachen Verhältnis gegeneinander zu stehen scheinen, so dass sie sehr gut eine chemische Verbindung bilden könnten, ähnlich dem Serpentin, der eine wasserhaltige Verbindung von basischer und neutraler Magnesia ist:

$$\mathfrak{M}\mathfrak{g}^2\mathfrak{S}\mathfrak{i}+\mathfrak{M}\mathfrak{g}\mathfrak{S}\mathfrak{i}+2\mathfrak{H}$$

und es wäre daher wohl möglich, dass wie der Shalkit alle Gebirsgesarten die Gemengteil in ebenso einfachen Verhältnissen enthalten, wie die Mineralien die Veskandteile. 148

#### 2.6 Die Rohligen Meteorit.

- 1. von Alais, Dep. du Gard, Frankreich, gef. 1806 den 15. März.
- 2. von Cold Bokkeveld am Cap der guten Hoffnung, gef. 1838 den 13. Oktober.
- 3. von Kaba, SW. von Debreczin in Ungarn, gef. 1857 den 15. April.
- 4. von Orgueil, Montauban, Frankreich, gef. 1864 den 14. Mai.

Ich habe mit diesen keine besondere Untersuchungen angestellt, und verweise daher auf die vorhandenen Beschreibungen der drei ersten in Buchners Meteoriten, S. 19, 60 und 94 und des letzten in den Comptes rendus 1864, t. 58.

<sup>148</sup> Vergl. weiter unten die Anmerkung, S. 134.

#### 2.7 Eufrit.

Es gehören zu dieser Abteilung nur wenige Meteoriten; von den Meteoriten des Berliner mineralogischen Museums nur der von:

- 1. Juvenas, Dep. Ardeche, Frankreich, gef. 1821 den 15. Juni.
- 2. Stannern bei Iglau, Mähren, gef. 1808 ben 22. Mai.
- 3. Jonzac, Dep. Charente infér., Frankreich, gef. 1819 den 13. Juni.
- 4. Petersburg, Lincoln Ctv, Tennessee, V. St. N. A., gef. 1855 den 5. Aug.; außerdem wahrscheinlich noch der vor Ronstantinopel (gef. 1805 im Juni), der nach Partsch und Reichenbach eine sehr große ähnlichkeit mit namentlich den 3 erstgenannten dieser Abteilung hat. Bei der geringen Anzahl dieser Meteoriten ziehe ich es ebenfalls vor, dieselben einzeln zu beschreiben und fange mit dem E. von Juvenas an, der unter allen der ausgezeichnetste und am deutlichsten kristallinisch ist.
- 1) Der E. von Juvenas ist meistenteils deutlich körnig und die Gemengteil über liniengroß; was ihn indessen für die Untersuchung besonders wichtigmacht, stellenweise auch voller Höhlungen, an deren Bänden sich die Gemengteil regelmäßig begrenzt haben. Diess ist namentlich mit dem Augit der Fall, der überhaupt der vorwaltende Gemengteil ist. Derselbe erscheint hier in der Form, in welcher er sich gewöhnlich in vulkanischen Gesteinen sindet, als Kombination des rhombischen Prismas von ungefähr 88° mit der Quers und

Längstläche und dem schiefen Prisma von ungefähr 120°. 149 Er hat glatte und glänzende Flächen, so dass er ziemlich gut mit dem Nes flerionsgoniometer gemessen werden kann. Die Neigung, die sich am besten bestimmen ließ, war die Neigung der Längsfläche zur Fläche des vertikalen Prismas, die ich von 136° 3'-5' fand. Eine Spaltbarkeit war weder bei den aufgewachsenen noch bei den unres gelmäßig begrenzten eingewachsenen Kristallen bei ihrer Kleinheit zu bemerken; sie sind im Bruch uneben, von Farbe schwärzlichbraun, ungefähr wie der Rosean vom Laacher See, glänzend von Fettglanz und nur auf den äußersten Kanten durchscheinend. Vor dem Lötrohr schmilzt dieses Augit in der Platinzange zu einem schwarzen Glase, das von Magneten angezogen wird, was vor der Schmelzung nicht der Fall ist. In Borax wird er zu einem von Eisen schwach gefärbten Glase aufgelöst, in Phosphorsalz ebenso, nur schwerer und unter Ausscheidung von Rieselsäure. Mit wenig Soda schmilzt er zu einer schwarzen Rugel, mit mehr Soda geht die Masse in die Rohle und das Eisenorndul wird reduziert.

Der Anorthit ist in den Höhlungen gewöhnlich kleiner und viel undeutlicher Kristallisiert als das Augit, indessen sieht man doch das gewöhnliche rhomboedrische Prisma mit der Längssläche M, durch deren Vorherrschen die Kristalle gewöhnlich ein taselartiges Ansehen erhalten, sowie die schiefe Endsläche P, parallel welcher die Kristalle immer sehr deutlich spaltbar erscheinen. Die Endsläche ist meistenteils glatt, nur zuweilen zeigt sie den der Kante mit der Längssläche parallel gehenden einspringenden Winkel, der den Zwillingskristall verkündet. Winkel sind nicht zu messen, aber das ganze Ansehen der

<sup>149</sup> Bergl. die aufführliche Beschreibung in meiner ersten Arbeit über diesen Meteoriten in Poggendorfff Ann. von 1825 B. 4, S. 173.

Rristalle zeigt den ein- und eingliedrigen Feldspat. Er ist schneeweiß und auf den Spaltungsflächen stark perlmutterartig glänzend. Vor dem Lötrohr nur sehr schwer an den Ranten schwelzbar. Gepulvert und mit heißer Chlorwasserstoffsäure behandelt, gelatiniert er und gibt sich dadurch bestimmt als Anorthit zu erkennen. 150

Außer diesen wesentlichen Gemengteilen finden sich noch drei unwesentliche, kleine strohgelbe takelartige Kristalle, etwas Magnetkies und in noch geringerer Menge etwas Nickeleisen. Die ersteren sind wenig glänzend und undurchsichtig, sie finden sich nicht gleichmäßig verbreitet in der Masse, im Allgemeinen sehr sparsam, am häufigs ten in der Gegend der Drusenräume und in diesen selbst. Von einer bestimmten Kristallform ist indessen nichts zu erkennen. Sie haben wohl das Ansehen von Titanit und Rammelsberg hält sie auch dafür, weil er bei der Analyse etwas Titansäure gefunden hat, aber ihr Verhalten vor dem Lötrohr ist damit nicht völlig in übereinstimmung. Sie schmelzen vor dem Lötrohr in der Platinzange an den Kanten zu einem schwarzen Glase, das magnetisch ist, und lösen sich in Phosphorsalz, in geringer Menge zugesett, langsam aber völlig zu einem Glase auf, das heiß etwas grünlich gefärbt und kalt ganz wasserhell ist; in größerer Menge zugesett, bleibt Rieselsäure ungelöst zurück, und die Rugel opalisiert beim Erkalten, wird aber nicht bläulichweiß in der innere Flamme, auch nicht wenn Zinn zugesetzt wird, was diese Kristalle vom Titanit unter-

<sup>150</sup> Daff der Anorthit, mit heißer Chlorwasserkossfäure digeriert, gelatiniert, ist bisher noch nicht angegeben, ist aber ein leichtes Mittel, ihn vom Labrador zu unterscheiden. In meiner ersten Beschreibung dieser Kristalle (a. a. D. S. 176) hatte ich sie gestützt auf die Angabe von Laugier, dass der Meteorit von Juvenas von Säuren nur schwierig angegriffen würde, und auf eine von mir ausgessührte Untersuchung des alkalischen Bestandteils für Labrador gehalten. Shepard hatte die Kristalle zuerst für Anorthit ausgegeben (Report on American meteorites p. 7. New Haven 1848), ohne weitere Beweise für seine Behauptung zu liesern; Rammelsberg hat dies zuerst durch seine Analyse beweisen (Pongendorss Ann. von 1848 B. 73, S. 585).

scheibet, der auch (z. B. der gelbe von Arendal) an des Rändern nicht zu einem magnetischen Glase schmilzt. Dieser letztere Umstand wäre nicht entscheidend, er könnte von einem größeren Eisengehalt herrühren, aber die blaue Farbe müsste doch zum Vorschein komsmen. Es bleibt also über diese Substanz noch einige Unsicherheit, man sieht aus ihrem Verhalten nur so viel, dass sie ein Silicat ist und Eisenorydul enthält.

Der Magnetkief findet sich in dem E. von Juvenas hier und da in kleinen Körnern eingemengt, und in den Höhlungen zuweilen fristallisiert. Ich habe in diesen zwei freilich nur sehr kleinen Kristallen gefunden, von denen der eine aber doch eine große Menge von Flächen zeigt. Er ist eine Rombination eines Heragondodekaeders mit der Basis, die wenig vorherrscht, einem stumpfen Heragondodekaeder, dessen Flächen die Kombinationskanten die Grundform mit der Basis schwach abstumpfen, den Flächen des ersten sechsseitis gen, und untergeordnet auch des zweiten sechsseitigen Prismas, und des ersten stumpferen Beragondodekaeders als Abstumpfungen der Endkanten der Grundform. Die Flächen sind so glatt, dass ich die Winkel messen konnte. Ich fand den Winkel der Grundform in den Endfanten 126° 49'; der Winkel in den Seitenkanten beträgt also 127° 6'. 151 So ausgebildete Kristalle sind bei dem tellurischen Magnetkies noch nicht vorgekommen, wiewohl die Kristalle bei dies sem oft viel größer sind. Sie sind gewöhnlich nur Kombinationen eines regulären sechsseitigen Prismas mit der Basis, und wenn auch Flächen von Heragondodekaedern vorkommen, so sind sie bisher nie so glatt und glänzend gefunden worden, dass man ihre Winkel mit

<sup>151</sup> Vergl. die aufführlichere Beschreibung a. a. D. S. 180.

Genauigkeit hätte bestimmen können; die Winkel des Magnetkieses sind daher durch den meteorischen Magnetkies zuerst bestimmt. Sonst ist er wie der tellurische tombakbraun von Farbe und mestallisch glänzend; sein Magnetismus jedoch nur sehr gering. Sas Berhalten vor dem Lötrohr oder gegen Säuren ist ganz wie das des tellurischen, obgleich bei der geringen Menge, die nur genomsmen werden konnte, und weil sie nicht frei von ansitzendem Gestein war, nicht gesehen werden konnte, ob bei der Auslösung in Säuren etwas Schwesel zurücklieb. In der Auslösung wurde kein Nickel gesunden.

Nickeleisen findet sich in dem E. von Juvenas nur in sehr geringer Menge und nur in so seinen Teilen, dass man es auf der Bruchsläche des Gesteins nicht sehen und nur auf einer angeschlissenen Fläche durch seinen Metallglanz erkennen kann. Noch bestimmter kann man sich von seiner Gegenwart überzeugen, wenn man ein Stücken von dem E. von Juvenas pulvert, das Nickeleisen mit den Magneten außieht und dann im Mörser breitdrückt. 153

Diese letztgenannten Gemengteil sind jedoch nur wie angegeben in sehr geringer Menge vorhanden. Das Nickeleisen ist ganz sein eingesprengt, der Magnetkies wohl in etwas größeren Körnern oder unregelmäßigen Partien, aber doch auch nur sehr sparsam hier und da enthalten, die gelben Zaseln sind an den Stellen, wo sie sich sinden, wohl ziemlich häusig, aber sie selbst sind doch nur klein und sinden sich an anderen Stellen gar nicht, so dass alle diese letzteren Gemengteil auf das Ansehen des Meteoriten keinen Einfluss

<sup>152</sup>In meiner früheren Abhandlung gab ich an, daff er gar nicht magnetisch wäre; wenn man aber ein kleines Stückhen auf eine Stahlplatte legt, so wird er doch von den Magneten etwas angezogen.

<sup>153</sup>In der früheren Beschreibung hatte ich das Rickeleisen bei seiner geringen Menge ganz übersehen.

ausüben. Dieses wird nur bedingt durch das Augit und Anorthit; dessen ungeachtet ist doch das Ansehen an verschiedenen Stellen sehr verschieden. Auch da wo die Gemengteil am gröbsten sind, kann man das Gemenge nicht grobkörnig nennen, es ist nur kleinkörnig, aber solche Stellen wechseln mit andern seinkörnigen, und gehen teils allmählig darin über, teils schneiden sie von diesen scharf ab, wie dies auch bei dem Chondrit und Howardit der Fall ist. Zuweilen liegt in einer größeren seinkörnigen Partie eine kleinere gröber körnige, in die sie schnell übergeht, zuweilen sieht man in einer solchen eine kleine noch seiner körnige mit ziemlich scharf begrenzten Umrissen liegen; diese erscheinen dann gewöhnlich von etwas dunklerer Farbe, ohne deswegen mehr Augit zu erhalten, zuweilen sind aber diese dunkleren Partien grobkörnig, und die dunklere Farbe rührt nun in der Tat von einer größeren Menge Augit her.

Das spezifische Gewicht des E. von Juvenas ist nach Rummler 3,11, nach Flangergues 3,09.\(^{154}

Die schwarze Rinde ist wie die der Howardit stark glänzend und adrig, also ganz verschieden von der der Chondrit.

In einer dünn geschlissenen Platte unter dem Mikroskop ersscheint der Anorthit durchsichtig und ziemlich wasserhell, und mit nur wenigen Rissen durchsett, der Augit hellbraun durchscheinend, aber mit vielen gröberen braunen Sprüngen und seineren Streissen durchzogen. Ein größerer Kristall zeigte gerade, untereinander parallele, sich in kleinen Entsernungen wiederholende dunkelbraune Sprünge, die von andern ähnlichen aber unregelmäßig verlaussenden durchsett wurden, und außer diesen noch seinere gerade,

<sup>154</sup> Partsch, Meteoriten, S. 147.

eng nebeneinander liegende, braune Streifen, die die geraden Sprünge unter einem Winkel von etwa 80° schnitten. Auf eine ähnliche Weise verhalten sich die Sprünge und Streisen bei allen übrigen Kristallen. Nickeleisen in sehr kleinen Körnern macht sich hin und wieder durch seinen Metallglanz kenntlich, Magnetkies war bei seiner unregelmäßigen Verteilung in dem Gestein auf der Platte gerade nicht vorhanden. Der Anorthit erscheint im Allgemeinen in kleineren Kristallen als das Augit, aber sie sind fast überall regelmäßig begrenzt, und namentlich sind die Querdurchschnitte durch seine taselartigen Kristalle häusig zu sehen, dagegen das Augit bei größeren Individuen nie regelmäßige Umrisse hat. Man sieht so bestimmt, dass Anorthit der zuerst, Augit der später kristallissierte ist, wie auch der erstere schwerer, der letztere weniger schwer vor dem Lötrohr schmelzbar ist.

Vor dem Lötrohr schmilzt das Gestein sein zerrieben sehr leicht zu einem schwarzen stark magnetischen Glase, daher sich auch der Glanz der Rinde erklärt. Das Gestein schmilzt leichter als die Gemengteil einzeln, wie dies auch oft bei gemengten tellurischen Gebirgsarten der Fall ist.

Fein gepulvert und mit heißer Chlorwasserstoffsäure digeriert, gelatiniert der Anorthit, und die Gelatine schließt das Augit uns verändert ein, der daher auf diese Weise leicht und bestimmt von dem Anorthit zu trennen ist.

Auf diese Weise ist nun auch der E. von Juvenas von Ramsmelsberg analysiert worden. Er erhielt so:

<sup>155</sup> Poggendorff Annalen von 1848, Vd. 73, S. 585 und Rammelsbergf Mineralchemie, S. 937.

A. mit Säuren Zersetbares 36,77 B. mit Säuren Unzersetbares 63,23

und in diesen wie in dem Ganzen (C) die folgenden Bestandteile:

	A.	Sau	:183.	Sauc	erC.
Ralf	6,64	1,90	3,59	1,03	10,23
Magnesia	0,13	0,05	6,31	2,52	6,44
Natron	0,37	0,09	0,26	0,06	0,63
Rali	0,12	0,02	" <b>,</b> "	//	0,12
Eisenorydul	","	<b>",</b> "	19,48	4,32	19,48
Tonerde	12,40	5,79	0,15	0,07	12,55
Eisenoryd	1,21	0,36	","	","	1,21
Rieselsäure	15,41	8,00	32,92	17,09	48,33
Phosphorsäur	e0,28	<b>",</b> "	","	//	0,28
Titansäure	","	<b>",</b> "	0,10	<b>",</b> "	0,10
Eisen	0,16	<b>",</b> "	" <b>,</b> "	//	0,16
Schwefel	0,09	<b>",</b> "	","	<b>",</b> "	0,09
Eisenorydul		<b>",</b> "	0,92	<b>",</b> "	0,92
Chromoryd	","	<b>",</b> "	0,43	","	0,43
	<i>36</i> ,81		64,16		100,97

Die Analyse ergab demnach die bekannten Bestandteile des Ansorthits und Augits und außer diesen noch kleine Mengen anderer Bestandteile, in dem zersetbaren Teile etwas Phosphorsäure und Eisenoryd, und in dem unzersetbaren etwas Titansäure und Chromoryd. Nickeleisen ist dagegen nicht aufgeführt, bei seiner geringen

Menge hat es Nammelsberg wie die früheren Beobachter übersehen. Sieht man aber von diesen in geringer Menge enthaltenen Besonderen Bestandteilen ab, so verhalten sich bei dem zersesbaren Gemengteil der Sauerstoff des Kalks, der Magnesia und der Alkalien zur Tonerde und zur Kieselsäure, also von

$$\mathfrak{R}:\mathfrak{R}:\mathfrak{S}i=2,06:6,15:8,00=1,03:3,07:4$$

also fast wie 1:3:4, der Zusammensetzung des Anorthits gemäß.

In dem unzersetharen Gemengteil der Sauerstoff der sämtlichen Basen zu dem der Rieselsäure, also

$$\Re: \mathfrak{Si} = 8,00:17,09=1:2,13$$

also fast wie 1: 2, der Zusammensetzung des Augits gemäß.

Die Analyse ist demnach in vollkommener übereinstimmung mit dem Ergebnis der mineralogischen Untersuchung.

Rammelsberg sucht aber noch die übrigen Bestandteile, die die Analyse ergeben hat, zu erklären, und eine vollskändige quantitative Bestimmung der Gemengteil des E. von Juvenas zu geben. Von dem Schwesel, dessen Menge durch eine besondere Untersuchung bestimmt ist, wurde angenommen, dass er vom Magnetkiese, und vom Chromoryd, dass es von Chromeisenerz herrühre, und es ist daher schon gleich so viel Eisen als zum ersteren, und Eisenorydul als zum letzteren gehört, in der angegebenen Analyse aufgesührt (der Magnetkies ist wie früher als FeS, das Chromeisenerz als FeCr berechnet). Das Eisenoryd wurde als von Magneteisenerz, die

Titansäure als von Titanit, und die Phosphorsäure als von Apatit herrührend angenommen. Indem er nun bei seiner Berechnung von der Gesamtmischung ausgeht, bestimmt er zuerst nach der Tonerde und den Alkalien den Anorthit, nach dem Schwefel den Magnetkies, nach dem Eisenornd des Magneteisenerzes, nach der Phosphorsäure den Apatit, nach der Titansäure den Titanit, und bekommt nun einen Rest, in welchem der Sauerstoff von R: Si wie 1: 2,16 ist, also beinahe wie im Augit.

Die Annahme von Chromeisenerz ist wie die von Magnetkies gerechtfertigt, denn, wenn man auch das erstere noch nicht wie den letteren beobachtet hat, so ist doch das Chromeisenerz ein so gewöhnlicher Gemengteil der Meteorit, dass ef nach dem gefundenen Chromoryd in dem E. von Juvenas sehr wahrscheinlich ist. Dies ist aber nicht mit den übrigen Annahmen der Fall. Magneteisenerz ist weder in diesem noch überhaupt in einem Meteoriten mit Sicherheit beobachtet, daher auch wahrscheinlich das Eisenornd noch vom Magnetkiese herrührt, und die Bestimmung des Schwefels, der bei der Zersezung des E. von Juvenas als Schwefelwasserstoffgas entwis chen ist, zu gering ausgefallen. Mit Titanit stimmt wie angeführt das Verhalten der gelben tafelartigen Kristalle vor dem Lötrohr nicht völlig überein, auch ist die Titansäure in dem unzersetbaren Gemengteil gefunden, und nicht in dem zersetbaren, wie doch der Fall sein müsste, wenn Titanit in dem E. von Juvenas enthals ten wäre, und Apatit, wiewohl sehr möglich, ist doch noch nie in den Meteoriten beobachtet. Ich führe daher diese Berechnung der Gemenateil, als noch nicht hinreichend begründet, hier nicht auf.

2) Der Eufrit von Stannern ist dem von Juvenas sehr ähn-

lich, doch nicht so deutlich fristallinisch, wie dieser. Er ist nach den Stücken, die mir vorliegen, nicht so grobkörnig, wie der E. von Juvenas; der Anorthit auch nicht so regelmäßig begrenzt und seine Spaltungsflächen eigentlich nie recht deutlich zu sehen.

Die dünngeschlissene Platte ist ebenfalls bei weitem nicht so beslehrend, wie bei dem E. von Juvenas. Anorthit und Augit sind nicht so scharf gesondert, der erstere ist nicht so regelmäßig begrenzt und von einer großen Menge kleiner Risse durchsett, wodurch er in unregelmäßige Stücke abgeteilt ist, und an Durchsichtigkeit versliert; das Augit ist dunkler und undurchsichtiger; sehr seine Teile von Rickeleisen sind hin und wieder auch hier zu sehen.

Ein Wechsel von groben und seinen körnigen Partien kommt ebenfalls vor. Auch hier gehen dieselben ineinander über, oder schneiden wenigstens nicht scharf aneinander ab, aber in den seinen körnigen Partien liegen wieder scharf begrenzt sehr seinkörnige graue Partien, die, mit der Lupe betrachtet, immer noch gemengt erscheinen, und wieder kleine dunkle Teile auch scharf begrenzt einschließen, die wie Augit aussehen, nicht regelmäßig begrenzt und sehr undurchsichtig sind; zu Pulver zerrieben und unter dem Mikrostop betrachtet wird das Gemenge noch deutlicher.

Drusenräume enthält der E. von Stannern nicht, auch habe ich die gelben Blättchen des E. von Juvenas in ihm nicht beobachtet, dagegen sindet sich Magnetkies wie in diesem. Sein spezisisches Gewicht gibt Rummler 3,01—3,17 an. Die äußere schwarze Rinde ist glänzend und adrig wie bei dem E. von Juvenas. Verhalten vor dem Lötrohr und mit Säuren dasselbe. Das Rickeleisen kann man ebenso wie bei dem E. von Juvenas aussinden, nur muss man,

da es in feineren Teilen und sparsamer enthalten ist, ein größeres Stück zerreiben. 156

Der E. von Stannern ist schon vor dem von Juvenas von Rammelsberg jedoch mit denselben Resultaten untersucht worden. Von in Chlorwasserstoffsäure zersetbaren Gemengteilen haben sich darin gefunden

### 34,08 Teile,

### von unzersetbaren 65,02 Teile

ein Verhältnif, das fast ganz mit dem bei dem E. von Juvenas gefundenen übereinkommt. 157 Rammelsberg findet auch etwas
Chromoryd und Eisenoryd, und nimmt danach Chromeisenerz und
Magneteisenerz an, von denen nun das bei dem E. von Juvenas Gesagte gilt. Phosphorsäure und Titansäure sind nicht darin
gefunden, aber auch vielleicht nicht aufgesucht.

3) Das kleine Stück von dem E. von Jonzac in dem mineralosgischen Museum ist ein ziemlich grobkörniges Gemenge von Augit

<sup>156</sup> Man muff natürlich Sorge tragen, daff, wenn man mittelft Meißelf und Hammerf ein Stück zum Zerreiben lostrennt, keine Eisenteile von dem Meißel an dem abgetrennten Stücke sitzen bleiben, die dann zu Irrtümern Beranlassung geben können.

<sup>157</sup> Diese übereinstimmung ist sehr bemerkenswert; sie lässt vermuten, dass auch hier wie bei dem Shalkit die Gemengteil in einfachen Atomverhältnissen miteinander verbunden sind. Bergleicht man in den Analysen des E. von Stannern und Juvenas von Rammelsberg die Sauerstossmengen der Kieselsäure in dem zersesbaren und unzersesbaren Gemengteil, also in dem darin enthaltenen Anorthit und Augit, so findet man, dass diese betragen in 100 Teilen

bef E. von Stannern: 8.59 und 16.69

des E. von Juvenas 8,00 und 17,09.

Sie verhalten sich also fast genau wie 1: 2. Da nun der Anorthit 2, das Augit nur 1 Atom Rieselsäure enthält, so würde darauf folgen, dass in dem Eukrit von Stannern und Juvenas 1 Atom Anorthit und 4 Atome Augit enthalten sind. Diese große Menge des Augits in Bergleich zum Anorthit könnte bei Ansicht der Stücke zu groß erscheinen; Joch muss man bedenken, dass das Augit ein viel höheres spezifisches Gewicht als der Anorthit hat. Es ist bei dem Augit des Eukrit nicht untersucht, kann aber bei seinen hohen Eisengehalten nicht viel unter 3,4 betragen, während der Anorthit nur ein Gewicht von 2,76 hat; daher das Augit verhältnismäßig weniger Raum einnimmt als der Anorthit. (S. 10. Eukrit im Nachtr.)

und Anorthit. Sein spezifisches Gewicht beträgt nach Rummler 3,07–3,08. Man hat von ihm nur eine ältere Analyse von Laugier, die auf die Trennung der Gemengteil keine Rücksicht nimmt, aber im Ganzen ein ähnliches Resultat wie die der E. von Juvenas und Stannern gegeben hat.

4) Der E. von Vetersburg. Ein auf den ersten Anblick sehr fremdartig aussehender Eufrit. Er fiel etwa 3 Pfd. schwer zu Vetersburg in Tennessee den 5. Aug. 1855 und ist hauptsächlich durch die Nachrichten, die Shepard<sup>158</sup> darüber mitgeteilt hat, bekannt geworden. Das mineralogische Museum besitzt zwei nicht sehr große Stücke, die zu ihm von Shepard durch Dr. Bondi gelangt sind. Der größte Teil des Steins besteht nach diesen auf einer graulichweißen, feinkörnigen, zerreiblichen Masse, die, mit der Lupe betrachtet, doch nur ein feines Gemenge vor kleinen braunen und schneeweißen Körnern ist, worin aber einzelne 1 bis 2 Linien große, grünlichgelbe Körner von Olivin, auch sehr kleine Körner von Magnetkies liegen, und kleine Rostflecke anzeigen, dass auch Nideleisen darin vorkommt, wie man denn auch auf dem Pulver mit dem Magnet eine für einen Eufrit nicht unbeträchtliche Menge von Rickeleisen außiehen kann. In dieser so beschaffenen Masse liegen einzelne einen halben Zoll im Durchmesser haltende Partien eines gröberen Gemenges der braunen und weißen Körner, die sich nun deutlich als ein Gemenge von Augit und Anorthit darstellen und mit andern, die bei den E. von Juvenas und Stannern vorkommen, die größte ähnlichkeit haben; daher denn auch die grauen Partien nur für ein feinkörniges Gemenge von Augit und Anorthit zu

<sup>158</sup>Silliman American Journ. of Sc. and artf 1857 Sec. fer. v. 24, p. 134.

halten sind. Auf der andern Seite finden sich auch in der grauen Masse 2 bis 3 Linien dicke eckige schwarze Partien, die an der umsliegenden Masse scharf abschneiden, und einen ebenen matten Bruch haben und worin auch mit der Lupe ein Gemenge nicht zu erkennen ist, die dennoch aber nur ein inniges Gemenge sein möchten, da es wie das graue vor dem Lötrohr an den Kanten zu einem schwarzen Glase schmilzt, das vom Magnete schwach angezogen wird und sich in Phosphorsalz mit Hinterlassung der Rieselsäure zu einem von Eisen schwach grün gefärbten Glase auslöst.

Das spezifische Gewicht nach Prof. Smith in Louisville 3,28. äußerlich eine schwarze glänzende Rinde wie bei den E. von Juvenas und Stannern.

Auch die chemische Untersuchung, die Smith mit dem E. von Petersburg angestellt, hat dieselben Resultate geliesert, wie die der übrigen Eukrit sie ergab:

Ralf	9,01
Magnesia	8,13
Natron	0,83
Eisenorydul	20,41
Zonerde	11,05
Rieselsäure	49,21
Eisen	0,5
Mangan	0,04
Schwefel	0,06
Nicel	Spur
Phosphor	Spur
	99,23

Shepard fand die Menge des eingemengten Nickeleisens bei einem Versuche 2,5~p C.

Der E. von Petersburg ist also ein mit den übrigen im Allsgemeinen übereinstimmender Eukrit, der sich von diesen nur durch etwas eingemengten Olivin und eine noch etwas größere Menge von Rickeleisen unterscheidet.

Shepard, der das ganze gefundene Stück zu untersuchen Ges legenhatte, beschreibt den Stein als bestehend auf einer aschgrauen Masse, die er für Anorthit hält, mit eingewachsenen, mehr oder weniger abgerundeten Kristallen von schneeweißem Chladnit, grünem Augit, gelblichgrünem Olivin und Chromeisenerz. Die graue Masse macht nach ihm etwa 3/5 des ganzen Steins auf, die Rristalle von Augit erreichen zuweilen eine Größe von 1/4 Boll und von eben dieser Größe kommen auch Kristalle von Anorthit<sup>159</sup> vor. Außer diesen Einmengungen beobachtete Shepard noch ein hartes rotes, scheinbar in Dodekaedern Kristallisiertes Mineral, von dem er sagt, dass es die größte ähnlichkeit mit dem in dem Meteorit von Nobleborough (Maine) vorkommenden und von ihm für Granat erklärten Minerale habe. Diese Beschreibung weicht wes sentlich von der meinigen ab, ich habe zwar nur zwei kleine Stücke zur Benugung gehabt, doch wäre es wünschenswert gewesen, dass die Anwesenheit von mehreren der von Shepard genannten Mines ralien wie namentlich des Chladnit näher bewiesen wäre. Die von mir beschriebenen schwarzen Partien sind nicht erwähnt. Shepard gibt nun auch hier noch nach Smiths und seinen Analysen eine ungefähre Berechnung der Gewichtsmengen der Gemengteil, die ich

<sup>159</sup> Wenn ich die Beschreibung (a. a. D. S. 136) richtig verstehe.

auch hier nicht anführe, da sie auf zu unsicher Annahmen beruht. Von Augit gibt er nur 1 p $\mathfrak L$ . an.

\* \* \* \* \* \*

# 3 Schlusbemerkungen.

Auf dem Bisherigen ergibt sich, dass die Meteoriten Gemenge verschiedener Mineralien sind, wie die tellurischen Gebirgsarten, und es scheint daher von Interesse, eine Vergleichung der kosmischen Mineralien und Gebirgsarten (Meteoritenarten) mit den tellurischen Mineralien und Gebirgsarten anzustellen.

Die in den Meteoriten vorkommenden Mineralien sind:

- 1. Meteoreisen d. i. gediegenes Eisen, welches etwas nickelhalstig ist; es ist nach drei untereinander rechtwinkligen Richtungen, parallel den Flächen des Hexaeders spaltbar, stahlgrau, metallisch glänzend und findet sich derb und eingesprengt, derb eine besondere Meteoritenart bildend, und im Pallasit, eingesprengt in mehreren Meteoritenarten, namentlich im Chondrit und Mesosiderit.
  - 2. Tänit.
  - 3. Schreibersit.
- 4. Mhabdit. Die drei Eisenverbindungen, die in dem Meteoreissen meistenteils regelmäßig eingewachsen vorkommen. Sie sind von gleicher Farbe und Glanz, wie das Nickeleisen und daher bei unverssehrtem Zustande des letzteren nicht sichtbar, sind aber in verdünnter Salpeters und Chlorwasserstoffsäure schwerer löslich, als das Mesteoreisen und treten daher aus seiner Oberfläche hervor, wenn man dasselbe in solchen Säuren einige Zeit hat liegen lassen.

Der Tänit, ein nickelreicheres Eisen als das Meteoreisen, findet sich bei dem in oktaedrischen Bruchstücken vorkommenden Meteoreisen in dünnen Blättchen zwischen den Oktaedersläche parallel gehenden Schalen, und durch sein Hervortreten auf den geäßten

Schnittflächen werden vorzugsweise die Widmanstättenschen Figuren hervorgebracht, wie bei dem Eisen von Toluca, Elbogen etc.

Der Schreibersit (Lamprit von v. Reichenbach), ein Phosephornickeleisen, sindet sich in glatten Körnern und unvollkommen ausgebildeten Kristallen in der Mitte der Schalen und diesen parsallel bei einigen der vorigen Abänderungen des Meteoreisens, z. V. dem Eisen von Cosby, Arva, Lenarto etc. —

Der Rhabdit, ebenfalls ein Phosphornickeleisen, sindet sich in kleinen, fast mikroskopischen, quadratischen Prismen, die nach drei Richtungen parallel den Ranten des Sexaeders in dem Meteoreisen regelmäßig eingewachsen sind, z. B. von Braunau, Seeläsgen, Misteca. Sie sinden sich in dem Meteoreisen gewöhnlich nur da, wo der Schreibersit fehlt, oder wenn sie mit diesem in einem und demselben Meteoreisen vorkommen, wie z. B. in dem von Arva, doch nur in den Stücken, die keinen Schreibersit enthalten. Da nun der Rhabdit wie der Schreibersit aus Phosphornickeleisen besteht, so wäre es hiernach wohl möglich, dass beide nur verschiedene Zustände einer und derselben Verbindung sind.

- 5. Grafit in kleinen derben Partien in dem Meteoreisen einsgemengt von verschiedener bis Walnussgroße (M. von Toluca), zuweilen in Pseudomorphosen in der Form von kleinen Hexaedern (M. von Arva).
- 6. Troilit (FeS), durch die Analyse als Einfach-Schwefeleisen erkannt, findet sich in mehr oder weniger großen, gewöhnlich unregelmäßig begrenzten Partien in dem Meteoreisen eingewachsen wie der Grafit, doch häufiger als dieser (M. von Toluca, Seeläsgen, Lockport). Nur einmal, in dem Meteoreisen vom Cap der guten

Hoffnung, habe ich ihn auf der Schnittfläche des Eisens in regelmäßig begrenzten Umrissen beobachtet, ohne seine Form weiter bestimmen zu können. In dem Eisen von Sarepta erscheint er mit dünnschaligen Zusammensekungstücken in einer Richtung, wie öfter der tellurische Magnetkies; ob er deshalb auch da, wo er mit unres gelmäßiger Begrenzung vorkommt, stets ein Individuum und kein Aggregat ist, kann nicht ausgemacht werden, da der Troilit nicht spaltbar ist und gewöhnlich einen unebenen Bruch hat. Er ist teils ganz ohne Einmengungen von Rickeleisen wie in dem Eisen von Seeläsgen, teils enthält er diese in seinen Partien, auch enthält er zuweilen Schwefelnickel chemisch gebunden (M. von Sevier County). Ob indessen alles Schwefeleisen, welches in dem Meteoreisen vorkommt, dem Troilit und nicht zum Teil auch dem folgenden Magnetkies angehört, ist noch außumachen, sowie auch, wohin das Schwefeleisen gehört, welchef in kleinen Partien sich in dem Pallasit und Mesosiderit findet.

7. Magnetkief findet sich in kleinen Kristallen in dem Eukrit von Juvenas und nach Shepard auch in dem Chondrit von Richmond. Er ist hier durch seine Form als Magnetkies kenntlich und es ist hiernach wahrscheinlich, dass auch das Schwefeleisen in den übrigen Eukriten und Chondriten, in denen es immer nur in kleinen Partien und eingesprengt vorkommt, Magnetkies sei; dies wird auch noch dadurch wahrscheinlich, dass viele der Chondrit beim Auslösen in Chlorwasserstoffsäure etwas Schwefel absehen. Indessen könnte auch in diesem neben dem Magnetkies, oder auch skatt dieses Troilit vorkommen. Bei dieser Unbestimmtheit ist in dem Obigen vortäussig angenommen, dass alles Schwefeleisen in dem Meteoreisen

Pallasit und Mesosiderit: Troilit und in den übrigen Meteoriten: Magnetkies sei.

- 8. Chromeisenerz; sehr verbreitet in den Meteoriten; wenngleich immer nur in sehr geringer Menge. Es sindet sich zuweilen kristalslisiert in Oktaedern, gewöhnlicher in Körnern und eingesprengt; am deutlichsten kristallisiert und in den größten Körnern, die zusweilen die Größe einer kleinen Erbse erreichen, in dem Shalkit, seltener und in weniger großen Körnern in dem Meteoreisen und in dem Pallasit, namentlich von Brahin, seiner eingesprengt in dem Chassignit, Chondrit, Howardit. In dem Meteoreisen ist es öfter in Troilit ganz eingewachsen, wie bei dem M. von Carthago und Schweß.
- 9. Quarz in kleinen fast mikroskopischen doch mit dem Restlerionsgoniometer messbaren Kristallen in dem Meteoreisen von Toluca als große Seltenheit. Bei der Analyse des Meteoreisens ist Kieselsäure öfter gefunden.
- 10. Olivin (Mg, Fe)<sup>2</sup> Si; ein häufiger und wichtiger Gesmengteil der Meteorit. Er kommt kristallissiert, in Körnern und auch derb vor. In den ausgezeichnetsten Kristallen in dem Pallasit, Mesosiderit und Shalkit, in kleineren Körnern im Chondrit und Howardit, derb und fast die ganze Masse des Steins ausmachend im Chassignit. In dem Pallasit sind die Kristalle porphyrartig einsgewachsen, oft ganz rund, wenn sie sich nicht gegenseitig begrenzt und in der Ausbildung gestört haben, meistens aber noch einzelne und selbst viele sehr glatte und glänzende Flächen zeigend, die sich teils nicht berühren, teils in Kanten schneiden. Die Kristalle sind

<sup>160</sup> Die Querfläche M fehlt stets, wie sie auch bei den eingewachsenen tellurischen Olivinen nicht vorkommt.

oft vollkommen durchsichtig, gelblichgrün und stark glänzend von Glafglanz; sie enthalten häufig röhrenartige Einschlüsse, die untereinander und der Hauptare parallel sind. In dem Mesosiderit namentlich von Hainholz erhalten die Körner zuweilen die Größe einer Walnuff, sind aber nicht durchsichtig, sondern nur an den Kanten durchscheinend, und gelblich bis rötlichbraun; im Shalkit haben sie oft eine ebenso bedeutende Größe, sind aber sehr klüftig, und durch dunkle schwärzlichgrüne Farbe ausgezeichnet, die aber an einzelnen Teilen eines und desselben Kornes lichter wird und in die gelblichgrüne Farbe übergeht. Von dieser Farbe sind sie auch meistens in den übrigen Meteoriten. Der Olivin der meisten Meteorit ist vor dem Lötrohr unschmelzbar, er verändert sich gar nicht, oder wird nur dunkler von Farbe, der Olivin im Chassignit schmilzt aber vor dem Lötrohr, wenn auch nur schwer, in Folge seines größeren Eisengehaltes zu einem schwarzen Glase wie der Hyalosiderit, mit dem er auch in seine Eisengehalte übereinstimmt.

- 11. Shepardit Mg<sup>2</sup>Si<sup>3</sup>; ein Hauptgemengteil des Chladnit, in welchem er in eingewachsenen unvollkommen ausgebildeten Kristalelen bis zu der Größe eines halben Zolles und darüber vorkommt; schneeweiß sehr bröcklig, fast unauflöslich in Chlorwasserstoffsäure. Findet sich außerdem im Shalkit, doch in viel kleineren Körnern, ist aber sonst mit Sicherheit nicht beobachtet.
- 12. Augit findet sich im Eufrit und Mesosiderit; in dem ersteren von schwärzlichbrauner Farbe, kleinkörnig, und in den Drusensräumen bei dem E. von Juvenaf in sehr deutlichen Kristallen, wie er gewöhnlich in den Doleriten und neueren vulkanischen Gesteinen vorkommt, Kristallisiert. Von Vasen enthält er vorzugsweise Eis

senorydul, nächstdem Magnesia und Kalkerde; seine Formel: (Fe, Mg, Ca) Si. In dem Mesosiderit ist er grobkörniger, nament-lich in dem von der Sierra de Chaco und schwärzlichgrün. Wenn man ihn auch in dem Chondrit aufgeführt hat, so ist dies eine bloße Annahme, die man bei der Berechnung der Analyse gemacht hat, und die sich auf eine wirkliche Beobachtung desselben nicht gründet.

13. Anorthit CSi + AlSi ist hauptsächlich im Eukrit enthalten, der fast nur ein kleinkörniges Gemenge von ihm mit Augit ist. Er ist schneeweiß, in den körnigen Zusammensetzungskücken deutlich spaltbar und oft zwillingsartig verwachsen. In den Drusen des Eukrit von Juvenas ist er auskristallisiert, doch viel undeutlicher und kleiner als der mit ihm zusammen vorkommende Augit. Mit Sicherheit ist er in anderen Meteoriten nicht nachgewiesen, doch ist er wahrscheinlich auch im Howardit und Chladnit enthalten.

Diess sind die in den Meteoriten des Berliner Museums beobsachteten und bestimmten Mineralien; zu den beobachteten aber noch nicht bestimmten Mineralien gehören:

1. Die Rugeln in dem Chondrit; sie sind im Innern undeutlich fastig und von gelblichgrauer bis graulichschwarzer Farbe; nicht selten findet man Rugeln von beiden Farben in einem und demselben Meteoriten, und zuweilen beide Farben bei einer und derselben Rugel, und dann teils solche mit einem lichtern Kern bei dunkler Hülle, teils solche mit dunklem Kern bei lichter Hülle. Sie sind in ihrer Zusammensezung noch nicht vollständig untersucht, scheinen aber hauptsächlich ein Magnesia-Silicat zu sein, unterscheiden sich aber von dem Olivin dadurch, dass sie, wenn auch nicht vollkommen unlöslich, doch sehr schwer löslich sind.

- 2. Die schwarze Substanz, die sich in dem Chondrit nach den Beobachtungen unter dem Mikroskop findet.
- 3. Die gelben tafelartigen Kristalle, die in dem Eukrit von Juvenas vorkommen, mit dem Titanit ähnlichkeit haben, von demsselben aber wahrscheinlich doch verschieden sind.
- 4. Die weißen Körner im Howardit, sowie auch die, welche neben dem Shepardit im Chladnit vorkommen.
- 5. Das nach Shepard Schwefel und Chrom haltige Mineral im Chladnit u. s. w.

Außerdem sind bei den Analysen der Meteorsteine Bestandteile gefunden, die auf noch nicht beobachtete Mineralien schließen lassen. Dahin gehört die von Berzelius gefundene geringe Menge von Zinnsäure, die öster mit dem Chromeisenerz bei der Auflösung des Meteoreisens zurückbleibt und wahrscheinlich von einer geringen Menge Zinnstein herrührt, wenn auch die Zinnsäure, die in der Auflösung des Meteoreisens enthalten ist, von dem Metall herrühren mag, das mit dem Nickeleisen verbunden gewesen ist. Ferner die Tonerde und die Alkalien, die in dem Chondrit, Howardit und Chladnit, so wie auch die geringen Mengen von Phosphorsäure und Titansäure, die in dem Eukrit gefunden sind.

Zu den Mineralien, die in den Meteoriten häufig aufgeführt werden, wiewohl ich sie bei denen des Berliner Museums gar nicht, oder nicht mit Sicherheit beobachtet habe, gehören Magneteisenerz, Eisenkies, Labrador, Leucit, Schwefel u. s. w. Auffallend ist besonders die Abwesenheit des Magneteisenerzes in den Meteoriten, 161

<sup>161</sup> Vergl. darüber was bei dem Howardit (S. 109) und Eufrit (S. 133) gesagt ist. Beim Meteoreisen findet es sich wohl, ist aber hier nur sekundärer Bildung (S. 42).

ef scheint in diesen überall durch das Chromeisenerz vertreten zu sein. Ebenso wie das Eisenorwdul sehlt auch das Eisenorwd, und dieses nicht bloß als selbstständiges Mineral, es scheint auch selbst als Bestandteil anderer Mineralien zu sehlen. Unter den metallischen Substanzen wird auch noch das Blei genannt, welches sich in dem Eisen von Tarapaca sindet, da aber dieses Eisen noch zu das probles matischen Meteoriten gehören möchte, 162 so habe ich auch das Blei als Gemenqteil der Meteorit noch nicht ausgesührt.

Die bekannten Mineralien der Meteoriten kommen daher nur zum Teil mit den tellurischen Mineralien überein. Meteoreisen, ja selbst nur reines Eisen, kommt als ursprüngliche Bildung unter den tellurischen Mineralien nicht vor, denn das wenige tellurische Eisen was angeführt wird, scheint immer nur eine sekundäre Bildung und durch einen lokalen Reduktionsprozess entstanden zu sein, und ist dann nie nickelhaltig. Ebenso ist Tänit, Schreibersit, Rhabdit, Troilit und Shepardit noch nicht beobachtet, dagegen Grafit, Masgnetkies, Chromeisenerz, Olivin, Augit und Anorthit unter den tellurischen Mineralien häusig vorkommen, und von Quarz es nur ausfallend ist, dass er, fast das häusigste Mineral auf der Erde, unter den Meteoriten so äußerst selten ist, bei den Steinmeteoriten gar nicht, und nur im Meteoreisen beobachtet ist. Wenn demnach elementare Stosse unter den Meteoriten durchaus nicht gefunden sind, die nicht auch auf der Erde bekannt sind, so ist dies bei den

<sup>162</sup> Diese Weinung äußerte zuerst gegen mich Baron v. Reichenbach, als er in dem Berliner Museum das früher auch für meteorisch gehaltene Eisen von Gr. Ramsdorf sah, mit welchem das Eisen von Sarapaca die größte ähnlichseit haben sollte. Als ich später dieses Eisen selbst sah, siel mir ebenfalls seine große ähnlichseit mit dem Ramsdorfer Eisen auf, und meine Weitern Untersuchungen bestärtten noch meine Zweisel an dem meteorischen Ursprung desselben, denn geäßt gibt es keine Widmanstättensche Figuren, und verhält sich überhaupt nicht wie achtes Meteoreisen, und ebenso verschieden verhält sich das damit vorkommende Sillfat, indem es vor dem Lötrohr leicht schwelzbar ist, was auch bei den ächten Meteoriten nicht vorkommt.

Verbindungen, die sie untereinander bilden, nicht so vollständig der Fall.

Die in den Meteoriten vorkommenden Mineralien kommen nun entweder für sich allein vor oder in einem Gemenge miteinander, worin sie mit den tellurischen Gebirgsarten ganz übereinstimmen. Aber ef ist merkwürdig, dass sie fast nur auf zweierlei Weise vorkoms men, und dass die davon abweichende Weise gewissermaßen nur eine Ausnahme bildet. Man teilt den Meteorit ein in Eisen- und Steinmeteorit; der bei weitem größte Teil der ersteren jedoch besteht nur auf Meteoreisen, und ebenso der größte Teil der Steinmeteoriten aus Chondrit. Das Meteoreisen ist zum größten Teil ein einfaches Mineral, worin der Tänit, Schreibersit und Rhabdit meistenteils regelmäßig eingewachsen sind, und nur in sehr geringer Menge vorkommen. Der Chondrit ist ein so feinkörniges Gemenge, dass ef bis jett noch nicht gelungen ist, die Gemengteil vollständig zu erkennen. In der mehr oder weniger dunklen graulichweißen feinförnigen Masse erkennt man außer den nach unbekannten Rugeln und dem eingesprengten Meteoreisen und Magnetkies nur Körner von Olivin und Chromeisenerz, das übrige nicht. Die bei weitem am häufigsten vorkommende Art der Steinmeteoriten ist also in ihrer Beschaffenheit noch unvollkommen gekannt.

Zu den Eisenmeteoriten gehören noch 2 Arten, der Pallasit und der Mesossiderit. Ersterer ist ein Gemenge von Meteoreisen mit Olivin, letzterer von Meteoreisen mit Olivin und Augit. Der erstere hat eine porphyrartige Struktur, das Meteoreisen bildet die Grundmasse, worin ein Olivinkristalle eingewachsen sind; bei dem letzteren ist die Struktur schon körnig zu nennen, das Eisen tritt

an Masse gegen die andern Gemengteil noch mehr zurück als bei dem Pallasit.

Die übrigen Steinmeteorit sind auch mehr oder weniger gesmengt.

Der so selten vorkommende Chassignit ist fast nur ein körniger eisenreicher Olivin, worin etwas Chromeisenerz eingemengt ist.

Der Shalkit ein körniges Gemenge von vorwaltendem Olivin mit Shepardit und etwas Chromeisenerz.

Der Chladnit besteht vorzugsweise aus Shepardit, die andern Gemengteil sind nicht mit Sicherheit bekannt.

Der Howardit ein feinkörniges Gemenge von Olivin wahrscheinlich mit Anorthit.

Der Eufrit endlich ein solches Gemenge auf Augit und Anorthit.

Fast alle diesen Meteorit sind durch den Olivin, den sie entsalten, ausgezeichnet; der Chassignit besteht fast nur daraus, der Shalkit enthält ihn in vorwaltender Menge, in dem Chondrit und Howardit ist er ein wesentlicher Gemengteil, und der Eukrit enthält ihn zwar als solchen nicht, aber in dem E. von Petersburg ist er doch als unwesentlicher Gemengteil vorgekommen. Nur der Chladenit enthält ihn, so viel man weiß, nicht, doch sindet sich statt seiner das Trisilicat der Magnesia, der Shepardit. Neben dem Olivin ist das Chromeisenerz ein kast in allen Meteoriten, wenn auch nur in geringer Menge vorkommender Gemengteil.

Bergleicht man die Meteoriten, die kosmischen Gebirgsarten, mit den tellurischen, so ergibt sich, dass sie gänzlich von diesen verschieden sind bis auf den Eukrit, der doch unter den tellurischen Gebirgsarten auch nur selten vorkommt und erst in der neuern

Zeit aufgefunden ist. Haughton in Dublin beschrieb zuerst ein solches Gemenge von Carlingfors in Irland, wo es in Gängen im Steinkohlengebirge vorkommt, 163 gab aber das den Anorthit begleitende Mineral für Hornblende auf, waf nach den Stücken, die ich Hrn. Stott verdanke, Augit ist; doch sind ja auch Gesteine, die Gemenge von Anorthit und Hornblende sind, in der neuern Zeit bekannt geworden, wie z. B. das bisher für Diorit gehaltene Gestein vom Kontschekowskoj Kamen im Ural nach Potyka ein solches ist, 164 und solche mögen auch in Irland vorkommen. Die Anorthitaesteine und namentlich der Eukrit sind gewiss aber noch viel häufiger, alf man glaubt. Durch das Gelatinieren des Anorthits mit Chlorwasserstossfäure war ein leichtes Mittel gegeben, denselben vom Labrador zu unterscheiden; ich fand so, dass viele für Hypersthenfels gehaltene Gesteine nichts anderes als Eufrit sind, wie z. B. der sogenannte Hypersthenfels von der Insel Stye, der hier so verbreitet ist, und von dem das Berliner Museum viele und schöne Stücke besitzt, die die Hrn. v. Dechen und v. Dennhausen dort gesammelt und dem Berliner Museum übergeben haben. Die tellurischen Eufrit unterscheiden sich zwar dadurch von den meteorischen, dass sie grobkörniger sind und das Augit in ihnen nicht braun, sondern grün ist, doch sind dies unwesentliche Unterschiede. Einen wichtigen Unterschied würde das Vorkommen des gediegenen Eisens in den meteorischen Eufriten machen, doch ist dieses ja in den meisten, wie in dem von Stannern und Juvenaf, nur in solcher geringen Menge vorhanden, dass es bisher in ihnen ganz übersehen ist, und also einen wesentlichen Gemengteil nicht abgeben kann.

<sup>163</sup> Vergl. Roth: Gesteinsanalysen, S. 52.

<sup>164</sup> A. a. D. S. 52.

Ein Unterschied zwischen dem tellurischen und meteorischen Eufrit findet aber immer statt; der erstere verhält sich zu diesem wie die älteren vulkanischen Gebirgsarten zu den neuern, wie die Gebirgsarten der Granit und Grünsteingruppe zu denen der Trachyt und Basaltgruppe. Wie jene dieselben Gemengteil haben wie diese, und beide sich oft nur in unwesentlichen Eigenschaften voneinander unterscheiden, so ist dies auch hier der Fall. Der tellurische Eufrit gehört zu den Gebirgsarten der Grünsteingruppe, der meteorische zu denen der Basaltgruppe.

Indessen wäre es wohl möglich, dass auch unter den Gebirgsarten der Basaltgruppe, namentlich unter dem, was man Dolerit genannt hat, ein Eukrit vorkäme, der dann in seinen Eigenschaften noch mehr mit dem meteorischen übereinstimmen würde. Unter den in Island vorkommenden Laven ist schon mehrfach Anorthit als Gemengteil beobachtet; die von Genth analysierte Tjorsa-Lava kommt in der Zusammensebung dem Eukrit von Stannern sehr nahe; es ist wohl möglich, dass dies ein Eukrit ist, wie ihn Roth auch schon vorläufig dazu gestellt hat. 165

Mit diesen Gebirgsarten der Basaltgruppe sind überhaupt auch nur die Meteoriten zu vergleichen. Sie kommen mit diesen überein durch die meistenteils körnige Struktur, durch den gänzlichen Mangel freier und die verhältnismäßig geringe Menge der gebundenen Rieselsäure<sup>166</sup> und durch den Reichtum an Olivin. Dies sind aber ziemlich alle Vergleichungspunkte, die den Meteorit darbiesten. Letztere unterscheiden sich wesentlich durch das metallische, stets

<sup>165 91.</sup> n. D. S. 52

<sup>166</sup>Jd sehe hierbei von den kleinen Quarzkristallen ab, die ich in dem Meteoreisen von Toluca und nur in diesem gefunden habe.

lien nicht beobachteten Verbindungen, die sie enthalten, durch die geringe Menge von Silicaten mit Tonerde und Alkali und ferner durch die gänzliche Abwesenheit des Magneteisenerzes, das in den neuern vulkanischen Gebirgsarten der Erde so verbreitet ist. Bei den Meteoriten ist, wie schon bemerkt, das Magneteisenerz durch das Chromeisenerz vertreten. Dieses kommt in den tellurischen Gebirgsarten auch vor, hat hier aber ein ganz anderes geognostisches Vorkommen, indem es hier nicht an den Olivin gebunden ist; indessen fommt es doch auch hier mit einem Magnesiasilicat vor, wenn auch einem wasserhaltigen, dem Serpentin, der nun freilich häusig eine Metamorphose von Olivin ist, aber doch nicht gewöhnlich in den Fällen, wo der Olivin in den Gebirgsarten der Vasaltgruppe vorkommt.

Aber nicht nur in der Art der Gemengteil zeigen die Meteorit Unterschiede von den tellurischen Gebirgsarten, sie finden sich auch in der Struktur. Die Porphyrstruktur, die bei dem Pallasit vorkommt, ist doch darin von der Porphyrstruktur des roten Porphyrs und anderer tellurischen Gebirgsarten verschieden, dass hier die Grundmasse nie ein einfaches Mineral, sondern ein körniges bis dichtes Gemenge verschiedener Mineralien oder eine amorphe Masse ist. Ebenso sind die tellurischen Gebirgsarten von kugliger Struktur dadurch verschieden, dass ihre eingeschlossenen Rugeln, wenn sie

<sup>167</sup> Ein tellurisches Mineralgemenge ist noch mit den Meteoriten zu vergleichen; das sind de Olivinfugeln, die teils eingeschlossen in dem Basalt, teils in dem Basalttuss vorkommen. Sie sind ein körniges Gemenge von Olivin und Augit; enteilten sie noch Nickeleisen, so kämen sie mit dem Mesosiderit überein. Wenn die Olivinfugeln durch diese Beziehung ein gewissel Interesse haben, so erregen sie noch ein anderes durch ihre rätselhafte Bildung. Wenn sie in dem Basalt liegen, so sind sie darin keine Bildungen, die beim Erstarren des Basaltes entstanden sind, wie die einzelnen Olivinkristalle, die neben ihnen in dem Basalt vorkommen, denn sie haben nicht die Struktur solcher Bildungen, sie können daber nur Einschlüsse sein; wenn sie aber solche sind, so muss man fragen, woher sie kommen, und diese Frage ist schwer zu beantworten.

fastig sind, stets radial fastig sind, wie dies nie bei den Rugeln des Chondrits der Fall ist, wo man ihre Struktur erkennen kann.

Auch die körnige Struktur der Meteoriten ist dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen ein so schneller Wechsel in Korou und Farbe des Gesteins vorkommt. Bei dem Eufrit von Stannern finden sich ganz feinförnige, ja dicht zu nennende Abänderungen neben kleinkörnigen und schneiden scharf an diesen ab; und etwas ähnliches kommt auch bei den andern Eufriten sowie auch bei den Howarditen vor. In dem Chondrit von Grüneberg ist die eine Hälfte des Stückes grau, die andere weiß, und auch hier schneiden beide Abänderungen scharf ab. In dem Chondrit von Chantonnay und Siena treffen auf diese Weise sich graue und schwarze Teile, und bei dem Chondrit von Ensisheim hat es fast das Ansehen, als durchseze die eine die andere in Gängen. Bei den tellurischen Gebirgsarten grenzen auch wohl feine und grobkörnige Abänderungen aneinander, doch findet dieses im Ganzen nur selten statt, und der übergang ist nie so scharf. Diess Zusammenkommen von so verschieden aussehenden Varietäten dicht nebeneinander gibt den Meteoriten ein breccienartiges Ansehen, und als soldie Breccien hat man sie ja auch oft schon beschrieben. Wenn aber auch bei ihnen so verschiedenartig aussehende Abänderungen scharf aneinander abschneiden, es sind sie doch in ihren wesentlichen Eigenschaften nicht voneinander verschieden die Meteoriten daher nie Breccien im Sinne unserer Gebirgsarten, und dieser Ausdruck, wenn er für sie gebraucht wird, ist immer nur ein uneigentlicher.

Drusig werden die Meteoriten selten, aber es kommt doch in ausgezeichneter Beise vor bei dem Eufrit von Juvenas. 168 Shepard

<sup>168</sup> Besonders schön sollen die Drusen zu sehen sein bei dem großen, 42 Kilogramm schweren Bruchstüd dieses

beschreibt noch Drusen bei dem Chondrit von Richmond; andere drusige Meteoriten als diese sind aber nicht bekannt. —

Ungeachtet aller der genannten Verschiedenheiten haben die Steinmeteorit doch eine nicht zu leugnende ähnlichkeit mit den neuern vulkanischen Gebirgsarten, und bei dem hohen Interesse, das die Meteoriten als außertellurische Körper gewähren, ist diese übereinstimmung, wie sie auch immer sei, von großer Wichtigkeit.

Meteoriten, welchef sich in dem Muse d'histoire naturelle in Paris befindet und das größte ist, welches existiert.

# 4 Nachtrag.

Während des Druckes der letten Vogen erhielt ich noch einige neue Meteoriten, über welche ich hier noch Einiges hinzufüge.

1. Mesosiderit von Atacama in Chile. Er wurde auf einem Bergpasse 50 engl. Meilen von Copiapo gesunden, von Hrn. Brower erworden, der ihn nach New York brachte und dem Union College in Schenectady übergab, wo er vom Prosessor Joy analysiert und beschrieben wurde. 169 Durch Hrn. Pros. Chandler in Schenectady erhielt ich eine kleine Probe und ein Modell des ursprünglichen Meteoriten. Er hat hiernach eine ellipsoidische Gestalt mit ziemlich ebener Obersläche und eine Länge, Breite und Höhe von etwa 4, 3 1/2 und 3 Zoll. Sein Gewicht betrug nach Joy 1784 Grammen, sein spez. Gew. 4,35. Nach der übersandten Probe hat er auf den ersten Anblick so große ähnlichseit mit dem Mesosiberit von der Sierra de Chaco in Atacama (vergl. oben S. 81), dass man geneigt sein könnte, ihn mit diesem für identisch zu halten. Nach der Analyse von Joy enthält er 57,657 metallische Teile und 42,419 Silicate, die wieder bestehen in 100 Teilen aus

<sup>169</sup> Silliman, Amer. Journ. of Sc. and arts 1864, v. 37, p. 243.

Eisen	83,76
Nicel	9,18
Robalt	1,45
Mangan	0,65
Rupfer	0,07
Phosphor	0,20
Schwefel	4,67170
	99,98

<u> </u>	
Eisenorydul	24,47
Manganorydul	2,29
Magnesia	10,05
Ralf	3,63
Nickels u. Kobaltoryd	0,17
Tonerde	8,86
Chromoryd	1,12
Rieselsäure	48,61
Zinnsäure	0,44
	99,64

## Joy berechnet hiernach in den Silicaten:

Chromeisenerz	1,64
Dlivin	27,43
Labrador	70,13
	99,20

Hr. Jon hat aber hierbei das Augit übersehen, der in dem kleisnen übersandten Stücke ganz deutlich, und von derselben Beschafs

fenheit wie bei dem Mesosiderit von der Sierra de Chaco enthalten ist; ich konnte einen kleinen Kristall herausnehmen, und mich durch Messung der Winkel der Spaltungsflächen überzeugen, dass er Augit sei. Olivin ist außerdem ganz deutlich sichtbar, Chromeisenerz nicht, doch nach dem bei der Analyse gefundenen Chromoryd sehr wahrscheinlich. Hr. Jon berechnet nun noch auf der Analyse in dem Meteorit eine bedeutende Menge Labrador; allerdings sieht man in der übersandten Probe kleine Kristalle, die eine deutlich gestreifte Spaltungsfläche zeigen und vielleicht Labrador oder ein anderer eins und eingliedriger Feldspat wie Anorthit sein könnten, und der gefundene Tonerdegehalt, der für Augit allein zu groß erscheint, spricht auch für die Annahme eines solchen Feldspats, wenn er auch nicht in solcher Menge wie ihn Joy annimmt in dem Meteoriten enthalten sein könnte. In dem viel größeren Stücke des Mesosiderits von der Sierra de Chaco in dem Berliner Museum habe ich aber diese Kristalle nicht beobachten können; und es wäre demnach wohl möglich, dass dadurch eine Verschiedenheit zwischen den Meteoriten von der Sierra de Chaco und Copiapo angedeutet wäre; ich habe daher einstweilen noch in der folgenden übersicht den Meteoriten von Copiapo als Besonderen Meteoriten hinter dem von der Sierra de Chaco aufgeführt.

2. Meteoreisen von dem Indianischen Territorium Dakota in Nord-Amerika. Dr. Jackson in Boston erhielt 1863 von dieser Eisenmasse, die sich in einem über 90 engl. Meilen von jeder Straße oder Wohnung entferntem Grunde gefunden hatte, und deren Gewicht auf 100 Pfund geschätzt wurde, ein 10 Pfund 10 Unzen schweres Stück. Er fand sein spez. Gew. 7,952, die Härte

wie die des weichsten schmiedbaren Eisens, und seine chemische Zusammensetzung bestehend auß

Eisen	91,735
Nicel	6,532
Sinn	0,063
Phosphor	0,010
	98,340

Ein zweiter Versuch bestimmte den Nickelgehalt zu 7,080.171

Ich erhielt von Hrn. Prof. Shepard eine von dem Stücke def Dr. Jackson abgeschnittene, 4 Linien dicke und 3,319 Loth schwere Platte, die an den Rändern zum Teil noch mit der natürlichen Oberfläche begrenzt und hier mit einer nur ganz dünnen Rinde von Eisenorvohydrat bedeckt ist. Das Eisen zeigt geätt die äbunglinien, die über die ganze Fläche fortlaufen, wie bei dem Eisen von Braunau, und ebenso die kleinen eingewachsenen Rhabditkristalle, gehört also zu der bis setzt nur selten vorgekommenen Abteilung des Meteoreisens, das nur aus einem Individuum ohne schalige Zusammensebung besteht. Beim Zerreißen des Eisens würden also die heraedrischen Spaltungsstächen sichtbar werden. — Außer dem Rhabdit sindet sich in der Platte Schreibersit in mehreren ungewöhnlich großen Partien, die an einer Stelle zusammengehäuft sind, eingewachsen.

3. Meteoreisen von Tucson (s. oben S. 73). Ich erhielt von diesem Eisen von Hrn. Shepard eine dünne 1,635 Loth schwere

<sup>171</sup> Sillimann, Amer. Journ. of sc. and arts, 1863, v. 36. p. 259.

Platte. Die polierte Fläche ist voller kleiner runder Höhlungen. Geätt zeigt sie grobkörnige Zusammensetzungstücke, von denen eisnige bei einer gewissen Beleuchtung eine lichte graue, andere eine dunklere graue Farbe haben; bei anderer Beleuchtung verhalten sie sich umgekehrt. Die Zusammensetzungstücke haben eine sehr dünne Einfassung von Tänit, und viele der kleinen Höhlungen haben nun glänzende Wände erhalten, die auf der übrigen matten Fläche hers vorleuchten. Die Zusammensetzungsslächen zeigen seine linienartige gerade Furchen, die eine von den ätzunglinien etwas verschiedes ne Beschassenheit haben. Da nun bei diesem Eisen auch oktaedrische Spaltbarkeit<sup>172</sup> (soll wohl heißen oktaedrische Zusammensetzung) ans gegeben wird, so habe ich dieses Eisen in der folgenden übersicht auf das Eisen von Seeläsgen und Tucuman folgen lassen.

- 4. Meteoreisen von Wanne County, Ohio Ver. St. 1859. Eine kleine geätzte Platte mit deutlichen Widmanst. Fig. von Hrn. Shepard erhalten. Das Eisen folgt in der übersicht nach dem von Rebraska.
- 5. Das Meteoreisen von Cranbourne. Das kleine Stück der Sammlung (s. oben S. 73) lässt geäßt noch die Widmanskätten. Fig. erkennen, die auch sonst angegeben werden; ich habe es deshalb auf das Eisen von Denton folgen lassen.
- 6. Pallasit von Rogue River Mountains, Oregon, N. Amerika 1859, wovon ich kleine Stücken von Hrn. Shepard und
- 7. Mesosiderit (?) von Niakornak in Grönland, von Hrn. Greg erhalten habe, wurden der erstere hinter dem P. von Brashin, der letztere hinter dem M. von Hainholz eingeordnet.

<sup>172</sup> Buchners Meteoriten, S. 183.

- 8. Den mikrostopischen Zeichnungen auf den Tas. 3 und 4 habe ich noch eine neue in Fig. 12 Tas. 3 hinzugefügt, die eine Stelle auf einer dünnen Platte des Chondrits von Chantonnan in derselben Vergrößerung wie die Fig. 3 und 4 darstellt. Sie zeigt eine Gruppe durchsichtiger ungefärbter (Olivin) Kristalle, die von der schwarzen Substanz fast ganz umgeben, und daher überall, wo sie an diese angrenzen, regelmäßig begrenzt sind. Außerdem sieht man in diesen Kristallen kleine sehr seine, schwarze haarförmige Kristalle, in verschiedenen Höhen liegen, die wahrscheinlich ähnlische röhrensörmigen Einschlüsse, wie die in den Olivinkristallen des Pallasseisens sind.
- 9. Eufrit. Berechnet man auf den durch die Analyse gefundenen Gewichtsmengen des Anorthits und Augits und den spezisischen Gewichten (2,76 und 3,35) die Volumina der Gemengteil, so ergibt sich das Volumenwerhältnis von Anorthit und Augit in dem E. von Stannern wie 12,35: 19,40 und in dem E. von Juvenas a) wenn man alles durch die Säure Zersetzte für Anorthit und das Unzersetzte für Augit nimmt, wie 13,32: 18,87 und b) wenn man bei der Verechnung die Phosphorsäure, das Schweseleisen und Chromeisenerz in der Analyse von Rammelsberg abzieht, wie 13,14: 18,72; oder in dem E. von Stannern beinahe wie 2: 3, in dem von Juvenas wie 5: 7.

Berechnet man das spezissische Gewicht des Gemenges auf den Gemengteilen, so erhält man für den E. von Stannern: 3,14; für den E. von Juvenas a) 3,10, b) 3,13, was mit den gefundenen Werten nahe übereinkommt. (Vergl. oben S. 134 die zweite Anmerkung.)

\*

\*

\*

\*

\*

- 4.1 Übersicht der Meteoriten in dem mineralogischen Museum von Berlin.
  - 1. Eisenmeteorit.
  - 1. Meteoreisen.

# a. Aus einem Individuum bestehend, ohne schalige Zusammensetzung.

Fortl.	Jahr	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	der		Hauptstücks	Stücke
	Auf≠			
	fundg.			
1	1847	gefallen 14. Juli. Braunau (Haupt- mannsdorf), Böhmen	2 Pfd. 21,30 Lth.	3 Pfd. 6,82 Eth.
2	1838	Claiborne, County Alabama, Ver. St. R. A.	9,30 Eth.	9,52 Eth.
3	1860	Saltillo (Coahuila), Mexico	0,96 Eth.	1,32 Eth.
4	1863	Dafota Territorium, Ver. St. N. A.	3,32 Eth.	3,32 Eth.

#### b. Aus vielen grobkörnigen Individuen bestehend.

Fortl. Zahl	Jahr der Auf- fundg.	Rame und Fundort	Gewicht bef Hauptstüdf	Gewicht aller Stüde
5	1847	Seeläsgen, Schwiebus, Frankfurt, Preussen	3 Pfd. 8,55 Eth.	8 Pfd. 16,83 Lth.
6	1856	Relson County, Kentudy, B. St.	16,31 Eth.	21,77 Lth.
7	1853	Union County, Georgia, V. St.	2,38 Lth.	3,26 Lth.
8	1788	Tucuman (Otumpa), Argent. Rep., S. A.	7,89 Lth.	8,50 Eth.
9	1850	Tucson, Sonora, Mexico	1,63 Eth.	1,76 Eth.

## c. Auf einem Individuum bestehend, mit schaliger Zusammensetzung parallel den Flächen des Oktaeders.

Fortl.	Jahr	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller Stücke
Zahl	der		Hauptstücks	
	Auf=			
	fundg.			
10	1829	Bohumilik, Prachin, Böhmen	2 Pfd. 19,78 Lth.	2 Pfd. 22,36 Eth.
11	1856	Brazof, Teraf, V. St.	0,65 Eth.	0,65 Eth.
12	1856	Denton County, Texas, V. St.	0,68 Eth.	0,68 Eth.
13	1861	Cranbourne, Melbourne, Australien	0,28 Eth.	0,28 Eth.
14	1840	Cofby Creef, Cote County, Tenneffee, 2. St.	3,20 Eth.	14,34 Eth.
15	1844	Arva (Szlanicza), Ungarn	18,88 Eth.	2 Pfd. 2,12 Eth.
16	1854	Sarepta, Saratow, Ruffland	4 Pfd. 2,07 Eth.	5 Pfd. 0,93 Eth.
17	1840	Sevier County, Tenneffee, B. St.	11,88 Lth.	11,88 Eth
18	1816	Bembegó, Bahia, Brafilien	1,20 Eth.	1,20 Eth.
19	1850	Schwet, Marienwerder, Preuffen	10 Pfd. 1,21 Eth.	17 Pfd. 19,65 Eth.
20	1850	Rufff Mountain, Newberry, V. St.	8,03 Eth.	8,03 Eth.
21	1851	Seneca River, New-York, 9 B. St.	1,03 Eth.	1,03 Eth.
22	1784	Toluca-Thal, Mexico	10 Pfd. 12,80 Eth.	18 Pfd. 29,14 Eth.
23	1834	Misteca, Daraca, Merico	2 Pfo. 13,70 Eth.	2 Pfd. 13,70 Eth.
24	1784	Sierra blanca, Huajaquilla, Mexico	8,49 Eth.	8,91 Eth.
25	1856	Tula (Netschaevo), Ruffland	22,94 Eth.	22,94 Eth.
26	1861	Robertson County, Tennessee, B. St.	10,34 Eth.	10,34 Eth.
27	1844	Carthago, Smith County, Tennessee, B. St.	1 Pfd. 16,44 Lth.	1 Pfd. 18,42 Eth.
28	1819	Burlington, Otsega County, News York, V. St.	6,27 Lth.	7,17 Lth.
29	1856	Marshall County, Kentudy, V. St.	4,39 Eth.	4,39 Eth.
30	1823	St. Rosa, Tunja, Columbien (Karfeten)	0,03 Eth.	0,03 Eth.
31	1856	Orange River, Süd-Afrika	1,74 Lth.	1,74 Eth.
32	1814	Tegas (Red Niver) V. St.	6,38 Eth.	6,38 Eth.
33	1815	Lenarto, Scharosch, Ungarn	14,98 Eth.	26,78 Eth.
34	1804	Durango, Merico	1 Pfd. 2,67 Eth.	1 Pfd. 22,42 Eth.
35	1854	Werchne-Udinft, West-Sibirien	1 Pfd. 4,17 Eth.	1 Pfd. 4,17 Eth.
36	1811	Elbogen, Böhmen	9,92 Eth.	11,95 Eth.

Fortl.	Jahr	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller Stücke
Zahl	ber		Hauptstücks	
	Auf=			
	fundg.			
37	1856	Nebrasta Territorn, V. St.	0,78 Eth.	0,78 Lth.
38	1859	Wanne County, Ohio, V. St.	0,07 Eth.	0,07 Eth.
39	1854	Madoc, Ober-Canada	1,74 Eth.	1,74 Eth.
40	1835	Blad Mountain, Buncumbe Cty, Rords Carolina, B. St.	1,57 Eth.	1,57 Eth.
41	1828	Caille, Graffe, Bar, Frankreich	5,69 Eth.	6,23 Eth.
42	1751	gefallen 26. Mai. Agram (Hraschina),	0,64 Eth.	1,69 Eth.
		Rroatien		
43	1839	Ashville, Buncumbe County, Rord-	0,38 Eth.	0,82 Eth.
		Carolina, V. St.		
44	1830	Guildford, Nord-Carolina, V. St.	0,06 Eth.	0,06 Eth.
45	1853	Löwenfuff, Groß-Namaqualand, S. Afrika	3,61 Eth.	3,61 Eth.
46	1845	Lockport (Cambria), New-York, V. St.	2,86 Eth.	2,86 Eth.
47	1856	Jewell Hill, Madison County, Nords	6,06 Eth.	6,06 Eth.
		Carolina, V. St.		
48	1856	Oldham County, (Lagrange), Kentudy,	1 Pfd. 5,55 Eth.	1 Pfd. 29,85 Eth.
		№. St.		
49	1854	Putnam County, Georgia, B. St.	1,48 Eth.	1,48 Eth.
50	1854	Tazewell, Claiborne County, Tennessee, B. St.	1 Pfd. 6,70 Eth.	1 Pfd. 13,51 Eth.

# d. Auf großkörnigen, schalig zusammengesetzten Individuen bestehend.

Fortl. Zahl	Jahr der Auf≠ fundg.	Name und Fundort	Gewicht bef Hauptstücks	Gewicht aller Stilde
51	1792	Zacatecas, Mexico	2 Pfd. 13,18 Eth.	2 Pfd. 25,15 Eth.

# e. Aus feinkörnigen Individuen bestehend.

Fortl. Zahl	Jahr ber	Rame und Fundort	Gewicht des Sauptstücks	Gewicht aller Stücke
20091	Auf=		-3 444 (1444)	
	fundg.			
52	1823	St. Rosa (Tocavita), Tunja, Columsien (Boussingault)	28,20 Eth.	2 Pfd. 1,22 Eth.
53	1823	Rafgatà, Zipaquira bei Bogota, Co-	4,79 Eth.	4,79 Lth.
54	1849	Chesterville, Süd-Carolina, V. St.	14,93 Eth.	25,66 Eth.
55	1788	Tucuman (Otumpa), Argent. Rep., S. Amerika	3,11 Eth.	3,11 Eth.
56	1763	Senegal, Land Stratif, Bambuf, S. Afrika	4,46 Eth.	4,46 Eth.
57	1851	Salt River, Rentudy, V. St.	1,12 Eth.	1,12 Eth.
58	1801	Cap d. g. Hoffnung (zw. Sonntagf u. Boschemannfil.)	1 Pfd. 8,50 Lth.	1 Pfd. 13,05 Eth.
59	1845	Babb's Mill, Greenville, Green Ctv, Tennessee, B. St.	2,56 Eth.	2,90 Lth.
60	1845	De Ralb County, Tennessee, B. St.	0,18 Eth.	0,18 Eth.

# 2. Pallasit.

Fortl.	Jahr	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller Stücke
Zahl	ber		Hauptstücks	
	Auf≠			
	fundg.			
61	1776	Rrasnojarst, Jeniseist, Sibirien (Pallas-Eisen)	1 Pfd. 23,21 Eth.	5 Pfd. 23,06 Eth.
62	1822	Brahin, Minst, Russland	15,28 Eth.	27,26 Eth.
63	1863	Rogue River Mountains, Oregon R. Amerika		
64	1827	Atacama, Chile, Süd-Amerika	23,31 Eth.	1 Pfd. 17,52 Eth.
65	1751	Steinbach, zw. Eibenstod u. Joh. Georgenstadt,	1,38 Eth.	3,01 Eth.
		Sadsfen		
66	1861	Ritterfgrün, Schwarzenberg, Sachsen	29,27 Eth.	1 Pfd. 5,65 Eth.
67	1861	Breitenbach, Böhmen, nahe bei Joh. Georgen-	6,64 Lth.	8,77 Eth.
		ftadt		
68	1814	Bitburg, Trier, Preuffen	0,62 Eth.	0,62 Eth.

# 3. Mesosiderit.

Fortl.	Jahr	Name und Fundort	Gewicht	des	Gewicht aller Stücke
Bahl	ber		Hauptstücks		
	Auf=				
	fundg.				
69	1862	Sierra de Chaco, Atacama, Chile	23,90 Eth.		25,3 Eth.
70	1864	Utacama, 50 engl. Meilen von Copiapo	0,70 Eth.		0,70 Eth.
71	1856	Hainholz, Minden, Preussen	20,18 Eth.		1 Pfd. 1,75 Eth.
72		Riafornaf, Grönland	0,39 Eth.		0,39 Eth.

#### 2. Steinmeteorit.

#### 1. Chondrit.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	ber	Falles		Hauptstücks	Stücke
	Auf≠				
	fundg.				
1	1843	16. Sept.	Rlein Wenden, Nordhausen, Erfurt,	4 Pfd. 23,10 Eth.	5 Pfd. 1,85 Lth.
			Preuff.		
2	1812	15. April	Errleben, Magdeburg, Preuffen	3,39 Eth.	11,88 Eth.
3	1863	8. Aug.	Pillistser, Livland	1,10 Eth.	1,23 Eth.
4	1862	7. Dft.	Rlein Menow, Alt-Strelis, Meklenburg	0,74 Eth.	1,12 Eth.
5	1857	24. März	Stauropol, nördliche Seite des Raukasus	0,97 Eth.	0,97 Eth.
6	1861	12. Mai	Butsura (Qutahar), Bengalen, Oftindien	5,47 Eth.	5,47 Eth.
7	1492	7. Nov.	Enfisheim, Elfass, Frankreich	25,63 Eth.	1 Pfd. 23,66 Eth.
8	1812	5. Aug.	Chantonnan, Bendée, Frankreich	13,06 Eth.	17,01 Eth.
9	1753	3. Juli	Tabor (Plan, Strkow), Böhmen	2,81 Eth.	4,67 Lth.
10	1768	13. Sept.	Lucé en Marne, Sarthe, Frankreich	1,36 Eth.	1,36 Eth.
11	1790	24. Juli	Barbotan, Landes, Frankreich	13,36 Eth.	18,14 Eth.
12	1805	25. März	Doroninst, Irfust, Sibirien	3,14 Eth.	3,14 Eth.
13	1813	10. Sept.	Limeria (Adair, Scagh u. s. w.), Irland	0,24 Eth.	0,24 Eth.
14	1810	Aug.	Tipperary (Mooresfort), Irland	2,32 Eth.	2,32 Eth.
15	1766	Juli	Albareto, Modena, Italien	0,07 Eth.	0,07 Eth.
16	1812	10. April	Toulouse, Haute Garonne, Frankreich	1,75 Eth.	1,75 Lth.
17	1818	Juni	Seres, Macedonien, Türkei	1,98 Eth.	2,93 Eth.
18	1829	9. Sept.	Arasnoi-Ugol, Räsan, Aussland	4,30 Eth.	4,30 Eth.
19	1822	30. Nov.	Allahabad (Futtehpore), Ostindien	0,37 Eth.	0,37 Eth.
20	1831	9. Sept.	Weffely, Gradisch, Mähren	0,21 Eth.	0,21 Eth.
21	1841	22. März	Grüneberg (Beinrichsau), Liegnis, Preuff.	1 Pfd. 12,83 Eth.	1 Pfd. 17,20 Eth.
22	1849	31. Oft.	Cabarras County, Nord-Carolina, B.	6,27 Eth.	8,04 Eth.
			St.		
23	1852	4. Sept.	Mező-Madaraf, Marosch, Siebenbürgen	5 Pfd. 11,33 Eth.	5 Pfd. 15,85 Eth.
24	1838	18. April	Afburpur, Sahurunpur, Oftindien	0,58 Lth.	0,58 Lth.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	ber	Falles		Hauptstüds	Stüde
	Auf=				
	fundg.				
25	1824	15. Jan.	Renazzo, Ferrara, Italien	0,14 Eth.	0,18 Eth.
26	1753	7. Sept.	Euponnas, Ain, Frankreich	0,10 Eth.	0,10 Eth.
27	1859	26. März	Harrison County, Rentudy, B. St.	1,18 Eth.	1,18 Eth.
28	1785	19. Febr.	Eichstädt (Wittmes), Baiern	0,96 Eth.	0,96 Eth.
29	1798	13. Dez.	Benares, Bengalen, Ostindien	0,36 Eth.	0,61 Eth.
30	1857	27. Dez.	Pegu (Quenggout, NNO. von Baffein)	0,86 Eth.	1,06 Eth.
31	1825	10. Febr.	Nanjemon, Maryland, V. St.	1,99 Eth.	1,99 Eth.
32	1807	13. März	Timochin, Juchnow, Smolenst, Russland	13,14 Eth.	24,04 Eth.
33	1852	23. Jan.	Rellore, Yatoor, Madras, Ostindien	5,56 Eth.	5,66 Eth.
34	1856	12. Nov.	Trenzano, SB. von Brescia, Lombardei	0,42 Eth.	0,42 Eth.
35	1853	6. März	Segowlee, Sarun, Oftindien	0,37 Eth.	0,37 Eth.
36	1807	14. Dez.	Beston, Connecticut, B. St.	1,05 Eth.	1,27 Eth.
37	1808	19. April	Parma (Cafignano, Borgo San Donino)	0,92 Eth.	0,92 Eth.
38	1820	12. Juli	Lirna, Dünaburg, Bitebst, Ruffland	2,06 Eth.	4,91 Eth.
39	1833	25. Nov.	Blansto, Brünn, Mähren	1,62 Lth.	1,62 Eth.
40	1828	4. Juni	Richmond, Virginia, V. St.	0,96 Eth.	1,50 Eth.
41	1822	13. Sept.	La Baffe, Epinal, Vosges, Frankreich	0,64 Eth.	0,64 Eth.
42	1857	10. Oft.	Dhaba, D. von Karlsburg, Siebenbürgen	0,06 Eth.	0,06 Eth.
43	1838		Gouv. Pultava, Ruffland	0,48 Eth.	0,48 Eth.
44	1836	11. Nov.	Macao, Rio Grande del Norte, Brafilien	2,24 Eth.	2,24 Eth.
45	1851	17. April	Güterflohe, Minden, Preuffen	1 Pfd. 21,34 Eth.	1 Pfd. 23,44 Eth.
46	1860	2. Febr.	Aleffandria, Piemont	0,08 Eth.	0,08 Eth.
47	1794	16. Juni	Siena, Toscana, Italien	3,13 Eth.	3,62 Eth.
48	1857	28. Febr.	Parnallee, S. von Madura, S. Hindof	24,50 Eth.	24,97 Eth.
		m .	ton		
49	1855	13. Mai	Bremervörde, Stade, Hannover	16,94 Eth.	16,94 Eth.
50	1858	9. Dez.	Ausson, Haute Garonne, Frankreich	28,85 Eth.	1 Pfd. 2,88 Eth.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	ber	Falles		Hauptstücks	Stüde
	Auf=				
	fundg.				
51	1815	18. Febr.	Durala, Petialah, Delhi, Oftindien	1,84 Eth.	1,84 Eth.
52	1768	20. Nov.	Mauernkirchen, Destreich ob der Enns	9,93 Eth.	13,79 Eth.
53	1863	7. Dez.	Tirlemont (Tourinnef-la-Groffe), Belgien	15,20 Eth.	15,20 Eth.
54	1863	2. Juni	Buschhof, Rurland	4,52 Eth.	4,52 Eth.
55	1847	25. Febr.	Linn County, Jowa, B. St.	17,72 Eth.	18,71 Lth.
56	1854	5. Sept.	Linum, Fehrbellin, Potsdam, Preussen	3 Pfd. 13,83 Eth.	3 Pfd. 13,83 Eth.
57	1803	3. Dft.	Apt (Saurette), Vancluse, Frankreich	0,96 Eth.	0,96 Eth.
58	1814	15. Febr.	Bachmut, Jekaterinoflaw, Ruffland	3,84 Eth.	3,84 Eth.
59	1860	1. Mai	New-Concord, Mustinjum Ctv, Ohio, V.	26 Pfd. 24,30 Eth.	27 Pfd. 4,39 Lth.
60	1825	14. Sept.	Hanaruru, Dwahu, Sandwich Inseln	3,86 Eth.	3,86 Lth.
61	1834	12. Juni	Charwallas, Ostindien	0,05 Eth.	0,05 Eth.
62	1858	19. Mai	Rafowa, NW. von Orawiza, Tem. Basnat	0,58 Eth.	0,58 Eth.
63	1787	13. Oft.	Charlow (Bobrit), Ruffland	0,15 Eth.	0,25 Eth.
64	1795	13. Dez.	Bold Cottage, Yorksbire, England	0,18 Eth.	0,18 Eth.
65	1798	8. od. 12. Mz.	Salef, Villefranche, Rhone, Frankreich	0,96 Lth.	0,96 Lth.
66	1715	11. April	Schellin, Garz, Stargard, Pommern	0,34 Eth.	0,34 Eth.
67	1803	26. April	Aigle, Orne, Normandie, Frankreich	1 Pfd. 1,83 Eth.	4 Pfd. 1,12 Eth.
68	1860	14. Juli	Dhurmsala, Pundjab, Ostindien	12,02 Eth.	12,02 Eth.
69	1805	Nov.	Usco, Corsica	0,40 Eth.	0,40 Eth.
70	1808	3. Sept.	Liffa, Jung-Bunzlau, Böhmen	1 Pfd. 7,35 Eth.	1 Pfd. 15,27 Eth.
71	1829	14. Aug.	Deal (Long Branch), Rew Yersen, B.	0,02 Eth.	0,02 Eth.
72	1860	28. März	Rheragur, Agra, Oftindien	0,28 Eth.	0,28 Eth.
73	1810	23. Nov.	Charsonville, Orleans, Loire, Frankreich	2,18 Eth.	2,18 Eth.
74	1811	12. März	Ruleschowka, Poltowa, Ruffland	0,12 Eth.	0,23 Eth.
75	1811	8. Juli	Berlanguillas, Burgos, Spanien	1,89 Lth.	2,31 Eth.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	ber	Falles		Hauptstücks	Stüde
	Auf≠				
	fundg.				
76	1814	5. Sept.	Agen, Lot und Garonne, Frankreich	1,09 Eth.	1,09 Eth.
77	1818	10. April	Zaborzika, Bolhynien, Ruffland	2,65 Eth.	3,25 Eth.
78	1818	10. Aug.	Slobodfa, Judynow, Smolenft, Ruffland	7,45 Eth.	7,45 Eth.
79	1819	13. Oft.	Polit, Röftrit, Gera, Fürstenth. Reuff	1 Pfd. 11,49 Eth.	1 Pfd. 13,43 Eth.
80	1829	8. Mai	Forsith, Monroe County, Georgia, B.	1,11 Eth.	1,22 Eth.
			€t.		
81	1852	gefunden	Mainz, Groffberzogtum Heffen	0,12 Eth.	0,17 Eth.
82	1831	18. Juli	Bouillé, Poitiers, Vienne, Frankreich	0,25 Eth.	0,25 Eth.
83	1833	27. Dez.	Ofning, Rremenet, Bolhynien, Ruffland	3,92 Eth.	3,92 Eth.
84	1839	13. Febr.	Little Pinen, Loiret, Miffouri, B. St.	0,82 Eth.	0,87 Eth.
85	1841	12. Juni	Château-Renard, Loiret, Frankreich	15,81 Eth.	26,93 Eth.
86	1827	16. Febr.	Mhow, Ghazeepore, Allahabad, Oftindien	0,09 Eth.	0,09 Eth.
87	1855	13. Mai	Infel Defel, Ruffland	1,30 Eth.	1,30 Eth.
88	1848	20. Mai	Castine, Maine, B. St.	0,04 Eth.	0,04 Eth.
89	1808		Morodabad, Delhi, Ostindien	0,12 Eth.	0,12 Eth.
90	1804	5. April	Glasgow (Dorf High Possil), Schottland	0,05 Eth.	0,05 Eth.
91	1842	26. April	Milena, Warasdin, Kroatien	0,58 Eth.	0,58 Eth.
92	1838	6. Juni	Chandafapoor, Beraar, Ostindien	0,30 Eth.	0,30 Eth.
93	1804		Darmstadt	0,08 Eth.	0,08 Eth.

### 2. Howardit.

Fortl. Zahl	Jahr der Auf=	Datum des Falles	Name und Fundort	Gewicht def Hauptstüds	Gewicht aller Stücke
	fundg.				
94	1813	13. Dez.	Loutolax, Wiborg, Finland	0,24 Eth.	0,33 Eth.
95	1827	5. Dft.	Bialystof (Dorf Knasta), Russland	4,86 Eth.	5,09 Eth.
96	1803	13. Dez.	Mässing (Dorf St. Nicolas), Baiern	1,43 Eth.	1,43 Eth.
97	1823	7. Aug.	Nobleborough, Maine, B. St. N. A.	0,04 Eth.	0,04 Eth.
98	1843	26. Juli	Mallngaum, Kandeish, Ostindien	0,03 Eth.	0,03 Eth.

# 3. Chassignit.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	der Auf=	Falles		Hauptstücks	Stüde
	fundg.				
99	1815	3. Dft.	Chassignn, Langres, Haute Marne, Fran-	0,79 Eth.	0,99 Eth.
			fr.		

## d. Shalkit.

Fortl. Zahl	Jahr der Auf fundg.	Datum def Fallef	Name und Fundort	Gewicht def Hauptstücks	Gewicht aller Stiide
100	1850	30. Nov.	Shalfa in Bancoora, Ostindien	4,79 Eth.	5,07 Eth.

# 5. Chladnit.

	Fortl. Zahl	Jahr der Auf- fundg.	Datum des Falles	Name und Fundort	Gewicht def Hauptstücks	Gewicht aller Stücke
ſ	101	1843	25. März	Bishopville, Süd-Larolina, V. St.	10,73 Eth.	13,90 Eth.

#### 6. Kohligen Meteorit.

Fortl. Zahl	Tahr der Uuf≈	Datum des Falles	Name und Fundort	Gewicht des Hauptstücks	Gewicht aller Stücke
	fundg.				
102	1806	15. März	Alaif, Gard, Frankreich	1,49 Eth.	1,49 Eth.
103	1838	13. Oft.	Cold Boffeveld, Cap d. g. Hoffn., S. Africa	0,55 Eth.	1,29 Eth.
104	1857	15. April	Kaba, SB. v. Debreczin, Ungarn	0,05 Eth.	0,05 Eth.
105	1864	14. Mai	Orgueil (Montauban), Frankreich	7,875 Eth.	7,875 Lth.

#### 7. Eufrit.

Fortl.	Jahr	Datum des	Name und Fundort	Gewicht des	Gewicht aller
Zahl	ber	Falles		Hauptstücks	Stüde
	Auf≠				
	fundg.				
106	1821	15. Juni	Juvenas, Ardèche, Frankreich	1 Pfd. 4,28 Eth.	2 Pfd. 1,42 Lth.
107	1808	22. Mai	Stannern, Iglau, Mähren	26,99 Eth.	6 Pfd. 27,65 Eth.
108	1819	13. Juni	Jonzac, Charente, Frankreich	0,13 Eth.	0,13 Eth.
109	1855	5. Aug.	Petersburg, Lincoln Ctn, Tennessee, B.	3,47 Eth.	4,52 Eth.
			€t.		

Das Pfund = 30 Loth = 1/2 Kilogramm, 1 Gramm also = 0,6 Loth.

# 5 Erklärung der Rupfertafeln.

(Die Stärke der Vergrößerung ist bei den mikroskopischen Zeichnungen selbst angegeben.)

#### 5.1 **Eafel** 1

Figur 1 — Die Ede o desselben vergrößert dargestellt, an welcher möglichst genau alle äkunglinien, die an demselben mit der Lupe beobachtet werden konnten, angegeben sind. Man sieht an dieser Zeichnung, dass die äkunglinien wohl meistenteils parallel den Durchschnittslinien mit den Leucitoaeder (a: a:  $\frac{1}{2}$  a), wie 3. B. die Linien Im und mn, doch auch zuweilen parallel den Durchschnittslinien mit dem Triakisoktaeder (a:  $\frac{1}{2}$  a:  $\frac{1}{2}$  a), wie die Linien und ww gehen.

Figur 2 — Eine Hexaederfläche des Meteoreisens, in welcher die Richtungen angegeben sind nach welchen die Fläche nach der ähung gestreift erscheint.

Figur 3 — Ein Stück Eisen von Braunau des Berl. Museums etwas vergrößert gezeichnet, an welchem zwei Spaltungsflächen Aund C, und eine Schnittsläche D sich befinden, welche letztere ungefähr einer Dodekaedersläche parallel geht. Die Rückseite ist von natürlicher Oberfläche begrenzt. Die Flächen ACD sind geätzt, und dadurch die kleinen Rhabditkristalle sichtbar gemacht, deren ganz bestimmte Lage in Bezug auf die Hexaederslächen teils durch kleine Striche teils durch Punkte, je nachdem die Kristalle parallel einer Hexaedersläche liegen oder rechtwinklig auf ihr stehen, angegeben

ist, die aber sonst hier nur willkürlich eingezeichnet sind, und daher die Menge und Gruppierung derselben wie sie in der Wirklichkeit stattfindet nicht angeben.

Figur 4 — Ein kleines Stück des Eisens von Braunau auf dem Berliner Museum in natürlicher Größe, an welchem 3 Flächen A, B, C möglichst genau parallel den Spaltungsflächen angeschlissen und sodann geäßt sind.

Figur 5 — Eine Stelle von einem Hausenblasenabdruck der Fläche C, Fig. 4, unter dem Mikroskop, an welcher man die äkunglinien und Rhabditkriskalle sieht.

Figur 6 — Eine Stelle von einem Hausenblasenabdruck einer ähnlichen geaßten Fläche des Eisens von Seeläsgen, wie sie Fig. 4, Tas. 2 dargestellt ist. Die Rhabditkristalle sind untereinander unsgefähr rechtwinklig, der Schnitt des Eisens muss an dieser Stelle also ungefähr parallel einer Spaltungssläche gehen. Die Rhabditkristalle der einen Lage sind sämtlich zufällig grösser als die der andern. Un den Durchschnitten der auf den Spaltungsslächen rechtwinklig stehenden Kristalle, sieht man, dass die Querschnitte rechtwinklig, aber ihre Seiten an dieser Stelle noch immer, wenn auch zuweislen, den Heraederslächen parallel sind, die auf der Schnittsläche rechtwinklig stehen. In der Mitte ein Einschluss.

Figur 7 — Die Stelle Fig. 6 mit ihrer Umgebung in natürlischer Größe.

Figur 8 — Eine Stelle eines Hausenblasenabdrucks von einer anderen geäßten Schnittfläche des Eisens von Seeläsgen als die, worauf sich Fig. 6 bezieht.

Figur 9 — Eine Stelle eines Hausenblasenabdrucks der geätzten

Schnittfläche D Fig. 3 des Eisens von Braunau. Man sieht die Längsschnitte der Rhabditkristalle, die der Kante von D und C parallel liegen; sie sind hier an den Enden aber anders begrenzt als die Rhabditkristalle bei dem Eisen von Seeläsgen Fig. 6.

Figur 10 — Eine der wasserhellen Stellen der Olivinplatete Fig. 11 vergrößert; man sieht die geradlinigen, untereinander parallelen, haarförmigen Einschlüsse des Olivins.

Figur 11 — Eine kleine Platte in natürlicher Größe, die auf einem Olivinkristall auf dem Pallas-Eisen geschnitten und mit vielen braun gefärbten Klüften durchsetzt ist, so dass nur wenig Stellen wasserhell geblieben sind.

Figur 12 — Die haarförmigen Einschlüsse von Fig. 10 einer andern kleinen Olivinplatte von der Schnittfläche des Kristalls schief durchschnitten, noch mehr vergrößert.

#### 5.2 **Tafel** 2

Figur 1 — Eine geäßte Schnittfläche des Meteoreisens von Zacatecas in natürlicher Größe.

Figur 2 und Figur 3 — Die in diesem Eisen vorkommenden Schreibersitkristalle, wie sie an den Stellen a und b von einem Hausenblasenabdruck der Schnittsläche Fig. 1 unter dem Mikroskop erscheinen.

Figur 4 — Geätte Schnittfläche des Meteoreisens von Seeläsgen.

Figur 5 — Durchschnitt von einer Troilitpartie in dem Mesteoreisen von Seeläsgen; sie ist zunächst von einer Hülle von Tänit

(?) und dann von den Zusammensetzungsstücken des Meteoreisens umgeben.

Figur 6 — Eine geätzte Platte des Meteoreisens von Bohumilit in natürlicher Größe.

Figur 7 — Hausenblasenabdruck der mit a, b, c, d, e, f, g bezeichneten Stellen von Fig. 6 bei geringer Vergrößerung; c, d, e, f, g sind die Schalen des Meteoreisens mit ihren äßelinien und eingeschlossenen Rhabditkristallen, welche beide aber nur unvollsständig wiedergegeben sind; a und b die von ihnen eingeschlossenen Räume mit den Tänitblättern, h ein anderer Einschluss.

Figur 8 — Der Einschluss h von Fig. 7 noch mehr vergrößert. Er ist zu vergleichen mit dem Einschluss in dem Meteoreisen von Seeläsgen Fig. 6 Taf. 1.

Figur 9 — Schnittfläche des Chondrits von Siena; Teile von graulichschwarzer Farbe schneiden an anderen von lichte graulichsweißer Farbe scharf ab.

#### 5.3 **Eafel** 3

Figur 1, Figur 2, Figur 7—1 und 2 sind Stellen einer dünn geschlissenen Platte des Chondrits von Erzleben unter dem Mikrossey; Fig. 7 zeigt diese Platte in natürlicher Größe. a und b Fig. 1 und 2 sind ziemlich regelmäßig begrenzte Kristalle, wahrscheinslich Olivin, d in Fig. 1 wahrscheinlich Durchschnitte von Kugeln, n und die übrigen vertikal gestrichelten Parthien Nickeleisen, m und die horizontal gestrichelten Parthien Magnetkies, die schwarsen Parthien Chromeisenerz und die noch zu bestimmende schwarze

Substanz; c in Fig. 1 die schwarze Substanz, die nur in der Mitte etwas Nickeleisen enthält, welches auf der Nückseite die ganze Fläche von c einnimmt. Wo die durchsichtigen (Olivin») Rristalle an Nickeleisen, Magnetkies oder die schwarze Substanz angrenzen, sind sie meistenteils regelmäßig begrenzt, was man besonders bei a und b in Fig. 2 sehen kann.

Figur 3 — Der Kristall (Olivin) a von Fig. 1 stärker versgrößert; man erkennt nun darin mehrere Höhlungen, die eine Flüssigkeit mit einer Luftblase einschließen, wie dies auch bei tellusrischen Kristallen vorkommt.

Figur 4 — Der Kristall b von Fig. 1 stärker vergrößert; man sieht nun, dass die dunkle Färbund der Ränder dadurch entsteht, dass sich auf ihnen eine Menge schwarzer Körner befinden.

Figur 5 — Die kleine Rugel bei a von Fig. 7, wie Fig. 1 und 2 vergrößert; man sieht die grauen Streifen in ihr, die ebenfalls eine große Wenge von kleinen schwarzen Körnern enthalten.

Figur 6 — Ein Teil dieser Rugel noch stärker und wie 3 und 4 vergrößert; die schwarzen Körner in den grauen Streifen sind noch deutlicher.

Figur 8 — Durchschnitt einer Rugel in einer dünngeschliffenen Platte des Chondrits von Rl. Wenden; die Rugel ist von andes rer Art als die Fig. 5, viel durchsichtiger und mit einer Menge schwarzer untereinander ziemlich paralleler Quersprünge durchsett, wahrscheinlich ein unvollkommen ausgebildeter Olivinkristall. Etwas Nickeleisen ist in ihr eingewachsen.

Figur 9 — Meteoreisen vom Cap der guten Hoffnung, mit zwei fast unter rechtem Winkel zusammenstoßenden Schnittslächen,

die geäßt sind, in natürlicher Größe. Man sieht hellere und dunklese breite Streifen sich gerader Richtung über die Flächen hinziehen. Bei B, D, G finden sich Rostflecken; in dem hellen Streifen bei g ist ein regelmäßig begrenzter Troilitkristall, bei A sind Schreiberssit oder Rhabditkristalle eingewachsen; kleinere dergleichen Kristalle sinden sich auf der übrigen Fläche hier und da und glänzen bei bestimmter Beleuchtung.

Figur 10 — Die Fläche AC von Fig. 9 in anderer Lage, bei welcher nun die dunklen Streifen hell und die hellen dunkel erscheinen.

Figur 11 — Stelle an der Grenze der Streifen g und h von dem Hausenblasenabdruck der Fläche AC Fig. 9. Die Fläche erscheint mit seinen Körnern bedeckt, die in dem Streisen h rund, in dem Streisen g mit andern gemengt sind, die in die Länge gezogen erscheinen.

Figur 12 — Stelle von einer dünngeschlissenen Platte des Chonstrits von Chantonnan in ebenso starker Vergrößerung, wie die Fig. 3 und 4. Sie zeigt eine Gruppe durchsichtiger (Olivins) Rristalle, die fast ganz von der schwarzen Substanz umgeben, und daher fast ganz regelmäßig begrenzt sind, und feine untereinander parallele haarförmige Einschlüsse haben, wie die Olivinkristall in dem Pallasseisen.

#### 5.4 **Eafel** 4

Figur 1 — Olivinkristall auf dem Pallas-Eisen; er ist fast vollskändig bis auf die Zusammensetzungsfläche d, in welcher er sich

mit einem andern Kristalle begrenzt hatte, ist aber fast vollkommen abgerundet bis auf einzelne Flächen, die sich nicht in Kanten schneiden, und daher auch runde Umrisse haben. Die vorhandenen Flächen liegen merkwürdiger Weise alle in einer Zone, in der Zone der Längsprismen, die auf diese Weise recht vollskändig ausgebildet ist.

Figur 2 — Röhrenartige Einschlüsse von verschiedenem Ansehen, wie sie in dem Olivin des Pallas-Eisen vorkommen, noch mehr vergrößert als in Fig. 10 Tafel 1, wo sie in ihrer natürlichen Lage gezeichnet sind.

Figur 3 und Figur 4 — Olivinkristall auf dem Chondrit von Stauropol.

Figur 5 — Ruglige Zusammenhäufung von Olivinkristallen in demselben Chondrit.

Figur 6 und Figur 7 — Rugeln auf diesem Chondrit.

Figur 8— Eine Rugel in dem Chondrit von Rrasnoi-Ugol, neben welcher sich rechts eine kleinere Rugel, die wahrscheinlich ein kugliger Olivinkriskall ist, befindet.

Figur 9 — Zusammenhäufung von Rugeln in demselben Chonstrit.

Figur 10 — Rugliger Olivin auf dem Chondrit von Timochin.

## 6 Abbildungen.







