Die Meteorite und ihre Organismen

Prof. Dr. Hermann Karsten

In Schaffhausen, mit Abbildungen (Separatabbruck aus der Zeitschrift Die Natur, Jahrgang 1881, Nr. 14, 15, 16.)

> Halle [Preußen 1881] Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei

Internet Archive Online Edition Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

Inhaltsverzeichnis

2	Mhhilamagn	70
I	Die Meteorite und ihre Organismen	4

1 Die Meteorite und ihre Organismen

Welche von allen Raturerscheinungen ist von dem Menschen länger und häufiger nicht nur bewundert, sondern auch gefürchtet worden, als die sporadisch austretenden Meteore: die von Blis und Donner begleiteten Gewitter und die meistenf lautlos und geheimnisvoll dahinziehenden Rometen und Leuchtkugeln? Welche von allen, einem Jeden auffallenden ungewöhnlichen Erscheinungen ist bis auf unsere Tage unerklärlicher geblieben, als diese Rometen und Meteorite, welche Lettere in seltensten Fällen sich als Feuerkugeln der Erde nähern und selbst mit donnerndem Prasseln auf sie berabstürzen? Man findet dann diese Steine als eckiqe etwas geglättete Bruchstücke, mit einer dünnen dunklen Rinde bedeckt; wie ef scheint, eine durch Schmelzung der inneren, unverändert geblies benen Masse erzeugte Rinde, durch die Erhitzung hervorgebracht, die der Stein durch die Reibung gegen die Atmosphäre erfährt, die er in größter Geschwindigkeit durchschneidet. Diese Reibung während ihres Durchganges durch die Atmosphäre macht die Steis ne glühend und leuchtend. Die in den verschiedensten Größen auf die Erde herabgefallenen sind von vielen Rubikfuß Inhalt und über 1000 Zentner schwer, bis zu Bohnengröße, z. T. selbst in Form von Sand beobachtet worden.

Vor einiger Zeit gab ich Bericht in diesen Blättern über kleisne, erst kürzlich auf Menschen oder in deren unmittelbare Nähe herabgefallene glühende Steinchen, welche zur Klasse der Meteorssteine gehörten: hier bei Schasshausen wurde ein Mann auf freiem Felde durch den Arm geschossen, unter Umständen, die nur auf

einen Meteorsteine als Geschoss deuteten. Der in Frankreich im vorigen Jahre beobachtete Fall, wo ein Bauer auf dem Felde einen Stein neben sich herabfallen sah, ihn einem Museum verkaufte und deshalb in einen Prozess verwickelt wurde, ist noch in Aller Erinnerung. Dies waren verhältnismäßig unbedeutende, wenn auch wegen sicherer Kenntnis interessante Erscheinungen. Viele andere unendlich großartigere werden in den Annalen der Naturgeschichte ausgezählt. Ein 1810 bei Shahabad in Hindostan niedergefallener Steinregen tötete Menschen und enkundete Gebäude. In der Nacht vom 4. Sept. 1511 fielen in Oberitalien Hunderte von Steinen; zentnerschwere Stücke wurden von den Bauern nach Mailand gebracht; ein Mönch verlor durch diesen Steinregen das Leben, auch Tiere wurden in Menge getötet. Schon die Jahrbücher der Chinesen berichten seit Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung über zahlreiche Fälle leuchtender Meteore, welche zur Erde fielen. Im Jahre 616 vor Christus erschien nach ihnen eine Feuerkugel am Himmel, auf der nach einer Explosion Steine zur Erde fielen, die 10 Menschen töteten und einen Wagen zerschmetterten. Ebenso erwähnen griechische und römische Schriftsteller der Steinregen. Selbst das dristliche Mittelalter, das nur mit dem Schöpfer und den Seinigen, nicht mit der Schöpfung sich beschäftigen durste, ließ diese merkwürdigen Himmelserscheinungen nicht ganz unbeachtet. Zahlreiche in der Neuzeit sich vermehrende Beobachtungen von Meteoriten, die sich zur Erde herabsenkten, wurden verzeichnet; Resselmener führt in seiner der Senkenbergischen Gesellschaft 1860 übergebenen Abhandlung über den Ursprung der Meteorsteinfälle 647 Meteor-Eisen und Steinfälle von mehr oder minderer Zuverlässigkeit auf. Viele Steine, deren Herabfallen im glühenden Zustande beobachtet worden war, wurden gesammelt, geprüft und ausbewahrt; Gesteine, die z. T. als Metalle, z. T. als Mischunsen dieser mit Gesteinen, selbst mit Kohle und anderen organischen Elementen erkannt wurden.

Die eigentliche Natur und Entwicklungsgeschichte dieser Körper, ihre Entstehung, ihr Verhältnis zur Erde und zu anderen Körpern des Weltalls blieb jedoch in ein, wie schien, undurchdringliches Dunstel gehüllt.

Den ersten Versuch, für die Tatsache der alf "Feuerkugeln" zur Erde gefallenen "von den Göttern gesendeten, Drakel spendenden Batylien," der Aërolithen, Meteor- oder Luftsteine eine Erklärung zu finden, unternahmen die französischen Physiker [Jean-André] Deluc. Dieselben versuchten es, sie als Auswürflinge der Bulkane unserer Erde nachzuweisen, weil, wie in der Sat, dir Busammensekung mancher Meteorsteine mit derjenigen vieler vultanischen Gesteine und Aufflüsse übereinkomme, wenigstens denselben höchst ähnlich sei. Dieser Erklärungsversuch scheiterte an der bald durch Rechnung nachgewiesenen unzureichenden Wurftraft unserer Bulkane für so gewaltige Meteorsteinmassen, wie sie sich auf der Erdoberfläche finden. Im Staate Oregon in Nordamerika liegt unter 40°35' am Stillen Dzeane ein Meteoreisenblock, dessen über den Boden vorragender Teil von Dr. [John] Evans, der ein Stückhen davon mitnahm, auf 10000 kilo geschätzt wurde. Der berühmteste von [Peter Simon] Pallas auf Sibirien mitgebrachte Block von Meteoreisen — berühmt weil er [Ernst] Chladni veranlasste, die heute giltige Theorie über die Natur der Meteorsteine

außusprechen — wog 688 kilo. — [Karl Ludwig von] Reichensbach schätzt das Gewicht der jährlich auf die Erde herabfallenden Meteorsteinmassen auf 4500 Ztr.

Auch die von [Heinrich Wilhelm Matthiaf] Olberf 1795 geäußerte Idee, diese Meteorolithe seien nicht Auswürslinge der Vulkane der Erde, sondern derjenigen der Mondes, eine Idee, die auch [Pierre-Simon] Laplace für annehmbar hielt und die darauf von vielen Mathematikern durch Rechnung, als der Möglichseit nicht widerstreitend, bestätigt wurde: musste dennoch der Überlegung weichen, dass das Zusammentressen aller der notwendigen, günstigen Rombinationen in der Stellung der Erde zum Monde, damit ein von diesem mit Anfangsgeschwindigkeit von etwa 2300 Mtr. in der Sekunde, emporgeschleuderter Körper zur Erde gelange, viel zu selten eintresse, um die zahlreichen Meteorsteine zu erklären.

Auch die von anderen Forschern ausgesprochene Meinung, die Meteorsteine seien Erzeugnisse der Atmosphäre, oder Rongregate von Atmosphärilien, die dem festen Erdförper entstammten, konnte nicht vereinigt werden mit der großen, für manche Leuchtkugeln bis auf 40 Meilen berechneten Entsernung, aus der die Meteorolithe auf die Erde herabstürzen, und mit der außerordentlichen Verdünnung der Atmosphäre schon in einer Höhe von 10 Meilen, wo seste Rörper unmöglich sich schwebend erhalten und bis zu so schweren Massen ansammeln könnten, wie sie hin und wider auf die Erde herabsallen.

Es blieb daher, als die annehmbare Hypothese, nur die 1819 von Chladni aufgestellte übrig, diesen leuchtenden Meteoren und glühend zur Erde kommenden Meteorsteinen eine meteorische Natur abzusprechen und sie, allen übrigen Gestirnen gleich, für kosmische Rörper zu erklären, und zwar für wahrscheinliche Bruchstücke eines zertrümmerten größeren Planeten, oder für selbständige planetare Rörper, deren Bahnen sich der Erdbahn, oder der Erde selbst, so sehr näherten, dass die bei ihrer relativen Rleinheit der Anziehungstraft der Erde folgen und sich mit derselben vereinigen mussten. Aus diese Idee hatte wohl die Entdedung der 4 kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter in jener Zeit von 1801 bis 1807 durch [Giuseppe] Piazzi, Olbers und [Karl Ludwig] Harding geführt, welche gleichfalls damals mit Olbers für Zertrümmerungsprodutste eines größeren, an ihrer Stelle früher eine Mittelstraße ihrer Bahnen wandelnden Planeten gehalten wurden.

Schon Chladni vermutete einen Zusammenhang von Meteoriten und Sternschnuppen mit den Kometen; eine Idee, die wie meistens neue Ideen auf heftigen Widerspruch stieß, jedoch nach 50 Jahren eine Kräftige Stüße, wie es scheint eine Bestätigung, fand in den Berechnungen der Bahnen einiger Sternschnuppenschwärme durch [Giovanni] Schiaparelli.

Zwar während des ganzen Jahres sieht man Sternschnuppen als vereinzelte, rasch bewegliche Lichtpunkte die parallelen Bahnen der stetig und monoton am Firmament vorüberziehenden Firsterne durchschneiden, aber zu gewissen Zeiten erscheinen sie dem übersraschten Auge in größerer Menge, in ganzen Schwärmen. Diese Zeiten bilden Perioden, die für den am 12. November erscheinenden dichten Schwarm nach H. A. [Hubert Anson] Newton's Unterstuding eine Länge von 33 Jahren umfassen, nach deren Verlause

derselben am glänzendsten und zahlreichsten wiederkehrt, fast einem Lichtfunkenregen gleich sich den staunenden Erdbewohnern zeigt.

Weniger zahlreich, aber in seiner jährlichen Rücksehr gleichmäßisger, erscheint am 10. August der, von der Legende als "die seurigen Tränen des heil. Laurentius" bezeichnete, aus dem Sternbild des Perseus sich entwickelnde sog. Perseidenschwarm, wogegen der Novemberschwarm, der dem Sternbild des Löwen entquillt, Schwarm der Leoniden von den Astronomen genannt wird. Auch die Nächte vom 18–20. April, vom 26–30. Juni, vom 9–11. Dezember sind durch größere Häusigseit von Sternschnuppen ausgezeichnet.

Schiaparelli hat nun die glänzende Entdeckung gemacht, dass die Bahnen gewisser Rometen mit denen der bezeichneten Sternschnuppenschwärme zusammenfallen; eine Wahrnehmung, die bald von anderen Astronomen bestätigt wurde und die der Chladni'schen Suppothese über die kosmische Natur der Meteorsteine höchst ungünstig ist. Denn es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass die kleinen leuchtenden Rörper, welche uns an den bezeichneten Tagen als Sternschnuppenpegen erscheinen, dem Schweise des der Erdbahn nahe vorübergepogenen oder sie durchkreuzenden Rometen angehören, und es schweise demnach wohl annehmbar, dass einzelne den Erdbörper nahe streipfende Teile dieses Rometenschweis von ihrer Bahn abgelenkt, und der Erdanziehung folgend, als Meteorsteine gebende Leuchtkugeln auf die Erde gelangen können, so wie Chladni es vermutete.

Vor Erfindung des Teleskope durch [Galileo] Galilei kamen nur die größeren Rometen zur Kenntnis des Menschen, die sich der Erde einigermaßen nähern. Auch noch heute werden die Meisten, wegen ihrer Entsernung von der Erde oder weil sie den beobachten» den Astronomen nicht zur günstigen Zeit erscheinen, nicht gesehen. In neuerer Zeit sind mit den lichtstärkeren Telestopen so zahlreiche Rometen entdeckt worden, dass man annehmen darf, ihre Zahl bestrage viele Tausende und dass Repler Necht hatte, wenn er sagte, die Zahl der Rometen im Weltraume sei größer, als die Zahl der Fische im Meere. Vielleicht täglich nähert sich einer oder der andere der Rometen unserer Erde so weit, dass Teile seines ost 20 Millionen Meilen langen Schweise uns bei Nacht als sporadische Sternschnuppen erscheinen. Ebenso fallen wohl zu allen Zeiten Meteorsteine auf die Erde herab, von denen aber nur die allerswenigsten von zivilisierten Menschen gesehen und beachtet werden, daher nicht zur allgemeinen Renntnis gelangen.

Die Meteorsteine wären demnach, auch nach den Ergebnissen der neuesten astronomischen Forschung, Teile fremder Himmelskörper, und zwar Teile irgend eines Kometen, und das Studium der Natur dieser Steine würde uns demnach das tresslichste Mittel geben, die Zusammensetzung der Masse jener Himmelskörper kennen zu lernen. Dieses Studium, welches mit allen, der heutigen Chemie zu Gebote stehenden Mitteln ausgeführt wurde, hat nun, wie oben angedeutet, ergeben, dass diese Meteorolithe aus den gleichen Stossen zusammengesetz sind, wie unsere Erde.

Die Forschungen der Astronomie über die physikalischen Eigenschaften der Rometen schienen darauf hinzudeuten, dieselben seisen gleichsam in der Ronsolidation begriffene Himmelskörper, sie beständen auf einem glühend flüssigen oder dampsförmigen Rerne und einer erstarrten Hülle, einem Mantel, welcher in Form kleisner, sester, weit von einander entsernter Rörperchen den Umkreis

und den langen leuchtenden Schweif derselben bilde: Rörperchen, die als Sternschnuppenschwärme von der Erde auf oft noch gesehen werden, nachdem der Hauptkörper des Rometen längst vorübersog. Die Entsernung der den Schweif bildenden Rörperchen von einander müsste eine sehr beträchtliche sein, da man durch eine solche die Dicke eines Rometenschweif bildende Masse von mehr als 2000 Meilen Ausdehnung hindurch, noch die kleinsten Sterne ohene Lichtverlusst hindurchschimmern sieht. Bei ihrer außerordentlichen Entsernung von dem Rerne des Rometen könnten diese Nachzügler dann wohl der Schwerkraft folgen und auf die Erde als Meteorssteine herabstürzen.

Die mikroskopische Forschung entdeckte in diesen Steinen ein Gemenge fristallinisch förniger Metall- und Mineral-Rörper, vor Allem Eisen in Verbindung und Mengung mit Nickel, Robalt, Titan, Rupfer, Zinn, Kiesel, Magnesium und anderen Stoffen. Manche Aërolithe bestehen fast gänzlich auf metallischen Eisen und seinen Metalllegierungen, andere fast nur auf nicht metallischen Mineralförpern. Je nachdem die Eisenlegierungen die Hauptmasse bilden, mehr oder minder zusammenhängend oder in Körnern eis nem auf Quarz und Rieselverbindungen (sehr häufig auf Bronzit, Dlivin und Augit) bestehenden Gemenge eingelagert oder letteres mit Meteoreisenkörnchen mehr oder minder gleichförmig gemengt erscheint, werden sie Vallasite oder Mesosiderite genannt. Eine dritte Rlasse, die am häufigsten fallenden Meteorsteine, bestehen auf einer helleren oder dunkleren Grundmasse, welche gebildet wird aus einem Gemenge von Körnchen von Meteoreisen, Magnetkief, Chromeisen, Titanit, Olivin, Augit, Bronzit, Anorthit, Quarz sc., in welcher

Masse sich auf's Zahlreichste eingelagert finden kleinere oder größere helle kugelige oder birnenförmige Rügelchen, $\chi o \nu \delta \rho o \iota$ [chondroi], scheinbare Rristalldrusen von Rieselverbindungen, Bronzit oder Enstatit genannt. Diese mineralogisch schwierig zu charakterissierenden, in chemischer Beziehung sehr variablen Steine werden Chondrite genannt. Zuweilen sind diese Chondrite ganz schwarz und in ihnen wurden amorphe Rohle und bituminöse Stosse als wahrscheinliche Zersebungsprodukte organischer Berbindungen wahrsgenommen, über deren Natur keine Vermutung gewonnen werden konnte.

Über diese Chondrite mit ihren mannigfachen undefinierbaren Einschlüssen sind nun nicht nur Vermutungen, sondern Ergebnisse mühevollster Forschung, enthalten in einem Spoche machenden Werste: Die Meteorite (Chondrite) und ihre Organismen von Or. Otto Hahn," welches fürzlich die Laupp'sche Presse in Tübingen verließ und die Ansicht über die Natur der Meteorsteine in ein neues ganz unerwartetes Licht stellt.

Viele meiner Leser werden sich der von dem selben Verfasser 1879 verössentlichten Mitteilung über Die Urzelle d. h. über die einfachsten organisserten Körper erinnern, welche derselbe in kristallinischen Gesteinen entdeckte. Wer hat dieses Vuch gelesen und nicht, ungeachtet seiner zahlreichen Darstellungen der in jenen Urgesteinen gesehenen Pflanzen, gewisse Zweisel gehegt! Selbst in Meteorsteinen nen sollten Organismen, sollten pflanzliche Gebilde zu erkennen sein. Pflanzen, deren eine, den Algen und Farn verwandt, zu Ehren des deutschen Kaisers als Urania Guilielmi beschrieben und auf der 17. Tasel abgebildet wurde.

Ungeachtet mancher Widersprüche gegen diese seine Entdeckung, hat nun der seiner guten Sache bewusste Autor dieser beiden jest uns vorliegenden Abhandlungen sich nicht abhalten lassen, seine Entdeckung weiter zu verfolgen. Hunderte von Dünnschlissen mussten angesertigt, auf das Sorgfältigste geprüft und mit einander verglichen werden, um das früher gewonnene Resultat zu bestätigen und dahin zu erweitern, dass manche Meteorite — und zwar nennt Hahn in der vorliegenden Schrift 18 verschiedene, von ihm unterssuchte Meteorsteine auf der Reihe der Chondriten, deren Fallzeit genau besannt ist — fast gänzlich aus einem Gemenge von Orgasnismen bestehen. So ist es also auch hier das Mikrostop, welches, wie schon [Friedrich August von] Quenstedt (Handbuch der Minestalogie S. 722) es vorhersagte, das Rätsel der Zusammensebung der Meteorsteine lösen musste.

Hahn gibt in seinen Beschreibungen der Organismen, welche er in den 18 von ihm untersuchten, auf den verschiedensten Gegenden der Erde stammenden Meteorsteinen ausfand, solche auf der Rlasse der Schwämme, Radelschwämme, Rorallen und Crinoiden, indem er zu dem Resultate kommt, dass die vermeintlichen Enstatite, Bronzite u. a. Rügelchen dieser Chondrit-Meteorsteine nichts anderes sind als Organismen, deren Gewebe, gleich Rorallen und Crinoiden, muschel und schneckenschalig Mollusten sc. mit unorganischen Substanzen sich aus schöste verband, so zu sagen mikroskopisch kleine Riesel und Ralk-Rorallenstöcke, Schwämme sc., welche Rügelchen nun die Hauptmasse des Gesteines bilden. Hahn meint gesunden zu haben, dass sowohl Individuen einer und derselben organischen Art dieser Chondrite aus verschiedenartiger Mineralsubstanz bestehen,

bald der Zusammensetzung des Enstatites, bald der des Bronzites ähnlich: als auch umgekehrt, dass eine und dieselbe Mineralsubstanz von den verschiedensten in dem Meteorsteine vorkommenden Organismen assimiliert worden sei und zum Ausbau ihres Körpers gedient habe.

Ubrigens dürste auf die Eigenschaft, dass das Vegetations Zentrum das scheinbare "Rristallisation-Zentrum" bei diesen Rörperchen stets erzentrisch liegt, als Unterscheidungsmerkmal von wirklichen Kristalldrusen nicht allzugroßes Gewicht gelegt werden. Denn auch in Kristalldrusen liegt der Kristallisationsansang häufig erzentrisch, und zwar ganz am Rande, wenn die Drusen sich sehr früh auf einen festen Körper niederließen, etwas weniger erzentrisch, wenn dieses Festsenen später geschah; ganz zentrisch liegt der Rristallisationsansang der Drusen nur, wenn sich dieser schwimmend in einer Flüssigkeit bildete, wie ef z. B. häufig bei organischen Substanzen vorkommt, weshalb auch die Dolithkügelchen als in einer Quelle, einem Sprudel, gebildet zu betrachten sind. Dass indessen die Entdeckung von Organismen in den seither für Gläser (!!) oder Kristallisationen gehaltenen Chondriten richtig ist, bleibt für den zweifellos, der mit den nötigen Vorkenntnissen versehen sich mit der Untersuchung dieser Aërolithe beschäftigte.

Eine vorzügliche, höchst genaue physikalische Beschreibung dieser Chondrite gibt [Karl Wilhelm von] Gümbel in seiner lehrreichen Abhandlung: "Über die in Bayern gefundenen Steinmeteoriten" (Sikungsberichte der mathematisch physikalischen Klasse der königl. bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München 1878), auf der einige Säke hier zitiert werden mögen, um den Standpunkt zu

kennzeichnen, den die Wissenschaft bis heute in dieser Frage einnahm.

"Überblickt man die Resultate der Untersuchung dieser wenn auch beschränkten Gruppe von Steinmeteoriten, so drängt sich die Wahrnehmung in den Vordergrund, dass sie, trotz einiger Verschiedenheit in der Natur ihrer Gemengteile, doch von vollskändig gleichen Strukturverhältnissen beherrscht sind. Alle sind unzweifelhafte Trümmergesteine, zusammengesetzt auf kleinen und größeren Mineralsplitterchen, auf den bekannten rundlichen Chondren, welche meist vollständig erhalten, aber oft auch in Stücke zersprungen vorkommen und auf Gräupchen von metallischen Substanzen, Meteoreisen, Schwefeleisen, Chromeisen bestehen. Alle diese Frage mente sind an einander geklebt, nicht durch eine Zwischensubstanz oder durch ein Bindemittel verkittet, wie sich überhaupt keine amorphen, glaf oder lavaartigen Beimengungen vorfinden. Rur die Schmelzrinde und die oft auf Klüften austretenden, der Schmelzrinde ähnlich entstandenen schwarzen Ueberrindungen bestehen auf amorpher Glasmasse, die aber erst beim Niederfallen innerhalb unserer Atmosphäre nachträglich entstanden ist. In dieser Schmelzrinde sind die schwerer schwelzbaren und größeren Mineralkörnchen meist noch ungeschmolzen eingebettet. Die Mineralsplitter tragen durchauf keine Spur einer Abrundung oder Abrollung an sich, sie find scharffantia und spikeckia. Was die Chondren anlangt, so ist ihre Oberflächenie geglättet, sie ist vielmehr stets höckerig uneben, maulbeerartig rauh und warzig oder facettenartig mit einem Ansat von Kristallflächen versehen. Beile derselben sind länglich, mit einer deutlichen Verjüngung oder Zuspitzung nach einer Richtung, wie es bei Hagelkörnern vorkommt. Dit begegnet man Stückhen,

welche offenbar als Teile zertrümmerter oder zersprungener Chondren gelten müssen. Als Ausnahme kommen zwillingsartig verbundene Rügelchen vor, häufig solche, in welchen Meteoreisenstücken eins oder angewachsen sind. Nach zahlreichen Dünnschliffen sind sie verschiedenartig zusammen gesett. Am häufigsten findet sich eine erzentrisch strahlig faserige Struktur in der Art, dass von einer weit aus der Mitte nach dem sich verjüngenden oder etwas zugespitzten Teile hin verrückten Punkte auf ein Strahlenbüschel gegen Außen sich verbreitet. Da die in den verschiedensten Richtungen geführten Schnitte immer fäulen- oder nadelförmige, nie blätter- oder lamellenartige Anordnung in der diesen Büschel bildenden Substanz erkennen lassen, so scheinen es in der Tat säulenförmig Fasern zu sein, auf welchen sich solche Chondren aufbauen. Bei gewissen Schnitten gewahrt man, dieser Annahme entsprechend, in den senkrecht zur Längenrichtung gehenden Querschnitten der Fasern nur unregelmäßig edige, fleinste Feldchen, als ob das Ganze auf lauter fleinen polyedrischen Rörnchen zusammengesett sei. Zuweilen sieht ef auf, alf ob in einem Rügelchen gleichsam mehrere nach verschiedener Richtung hin strahlende Systeme vorhanden wären, oder als ob gleichsam der Austrahlungspunkt sich während ihrer Bildung verändert habe, wodurch bei Durchschnitten nach gewissen Richtungen eine scheinbar wirre, stengliche Struktur zum Vorschein kommt. Gegen die Außenseite hin, gegen welche der Viereinigungspunkt des Strahlenbüschelf einseitig verschoben ist, zeigt sich die Faserstruktur meist undeutlich oder durch eine mehr förnige Aggregatbildung ersett. Bei keinem der zahlreichen angeschliffenen Chondren konnte ich beobachten, dass die Büschel so unmittelbar bis zum Rande verlasen,

als ob der Austrahlungspunkt gleichsam außerhalb des Rügelchens läge, sofern nur dasselbe vollständig erhalten und nicht etwa bloß ein zersprungenes Stück vorhanden war. Die zierlich guergegliederten Fäserchen verlasen meist nicht nach der ganzen Länge des Büschels in gleicher Weise, sondern sie spitzen sich allmälig zu, verästeln sich oder endigen, um andere an ihre Stelle treten zu lassen, so dass in dem Querschnitte eine mannigfache, maschenartige oder netförmige Zeichnung entsteht. Diese Fäserchen bestehen, wie dies schon vielfach im Vorausgehenden geschildert wurde, aus einem meist helleren Kerne und einer dunkleren Umhüllung, jener durch Säuren mehr oder weniger zerlegbar, lettere dagegen dieser Einwirkung widerstehend. Höchst merkwürdig sind die schalenförmigen Uberrindungen, welche auf Meteoreisen zu bestehen scheinen und in der Regel nur über einen Kleineren Teil der Kügelchen sich ausbreiten. Die gleichen einseitigen, im Durchschnitte mithin als bos genförmig gekrümmte Streischen sichtbare Überrindungen kommen auch im Innern der Chondren vor. — Doch nicht alle Chonds ren sind erzentrisch faseria; viele, namentlich die kleineren, besitzen eine feinkörnige Zusammensetzung, als beskänden sie auf einer zusammengeballten Staubmasse. Auch hierbei macht sich zuweilen die einseitige Ausbildung der Rügelchen durch eine erzentrisch größere Verdichtung der Staubteile bemerkbar. — Der gewöhnliche Typus der Meteorite von steiniger Beschaffenheit ist soweit überwiegend derjenige der sog. Chondrite, und die Zusammensekung sowie die Struktur aller dieser Steine so sehr übereinstimmend, dass wir den gemeinsamen Ursprung und die uranfängliche Zusammengehörigkeit aller dieser Art Meteorite — wenn nicht aller —

wohl nicht weiter in Zweifel ziehen können.

Der Umstand, dass die sämtlich in höchst unregelmäßig geforms ten Stückhen in unsere Atmosphäre gelangen — abgesehen von dem zerspringen innerhalb der letteren in mehrere Fragmente, was zwar häufig vorkommt, aber doch nicht in allen Fällen angenommen werden kann, namentlich nicht, wenn durch direkte Beobachtung das Fallen nur eines Stückes konstatiert ist, — lässt weiter schließen, daff sie bereits in regellos zertrümmerten Stücken als Abkömmlinge von einem einzigen größeren Himmelskörper ihre Bahnen im Himmelfraume ziehen und in ihrer Zerstreutheit einzeln zuweilen in den Attraktionsbereich der Erde geratend zur Erde niederfallen. Der Mangel ursprünglicher, lavaartiger, amorpher Bestandteis le, in Verbindung mit der äußeren unregelmäßigen Form, dürste von geo- oder kosmologischen Standpunkte aus die Annahme ausschließen, dass diese Meteorite Auswürfe von Mondvulkanen, wie vielfach behauptet wird, fein können. — Es scheinen daher die Meteorite auf einer Art erstem Verschlackungsprozess der Himmels förper, aber da sie metallisches Eisen enthalten — bei Mangel von Sauerstoff und Wasser hervorgegangen zu sein."

Unser Autor schließt sich diesem Urteil über die Aggregatsorm der Meteorite vollkommen an, jedoch mit dem Vorbehalte, dass, wie gesagt, jene kleinen kugeligsbirnenförmigen Körperchen, welche der hauptsächlichste Gemengteil der Steinmeteorolithe ausmachen, nicht Mineralindividuen sind, sondern nur Organisiertes, ebenso wie auch fast die gesamte mit Nissen und Sprüngen durchsetzte quarzisge Grundmasse. Im Gegensaße zu den von Gümbel beschriebenen Meteoriten sindet sich in dem von Knyahinya eine geringe quars

zige, zersprungene Zwischensubstanz. "Alles Leben" ein Urwald oder vielmehr ein Polypen», ein Spongienwald im Kleinen, ein Chaos von aufeinander gewachsenen Formen, den heutigen zum Verwechseln ähnlich, nur Alles unendlich kleiner.

Auf 32 photographischen Tafeln werden in 142 Abbildungen eine Unzahl der entdeckten Organismen abgebildet, neben anderen der irdischen Schöpfung, die zum Vergleiche herangezogen wurden. Leider hat sich unser Autor durch einen kritiklosen Kritiker verleiten lassen, seine in der Urzelle befolgte Methode des Selbstzeichnens aufzugeben und statt eigener Zeichnungen nur Photographien zur Erläuterung und Beglaubigung vorzulegen; Beides nebeneinans der würde den Leser mehr befriedigt haben! Denn so naturgetreu auch photographische Vilder einen bestimmten Zustand, eine bes stimmte Fläche, die gerade im Fokus des Mikroskops sich befindet, wiedergeben, falls Licht und Farbenverhältnisse günstig sind, so wes nig genügen sie einem Beobachter dem Zwecke, ein Bild dessen zu geben, was er in einem bestimmten Zustande des untersuchten Objektes für das Charakteristische hält, wozu häufig perspektivische Zeichnungen dessen, was derselbe durch Veränderung des Fokus (der Sehweite) erkennen konnte, nicht zu entbehren sind.

Die umstehende Zeichnung eines längsdurchschnittenen, drusensartigen Rügelchens ist von mir mit Hilfe eines in der Darstellung naturhistorischer, insbesondere mitrostopischer Gegenstände erfahrenen und geübten Rünstlers, des Herrn Professor [Friedrich Eduard] Wetzer hierselbst, mit größter Sorgsamkeit angesertigt worden. Nach reislichster Überlegung haben wir das, dem Objekte wirklich Eigentümliche von dem Zufälligen, d. h. von den äußerlich ads

härierenden, von dem durch Lichtbrechung verursachten Scheine zu sondern gesucht; es kam hierbei zunächst darauf an, nachzuweisen, dass das Objekt organisiert sei. Ich glaube, es wird uns besser und vollständiger gelungen sein, als dem Photographen, so vollendet auch dessen Vilder, dem Zustande der photographischen Technik entsprechend, von verschiedenen Exemplaren dieses Organismus auf Taf. 1, 8, 9, 10, 11, wiedergegeben sind. Das, ungeachtet der Zartheit des Schliffes, z. T. oberseits hie und dort das Objekt bedeckende Fremdartige, ferner Risse, die ich für zufällig, durch die Operation des Sägens und Schleifens hervorgebracht hielt, has ben wir nicht mitgezeichnet, um das komplizierte stark vergrößerte, dennoch minutiöse Bild nicht mit Nebensächlichem zu beladen. Vielleicht sind Strukturverhältnisse, die zu dem obliegenden Beweise hätten dienen können, dass das Objekt ein organisierter Körper ist, auf zu großer Vorsicht fortgelassen worden, z. B. hier und dort eine querlaufende schrägstehende Scheidewand in der einen ästigen Faser; wir hielten sie für gleichwertig mit anderen gleichlaufenden Linien, die uns zufällige Risse zu sein schienen. Mit einem Worte: das Bild gibt das, was ich dem Leser als von mir an dem Organismus beobachtet zeigen will, es soll eine lange schwer verständliche Beschreibung ersezen.

Dieser dargestellte Körper stammt aus einem bei Knyahinya in Ungarn am 9. Juni 1866 gefallenen Steinmeteore, welchef z. E., das heißt in einem 27 Pfd. schweren Stücke von dem Beobachter des Falles noch lauwarm ausgenommen, demselben einen 3 Tage ans haltenden, durchdringenden Knoblauchgeruch (Selen?) mitteilte. Der Stein kam mit Donnergenkrach aus einer Wolke als glühende

Rugel mit langem Schweife, auf welchem nach allen Seiten kleisnere herausfuhren. Ein großer $5^{1/2}$ Jentner schwerer Block war gleichzeitig 11' tief in den Voden einer Wiese eingedrungen.

Dieser Organismus ist von Hahn als Roralle bestimmt worden; er ist sehr ähnlich dem in den ältesten silurischen Schichten unserer Erdrinde vorkommenden Favosites, wie [Georg August] Goldfuß auf seinen Tafeln 26 und 27 diese Korallen abbildet; ebenso der von [Georg Amadeus Carl Friedrick] Raumann auf der ersten Tafel seines Handbuches gezeichneten silurischen Calamopora. Ich wählte diesen Körper zur Darstellung unter den zahllosen Bruchstücken von Geweben, — die in ihrer großzellis gen Struftur sich leicht als Pflanzengewebe zu erkennen gegeben haben würden, — weil er einen der Chondritenfügelchen bildet, denen die Mineralogen ihre besondere Aufmerksamkeit schenkten; Rügelchen, welche die chemische Analyse als eine Art Bronzit (Enstatit) nachwies, und die wegen ihrer Kristalldrüsenform und ihrer stenglichen Struftur mehr wie alle übrigen einem frisfallinischen Rörper gleichen. Das gezeichnete Individuum ist ein fast mittlerer Längenabschnitt einer jener birnenförmigen Körperchen; die oberen und unteren Teile sind weggeschlissen, die Ränder z. T. von dem als Grundmasse dienenden Eisenfilikate durchdrungen, im Übrigen ist der ganze Organismus durch und durch verkieselte oder in jene Enstatit genannte Rieselverbindung verändert. Er besteht auf fast geraden, schwach radialen, nach dem peripherischen Ende etwas erweiterten Röhren, die selten, wie in Figur 2, eine Verzweigung erkennen lassen, wie es scheint, ohne Scheidewände, wenigstens in den jüngeren Teilen; in den unteren engeren Enden vielleicht mit rechtwinkelig auf der Längenwand stehenden Scheidewänden. Einzelne Partien dieses Röhrenspstemes sind, mitten zwischen den fast parallelen, etwas gebogen und scheinen in eine verdünnte abgerundete Spize zu enden. Alle die Röhren sind, wie es mir schien, und wie in dem unter Fig. 1 bei b gezeichneten Stücken dargestellt, angefüllt mit einer Reihe kugeliger, dickwandiger Zellen, die in den älteren Teilen unmittelbar aneinander liegen, während in den jüngeren Enden die Röhrenhaut verhältnismäßig dicker zu sein scheint, wohl aber noch eine Längenhöhlung, ein Lumen, zu erkennen ist, in welchem in regelmäßigen Abständen kleine, dunkelumrandete Bläschen liegen, wie in a unter Figur 1 gezeichnet. Die Ubergangfformen zwischen diesen beiden Inhaltsanteilen der Röhren konnte ich nicht genau erkennen. Zwischen den Röhren befindet sich eine trübe dunkelgelbe bis braune Masse, in der aber gleichfalls eine Reihe von hellen Bläschen zu erkennen ist; vielleicht die Inhaltsbläschen darüber liegender, zum größten Teile weggeschlissener Röhren. Wie gesagt, bestimmte Hahn diesen Körper als Favosites, indem er diese scheinbaren Bläschen für durchschnittene Ranäle, sog. Knospenkanäle hält. In der Tat hat derselbe, abgesehen von der außerordentlichen Kleinheit, die größte Ahnlichkeit mit den Abbildungen oben genannter Korallen; ich halte dieselben, nach dem einen, mir zur Ansicht vorliegenden Exemplare, für eine farblose Fadenalge, für eine Hysterophyme, z. B. für Leptomis tus oder Leptothrix; ohne hinreichendes Material, wie es heute nur Sahn selbst zu Gebote steht, und wie es derselbe auf das Fleißigste benutte, wäre es aber ein zu gewagtes Unternehmen, eine von der seinigen abweichende Meinung aufstellen zu wollen.

Jedenfalls ist dieser Körper keine Druse nadelförmiger oder säulenförmiger Kristalle, wie bisher die Mineralogen meinten, sondern ein organisiertes Gebilde; denn wirkliche Kristalle, die aus verdunstenden oder abkühlenden Lösungen sich ausscheiden, sind strukturlos und homogen.

Von größtem Interesse für die Auftlärung der Natur dieser Organismen der Meteoriten sind höchst ähnliche von Paul. F. Reinsch fürzlich in der Steinkohle entdeckte Gebilde; eine Entdeschung, die zu meiner Kenntnis zu bringen der Herr Herausgeber die Güte hatte.

Rach Reinsch's Beobachtung bestehen einzelne Schichten der fächstischen Roble zu 20% auf solchen Organismen, ebenso wie die Chondriten-Meteorite zum größtem Teile auf ihnen zusammengesetzt sind. Auch die von Reinsch entdeckten Pflanzen sind höchst fleine, mitrostopische Gebilde, auch sie kommen in wenigen Formen, aber in größter Anzahl beisammen als Grundlage der betreffenden Rohlenflöze vor; z. T. bestehen sie, gleich dem in Figur 1 und Figur 2 gezeichneten Organismus, auf verästelten, mehr oder minder freie Zellen enthaltenden, konzentrischen Fasern. Reinsch hält sie für Algen und Pilze, etwa für Schleimpilze, indem auch er, gestütt auf vollgültige Gründe, ausdrücklich gegen unorganische Natur derselben protestiert. Auch darin stimmen diese Kohlenorganismen mit denen der Meteoriten, dass sie in ihren älteren Teilen vererzen (in Schwefelkief) oder verkieseln. Ich halte auch diese Organisationen der Steinkohle für Hysterophymen der die Rohle zusammensezenden absterbenden, verwesenden Vflanzen: für Systes rophymen, deren Natur und Entwickelung ich wiederholt — zuletzt in meiner Deutschen medizinischen Flora 1880 — beleuchtete; Drøganisationen, die jeder vorurteilstreie, sorgfältige Beobachter auf die von mir angegebene Beise aus pflanzlichen und tierischen Geswebezellen, als Metamorphosen derselben sich entwickeln sehen kann. In dem von Neinsch entdeckten Falle geschieht die nekrobiotische Metamorphose unter Wasser, in jenem von Hahn entdeckten in seuchtigkeitsschwangerer Atmosphäre; in beiden Fällen sind es die einsachen Zellenvermehrungssormen, wie sie und das Studium der Kontagien und Miasmen kennen lehrte und wie ich sie in meiner Fäulnis und Ansteckung 1872 darstellte.

Hahn fand nun ferner, dass alle von ihm untersuchten Steinsmeteorite, und nur über solche äußert er sich in dem vorliegenden Werke, die gleichen organisierten Geschöpfe enthalten. Ein Resulstat, welches schon die mineralogische Untersuchung in Bezug auf chemischsphysikalische Verhältnisse derselben erlangt hatte; und diese Tatsache führt ihn S. 44 zu dem Schulke: "alle diese Chondrite als Trümmer, welche nach der Zerstörung des Planeten freisten, bis sie glücklicherweise in den Fallkreis unserer Erde kamen."

Die Formen der bis jett in den Chondriten erkannten Geschöpfe gehören alle dem Wasser an; die ganze Masse dieser Meteorite scheint unter Wasser gewachsen zu sein, die zahllosen, mikrostopischen Orsganismen versteinerten entweder nachträglich oder, was die chemische Analyse der verschiedenen Körperchen wahrscheinlicher macht, jedes einzelne verband sich in seiner Weise mit den im Wasser gelösten Mineralsubstanzen, assimilierte dieselben, gleich den jett noch lesbenden Muscheln, Korallen, Bazillarien, Equiseten, verschiedenen Verbenazeen sc., deren Häute gleich den Knochen der Wirbelties

re verkieseln und verkalken. Schließlich wurden sie dann in dem Rücktande der eingetrockneten Rieselreichen Rährstoffslüssigkeit mit einander verkittet und als quarzige Masse in ein zusammenhängens des Gestein umgewandelt. Man sieht daher auch so zahllose kleinste durchscheinende und durchsichtige Organisationen — in diesem Mesteorsteine von Knyahinya wenigstens — übereinander gehäuft, dass dies die Erkennung der eigentlichen Form der meisten von ihnen sehr erschwert, dass selbst ihr Vorhandensein für diesenigen, welche mit den mikrostopischsorganischen Formen nicht vertraut sind, schwierig wahrzunehmen ist.

Den einzelnen organisierten Rügelchen und Gewebebruchstücken zwischengelagert, findet sich, wie gesagt, eine, wenn auch geringe, Rieselmasse und in dieser zerstreut sind größere und kleinere Splitter metallischen Eisens und Nickels, Titans oder Chrom-Eisens Verbindungen, die z. T., wie es scheint, in das Silikat übergehen und auch die Organismen hie und da teilweise durchtränken, z. T. aber, d. h. die metallischen Eisenlegierungen, in scharffantiger und unregelmäßig eckiger Form vorliegen. Die Entstehungsweise dieser metallischen Eisensplitterchen kann, wenn sie auf die vegetas tive Tätigkeit der Organismen bezogen wird, wie Hahn dies für naturgemäß hält, indem er sich dabei auf die von mir in dieser Nichtung gemachten Versuche und Beobachtungen stützt, eine doppelte sein: entweder kann das Metall durch die Sekrete derselben aus seinen Lösungen von Riesel- oder Chlor- oder Chrom- sc. Eisen reduziert und metallisch auf dieselben niedergeschlagen sein, wie dies aus Silber- und Quecksilbersalzen durch Vilzvegetationen geschieht; oder es ist, gleich den Erden und Alkalien, gleich

Natron, Kali, Kalt, Magnesia sc. von der assimilierenden Zellmembran aufgenommen und zur eigentlichen Konstitution derselben verwendet worden, indem diese Membran nach und nach immer höher basische Verbindungen formte und endlich ihre ursprünglis den organischen Elemente gänzlich ausgeschieden wurden¹, so dass, gleich reinen Magnesias oder Kalksalzen, reine Metalllegierungen übrig blieben. Die Organismen der Lettwelt geben uns bis jett nur die ersten Entwicklungsstufen dieser Metallverbindungen als Anhalts punkte für diese Theorie, wie ich deren in meiner auch von Hahn berücksichtigten Abhandlung über "Chemismus der Pflanzenzelle" niederlegte. Diese Organismen der Meteoriten lassen jedoch, durch die außerordentliche Kleinheit, in der sie meistens auftreten, auf möglicherweise andere, von den heutigen verschiedene physikalische Verhältnisse ihrer Entstehung schließen, vielleicht auf eine bedeutend höhere oder niedrigere Temperatur sc. Wie sich unter solchen uns unbekannten Verhältnissen nun die assimilierende Zellenmembran die unorganischen Elemente aneignet, das ist uns bis jett noch gänzlich unbekannt. Daff die Organismen bei höherer Temperatur, z. B. bei der des Siedepunktes des Wassers, in viel kleinerer Form weiter vegetieren und sich vermehren, das erwähnte ich schon in der genannten Abhandlung über "Chemismus der Pflanzenzelle". Inzwischen überzeugte ich mich nun, dass selbst bei noch höherer Temperatur, d. h. bei 150°, die Lebenstraft der pflanzlichen Drganisation nicht völlig erlischt, dass vielmehr die Inhaltsellchen einzelner Gewebezellen auch dann noch, wenn gleich spärlich sich entwickeln können, aber in ungewöhnlich zarter und kleiner Form.

¹Eine aufführliche Darstellung der assimilierenden, organisierenden Tätigkeit der lebendigen Zellmembran gab ich vor Kurzem (1880) in meiner Botanik S. 17 = 22.

Anderseits vermehren sich Organismen auch noch bei niedrigen, unster dem Gefrierpunkte liegenden Temperaturen, und auch dann in bedeutend geringerer Größe, als bei +30 bis 35° C. Dass sich Bakterien eine Stunde lang bei einer Temperatur von $>100^{\circ}$ C. lebend erhielten, wurde wiederholt beobachtet; könnte der Versuch lange genug fortgesetzt werden, so würde man vielleicht auch dann jenes Gesetzt der Formverkleinerung bestätigt sehen.

Jedenfalls fordert das vorliegende Buch von Hahn durch die alänzende Entdeckung einer in den Meteoriten zur Erde gebrachten neuen Welt von Organismen zur Revision vieler, uns schon als sidere Ergebnisse der Beobachtung und Berechnung erschienener Lehrsätze auf. Erkennen wir die so annehmbar erscheinende Vermutung, die Meteorite seien Teile von Kometen, als richtig an: so können die Rometen nicht glübend flüssige, am Umkreise nur erkaltete und in einzelne Bruchskücke getrennte Körper sein; denn diese Steinmeteore sind, vor dem Zusammentresen mit unserer Atmosphäre, nicht auf bedeutende Wärmegrade erhitzt gewesen, sie würden zu Glaf geschmolzen sein! Man erkennt aber nur eine geringe Einwirkung der Wärme — vielleicht, wie früher anges deutet, der Reibungswärme gegen die atmosphärische Luft während ihres Falles — auf der äußeren Oberfläche als wenige Linien dicke Rinde um jeden der herabgefallenen Steine. Diese Schmelzrinde bildet sich, wie es scheint, größtenteils erst nach dem häufig beobachteten und vernommenen Zerplaten der die Leuchtfugel formenden ganzen Masse: denn jedes einzelne so entstandene kantige Stück ist ringsum mit einer, wie es scheint gleich dicken Schmelzrinde umhüllt; diese entstand demnach erst in den unteren dichteren Regionen der Atmosphäre. Gehörten nun dennoch diese Meteorsteine ursprünglich einem Rometen an, so befindet sich dieser nicht in geschmolzenem seurigsflüssigen Zustande, sein Licht ist ein erborgtes, ein reslektiertes und seine Masse von solcher Beschaffenheit, dass sie durch die empfangene Wärme nicht zum Schmelzen oder auf eine Höhe erhitzt wurde, welche dass Leben von Organismen unmöglich machen würde. Der Idee Hahn's und der Neptunisten über die Entstehung unserer Erde würde es entsprechen, sich den Rern der Rometen nicht seurigsslüssig, sondern wässrigsslüssig, und seine in Stücken zersplitterte Rinde als Verdunstungsslinde zu denken. Denn wahrscheinlich war "der erste Ansang unseres und daher als ler Planeten eine organische Vildung (S. 40), — die Zell; sie erhält ihn, so lange noch ein Lichtstrahl die Erde trisst!" S. 50.

Aber auch an die oben schon berührte Idee des terrestrischen Ursprunges der Meteorsteine möchte wieder erinnert werden, an die historisch beglaubigten von Feuerkugeln und Meteorolithen bes gleiteten Staubregen; müssten nicht auch in diesem Falle diese Mesteorolithen zusammengeschmolzene Gläser sein, wenn diese Körper etwa erst in der Atmosphäre aus Passatstaub entstanden?

Nach der Anschauung Hahn's ist die ganze seste Masse der uns bestannten Himmelskörper das Produkt organisierender Tätigkeit; nach Hahn formen sich aus dem Chaos der Elemente zunächst Zellen, die sich neben sog. organischen Elementen (Rohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff) auch in größter Menge unorganische Elemente, d. h. Erden und Metalle aneignen und in ihre eigene Masse aufnehmen. Dieser energische, durch die ganze dampsförmige und flüssige Masse der sich formenden Himmelskörper verbreitete Vegetas

tionsprozess der Organismen könnte auch das von ihnen uns gesandte Licht hervorbringen, ähnlich, wie wir es von einigen leuchtenden Tieren, Pflanzen und Hysterophymen (Spaltpilzen) unserer Erste de kennen, das demnach dort stärker erglänzen würde, wo sich die dasselbe erzeugenden Organismen in größerer Menge beisammen finden.

Dass diese mit organisierten Körpern durchsetzten Meteoriten vor dem Zusammentressen mit unserer Atmosphäre keine Schmelztemperatur zu ertragen hatten, zeigt auch ihre mittelst des Mikroskops erkannte Struktur zweisellos. Demnach kamen sie in ungeschmolzenem kalten Zustande in unsere Atmosphäre; an einem anderen, uns unbekannten Orte in der Ferne gebildet, wie sie uns jest vorliegen.

Vielleicht ist auch die Idee des kosmischen Ursprunges, wenigstens sür diese Art von Meteoriten, zu verlassen und wieder auf deren Entstehung als Ronglomerate von Meteorstaub oder Passatstaub ähnlicher Materie zurückzugehen, wie sie schon von [Pieter van] Musschenbroek, Dominikus Tata, [Eugène Louis Melchior] Pastrin, [Ernst Friedrich] Wrede, Egen, v. Hof, Resselmener u. A. verteidigt wurde, obgleich das Entstehen eines solchen Ronglomerates mit unseren heutigen physikalischen Renntnissen und Erfahrungen noch nicht bis ins Einzelne versolgt werden kann.

Diese eben genannten Autoren, vorzüglich Resselmener, betrachsten die Leuchtkugeln und die auf diesen herabfallenden Meteorite als atmosphärische Sublimationsgebilde der von unseren Bulkanen ausgehauchten Mineral dämpse; und allerdings hat sich dem analysserenden Chemiker die Flüchtigkeit aller Mineralskosse zum großen Nachteile der quantitativen Analyse, bevor diese Eigenschaft sels

ter Körper hinreichend erkannt worden war, nur zu häufig in bedauerlicher Weise bemerkbar gemacht.

Uberdies kennt jeder Besucher tätiger Bulkane die interessante Erscheinung des kontinuierlichen Dampfes dieser zur Nachzeit oft leuchtenden Feuerberge. Mit dem Wasser zugleich, welches den größten Teil dieses Dampfes bildet, entquellen dem Krater auch beständig feste, pulverförmige oder dampsförmige Bestandteile des Gesteines, welches von den glübenden Wasserdämpfen durchzogen wird: pulverförmige Massen, sog. vulkanische Asche, denen sich zur Zeit der höchsten Tätigkeit mehr oder minder umfangreiche Gesteinsbruchstücke und geschmolzene Gesteine beimischen. Lettere fallen mehr oder minder bald zur Erde zurück, aber die staubförmigen Anteile werden mit dem Wasserdämpfe bis zu erstaunlicher Höhe mitgerissen, um sich in den oberen Regionen der Atmosphäre zu verteilen. Mit großem Genuss betrachtete ich das anziehende Schauspiel, welches mir in den Kordilleren der Puracé gewährte durch die gegen 5000' hohe Dampffäule, welche in der ruhigen Atmosphäre senkrecht in die Söhe quoll, anfangs skürmisch auf dem Gipfelfrater hervorwirbelnd, dann nach und nach langsamer steigend, bis sie, in gewisser Höhe angelangt, sich waagrecht ausbreitete und eine Wolkenschicht bildete, die sich in den oberen Luftschichten an den Rändern wieder auflöste. Wie anderseits Staubmassen von der Oberfläche des Erdbodens senkrecht in die Söhe wirbeln, auch größere leichte Körper, trockene Blätter, Schmetterlingsflügel sc. mit sich führen bis zu Höhen, wo sie dem Auge entschwinden, sah ich besonders in den beißen Tiefebenen der Aeguatorialgegend zur Zeit der Jahreswende, wenn sich hie und dort leichte Wölkchen bilden,

deren wenig umfangreiche, auf den erhisten, trockenen Boden der abgebrannten Llanos geworfene Schatten, eine stellenweise geringe Abfühlung desselben bewirken, hinreichend, die Entstehung der aufstrebenden Luftwirbel zu veranlassen, welche mit dem Wölkchen vorwärtsschreitend die Ebenen abfegen und die leichten Staubteile derselben himmelwärts führen, bis sie dem Auge entschwinden. Wie große Massen auf diese Weise in den oberen Regionen der Atmosphäre angesammelt werden, um in oft sehr entfernten Gegenden sich wieder zu senken, das lehren die oben berührten Erscheinungen des Meteors und Passatstaubes, die das Mikroskop als Mischung organisierter und unorganisierter Körperchen nachwies. Dass die ors ganisierten noch lebensfähigen Anteile dieses Staubes, wenn derselbe sich in der Atmosphäre mit feuchten Luftschichten mischt, wieder erwas den und ihre Lebenfäußerungen, ihre Ussimilationstätigkeit fortsetzen können und werden, wie wir ja die Entstehung der Bakterien und ihre Verwandten kennen und wie sie in der feuchten Kammer des Mikroskopikers beobachtet werden kann, ist wohl nicht zu bezweifeln; bis wie weit aber die Gestaltungsprozesse dieser, in den lustigen kalten Söhen weitergetragenen, mitrostopischen Zellchen fortgeführt werden können, darüber haben wir bisher noch keine Ahnung, würden eine solche vielleicht auf den überraschenden Mitteilungen Hahn's schöpfen können, wäre uns nicht der Kondensations-Aft solder mit Abkömmlingen des Passatstaubes geschwängerten Wolken noch durchauf rätselhaft und wir deshalb im Zweifel, ob wir diese Erscheinungen in Zusammenhang bringen dürfen.

Dass ungeheure Massen, die sicher der Erdatmosphäre entstammen, sich in deren Bereich koaqulieren können, beweisen die Eismassen, die zuweilen auf die Erde herabfallen. Ich selbst beobachtete einmal einen Hagelschauer in Südbaiern, dessen Körner die Größe von Hühnereiern hatten, und diese waren nicht abgerundet, wie gewöhnliche Hagelkörner, sondern scharfkantige Stücke, wie es schien, Bruchstücke größerer Massen; eine Erscheinung, die auch Delcroß beobachtete. Diese scharffantigen Eisstücke erinnern dringend an das Bersten der Steinmeteorite in der Erdnähe. Im Jahre 1802 am 28. Mai fiel bei Puztemischel in Ungarn während eines Hagelwetters ein Eistlumpen zur Erde, der 3' Länge, 3' Breite und 2' Dichte hatte; sein Gewicht wurde auf 11 Ztr. geschätzt. L. v. Buch berichtet auf Heyne's Tracts historical and statistical on India von einer Eismasse, die bei Seringapatam in Indien fiel und die Größe eines Elefanten hatte, so dass sie, ungeachtet der großen Hite dieses Landes, eines Zeitraumes von 2 Tagen bedurfte, um geschmolzen zu werden. Diese Eismassen entstehen durch Gefrieren von Regenwolken in Folge der plötlich erkältenden Einwirkung heftiger trockener Luftströme. In solchen Hagelkornern wurden selbst Metallkerne beobachtet; so bei Mayo in Irland am 21. Juni 1821. Könnten vielleicht auch durch Aufeinandertreffen von verschiedenen mit Mineralgasen und Organismen geschwängerten Luftströmungen in den höchsten Regionen der Atmosphäre jene Chondritmassen sich foagulieren? Die am 14. Juli 1860 bei Dhurmsala in der Gegend von Lahore unter Explosion herabgefallenen Steine sollen, obgleich sie an der Oberfläche geschmolzen waren, dennoch so kalt gewesen sein, dass Personen, welche sie ausheben wollten, sie nicht in der Hand behalten konnten, weil sie vor Kälte ein Kriebeln in den Fingern bekamen. Brachten nun diese Steine die Kälte

des Weltraumes oder die Temperatur der oberen Erdatmosphäre zu den Menschen herab? Diese Wahrnehmung an den Meteoriten bei Dhurmsala erhielt fürzlich ein Seitenstück in dem von Thomas Carnalley im Vakuum bis auf $+180^{\circ}$ C. erhisten Eißplinder.

Schon manche Erscheinungen beim Fallen der Meteorsteine mas den ihre Natur als kosmische Körper zweifelhaft und erinnern an die dichten Wolfen von Vassatstaub, die sich hin und wieder in Europa und Asien als Massen von Millionen von Zentnern niederlassen und der Westküste Afrika's die Benennung "Nebelküste" dem benachbarten Dzeane die des Meeres der Finsternisse eintrus gen. Ehrenberg fand dergleichen Passatstaub auf Minertrümmern, organisierten Fragmenten von Lande und Sükwasserformen zusame mengesett. Sollte, trot aller Zweifel der Physiker, dennoch ein Teil der Meteoriten solchen Staubwolken ihre Entstehung verdanten? Dies wiederum ungeprüft von der Hand zu weisen, würde uns fast in denselben Fehler verfallen lassen, den die Mitglieder der Pariser Atademie der Wissenschaften Jahrzehnte hindurch sich zu Schulden kommen ließen, wie sie diejenigen als Toren abwiesen, die, als Augenzeugen, ihnen auf den Wolken oder vom Himmel gefallene Steine überbrachten.

Verschiedene Tatsachen und Beobachtungen sprechen dafür, dass die Leuchtkugeln erst innerhalb der Atmosphäre auf dampsförmigen Rörpern sich verdichten, dass auf Wolkenmassen sich seste Rörper bilden können. So sahen Landleute am 14. Juli 1847 Morgens 3^{3/4} Uhr in der Gegend von Braunau am nordwestlichen Horizonte ein schwarzes Wölken aufsteigen, welches plöslich erglühte, nach allen Seiten Blise und unter Donnergetöse zwei seurige

Streisen zur Erde sandte. An dem unteren Ende des einen dieser Streisen fand ein Bauer ein frisch in die Erde gebohrtes Loch, auf welchem nach sechsstündiger Arbeit ein 47 Pfund schweres Eisenstück hervorgezogen wurde, welches noch so glübend war, dass man sich noch die Hand daran verbrennen konnte. Der zweite Streisen war in ein Haus eingeschlagen, in welchem eine, jenem ähnlich, 34 Pfd. schwere Eisenmasse große Berwüstungen angerichtet hatte. Auch der oben eingehend besprochene Meteorit von Annahinna soll aus einer furchtbar krachenden Wolke gefallen sein, die in der Ferne als glübende Rugel mit Schweif erschien, aus welcher nach allen Seiten kleine Rugeln hervorsprühten. Dergleichen Beobachtungen werden noch mehrere angesührt, und scheint es etwas voreilig, sie alle auf ein zufälliges Zusammentresen von herabsallenden Sternschungen oder Leuchtkugeln mit heraufziehenden Wölken erklären zu wollen.

Die Reibung solcher pulvrigen Masse, wie sie als Passatstaub beisammen vorkommen, erzeugt ohne Zweisel elektrische Spannung und könnte diese wohl eine Vereinigung desselben veranlassen, eine Vereinigung, die bei Gegenwart genügender Mengen von Wasserdamps vielleicht ohne eigentliche Schmelzung vor sich geht.

Dass die vorausgesette Reibung, in die Erdatmosphäre gelangter Rörper gegen diese Atmosphäre allein nicht genüge, das Leuchten und die Erhitung der Meteoriten zu erklären, darauf hat schon 1835 v. Hof aufmerksam gemacht, indem dasselbe nicht in den oberseten, dünnsten Luftschichten beginnen und in den untersten dichtesten erlöschen würde, vielmehr bis zum Erreichen der Erdobersläche mit der stets zunehmenden Fallgeschwindigkeit beständig zunehmen müsse.

Auf die Verschiedenartigkeit der Sternschnuppen und Leuchtkugeln deutet schon die außerordentliche Verschiedenartigkeit der Fallgeschwindigkeit beider Meteore. Während die Sternschnuppen mit einer Geschwindigkeit von 10–20 Meilen in der Sekunde das Firs mament durcheilen, bewegen sich die viel größeren Leuchtkugeln nur mit einer Geschwindigkeit von 1 oder wenige Meilen in der Ses funde. Die auf denselben herabgefallenen Eisen-Meteorite kommen zuweilen noch im halbflüssigen, geschmolzenen Zustande glühend heiß zur Erdoberfläche, so dass sich Rieselsteine in dieselben hineindrücken, was z. B. 1808 bei Parma [Borgo San Donino] und bei Belaja Zerkara [Bjelaja Zerkov] in Ruffland beobachtet wurde. Auch die Steinmeteore hat man im halbweichen Zustande zur Erde gefallen angetroffen, so z. B. bei Cold Bokkeveld auf dem Rap der guten Hoffnung, wo am 13. Oft. 1838 auf einer Feuerkugel, unter beftigen Explosionen viele, anfangs weiche, schwarze, kohlige, beim Anhauchen ammoniafalisch riechende, vom Wasser und bituminöser Substanz durchdrungene Steine von zusammen mehreren 100 Pfd. Gewicht noch weich zur Erde gelangten und erst später erhärteten. Ahnlich verhielt sich ein Stein, der 1864 bei Orqueil zur Erde fiel; er war weich und zwischen den Fingern zerdrückbar; nur die Schmelzrinde und ein Zement löslicher Salze hielt ihn zusammen. Sollten Erscheinungen so verschiedener Natur: Leuchtkugel, die einmal halbflüffige feurige Metallmassen, ein andermal wässerig-weiche Erdfonglomerate zur Erde senden, nicht vielleicht völlig verschies denen Vorgängen ihre Entstehung verdanken? Leuchtkugeln und Sternschnuppen eine verschiedene Abstammung haben?

Vieles bleibt hier noch zu beobachten; zunächst, nach Hahn's

Vorgange, alle Meteorsteine nochmalf gründlich zu untersuchen.

Wäre auch nur dies das Resultat der Hahn'schen Arbeit, so würde demselben der Dank der Wissenschaft für diese Anregung gebühren; so aber ist sein Verdienst durch die Entdeckung der orsganisierten Veschaffenheit des größten Teiles der Meteorsteine ein positives und nur zu wünschen, dass derselbe auf dem betretenen Pfade rüstig fortschreite.

2 Abbildungen



