Die Meteorite und ihre Organismen

Prof. Dr. Zermann Karsten

In Schaffhausen, mit Abbildungen (Separatabbruck auf der Zeitschrift Die Natur, Jahryany 1881, Nr. 14, 15, 16.)

> Falle [Preußen 1881] Gebauer-Schwetschle'sche Buchdruckerei

Internet Archive Online Edition Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

Inhaltsverzeichnis

I	Die Meteorite und ihre Organismen	2
2	Abbildungen	40

1 Die Meteorite und ihre Organismen

Welche von allen Naturerscheinungen ist von dem Menschen länger und häusiger nicht nur bewundert, sondern auch gefürchtet worden, als die sporadisch austretenden Meteore: die von Blitz und Donner begleiteten Gewitter und die meistenf lautlos und neheimnisvoll das hinziehenden Kometen und Leuchtkuneln? Welche von allen, einem Jeden auffallenden ungewöhnlichen Erscheinungen ist bis auf unsere Tage unerklärlicher geblieben, als diese Kometen und Meteorite, welche Letztere in seltensten fällen sich als Seuerkugeln der Erde nähern und selbst mit donnerndem Prasseln auf sie herabstürzen? Man findet dann diese Steine als eckige etwas geglättete Bruchstücke, mit einer dünnen dunklen Kinde bedeckt wie ef scheint, eine durch Schmelzung der inneren, unverändert gebliebenen Masse erzeugte Rinde, durch die Erhitzung hervorgebracht, die der Stein durch die Reis bung gegen die Atmosphäre erfährt, die er in größter Geschwindigkeit durchschneidet. Diese Reibung während ihres Durchnanges durch die Atmosphäre macht die Steine glühend und leuchtend. Die in den verschiedensten Größen auf die Erde herabyefallenen sind von vielen Rubikfuß Inhalt und über 1000 Zentner schwer, bis zu Bohnengröße, z. T. selbst in Korm von Sand beobachtet worden.

Vor einiger Zeit gab ich Bericht in diesen Blättern über kleine, erst kürzlich auf Menschen oder in deren unmittelbare Mähe herabyefallene glühende Steinchen, welche zur Klasse der Meteorsteine gehörten: hier bei Schasshausen wurde ein Mann auf freiem Felde durch den Urm geschossen, unter Umständen, die nur auf einen Meteorsteine als Geschoss deuteten. Der in Frankreich im vorigen Jahre beobachtete fall, wo ein Zauer auf dem felde einen Stein neben sich herabfallen sah, ihn einem Museum verkaufte und deshalb in einen Prozess verwickelt wurde, ist noch in Aller Erinnerung. Dies waren verhältnismäßig unbedeutende, wenn auch wegen sicherer Kenntnis interessante Erscheinungen. Viele andere unendlich großartiges re werden in den Unnalen der Naturgeschichte ausgezählt. Ein 1810 bei Shahabad in Zindostan niedergefallener Steinregen tötete Menschen und entzündete Gebäude. In der Macht vom 4. Sept. III fielen in Oberitalien Zunderte von Steinen zentnerschwere Stücke wurden von den Zauern nach Mailand gebracht ein Mönch verlor durch diesen Steinregen das Leben, auch Tiere wurden in Menge getötet. Schon die Jahrbücher der Chinesen berichten seit Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung über zahlreiche Fälle leuchtender Meteore, welche zur Erde fielen. Im Jahre 616 vor Christus erschien nach ihnen eine Feuerkugel am Zimmel, auf der nach einer Explosion Steine zur Erde fielen, die 10 Menschen töteten und einen Wagen zerschmetterten. Ebenso erwähnen griechische und römische Schriftsteller der Steinregen. Selbst das christlis che Mittelalter, das nur mit dem Schöpfer und den Seis nigen, nicht mit der Schöpfung sich beschäftigen durste, ließ diese merkwürdigen Zimmelserscheinungen nicht ganz unbeachtet. Zahlreiche in der Neuzeit sich vermehrende Beobachtungen von Meteoriten, die sich zur Erde herabsenkten, wurden verzeichnet Resselmeyer führt in seiner der Senkenbergischen Gesellschaft 1860 übergebenen Abhandlung über den Ursprung der Meteorsteinfälle 647 Meteor-Lisen und Steinfälle von mehr oder minderer Zuverlässigkeit auf. Viele Steine, deren Zerabfallen im glübenden Zustande beobachtet worden war, wurden gesammelt, geprüft und aufbewahrt Gesteine, die z. T. als Metalle, z. T. alf Mischungen dieser mit Gesteinen, selbst mit Kohle und anderen organischen Elementen erkannt wurden.

Die eigentliche Natur und Entwicklungsgeschichte die ser Körper, ihre Entstehung, ihr Verhältnis zur Erde und zu anderen Körpern des Weltalls blieb sedoch in ein, wie schien, undurchdringliches Dunkel gehüllt.

Den ersten Versuch, für die Tatsache der als "Seuerkugeln" zur Erde gefallenen "von den Göttern gesendeten,
Drakel spendenden Batylien," der Aërolithen, Meteoroder Luftsteine eine Erklärung zu sinden, unternahmen
die französischen Physiker [Jean-André] Deluc. Dieselben
versuchten es, sie als Auswürflinge der Vulkane unserer
Erde nachzuweisen, weil, wie in der Tat, dir Zusam-

mensetzung mancher Meteorsteine mit dersenigen vieler vulkanischen Gesteine und Aufflüsse übereinkomme, wenigstens denselben höchst ähnlich sei. Dieser Erklärungs versuch scheiterte an der bald durch Rechnung nachgewiesenen unzureichenden Wurftraft unserer Vulkane für so gewaltige Meteorsteinmassen, wie sie sich auf der Erdoberfläche finden. Im Staate Oregon in Nordamerika liegt unter 40°35′ am Stillen Ozeane ein Meteoreisenblock, dessen über den Boden vorragender Teil von Dr. [John] Evans, der ein Stückhen davon mitnahm, auf 10000 kilo geschätzt wurde. Der berühmteste von Peter Simon Pallas aus Sibirien mitgebrachte Block von Meteoreisen — berühmt weil er [Ernst] Chladni veranlasste, die heute giltige Theorie über die Natur der Meteorsteine außusprechen — won 688 kilo. — [Karl Ludwig von] Reichenbach schätzt das Gewicht der jährlich auf die Erde berabfallenden Meteorsteinmassen auf 4500 3tr.

Auch die von [Zeinrich Wilhelm Matthiaf] Olberf 1795 geäußerte Idee, diese Meteorolithe seien nicht Auswürflinge der Vulkane der Erde, sondern dersenigen der Mondes, eine Idee, die auch [Pierre-Simon] Laplace für annehmbar hielt und die darauf von vielen Mathematikern durch Rechnung, als der Möglichkeit nicht widerstreitend, bestätigt wurde: musste dennoch der Überlegung weichen, dass das Jusammentressen aller der notwendigen, günstigen Kombinationen in der Stellung der Erde zum Monde, damit ein von diesem mit

Unfangsgeschwindigkeit von etwa 2300 Mtr. in der Sekunde, emporgeschleuderter Körper zur Erde gelange, viel zu selten eintresse, um die zahlreichen Meteorsteine zu erklären.

Auch die von anderen Forschern ausgesprochene Meinung, die Meteorsteine seien Erzeugnisse der Atmosphäre, oder Kongregate von Atmosphärilien, die dem sesten Erdkörper entstammten, konnte nicht vereinigt werden mit der großen, für manche Leuchtkugeln bis auf 40 Meilen berechneten Entsernung, auf der die Meteorolithe auf die Erde herabstürzen, und mit der außerordentlichen Verdünnung der Atmosphäre schon in einer Zöhe von Io Meilen, wo seste Körper unmöglich sich schwebend erhalten und bis zu so schweren Massen ansammeln könnten, wie sie hin und wider auf die Erde herabsallen.

Es blieb daher, als die annehmbare Zypothese, nur die 1819 von Chladni aufgestellte übrig, diesen leuchtenden Meteoren und glühend zur Erde kommenden Meteorsteinen eine meteorische Natur abzusprechen und sie, allen übrigen Gestirnen gleich, für kosmische Körper zu erklären, und zwar für wahrscheinliche Bruchstücke eines zertrümmerten größeren Planeten, oder für selbständige planetare Körper, deren Zahnen sich der Erdbahn, oder der Erde selbst, so sehn näherten, dass die bei ihrer relativen Kleinheit der Anziehungskraft der Erde solgen und sich mit derselben vereinigen mussten. Auf diese Idee hatte wohl die Entdeckung der 4 kleinen Planeten

zwischen Mars und Jupiter in sener Zeit von ISOI bis ISO7 durch [Giuseppe] Piazzi, Olbers und [Karl Ludwig] Zarding geführt, welche gleichfalls damals mit Olbers für Zertrümmerungsprodukte eines größeren, an ihrer Stelle früher eine Mittelstraße ihrer Zahnen wandelnden Planeten gehalten wurden.

Schon Chladní vermutete einen Zusammenhang von Meteoriten und Sternschnuppen mit den Kometen eine Idee, die wie meistens neue Ideen auf heftigen Widerspruch stieß, sedoch nach 50 Jahren eine Kräftige Stütze, wie es scheint eine Bestätigung, fand in den Berechnungen der Bahnen einiger Sternschnuppenschwärme durch [Giovanni] Schiaparelli.

Iwar während des ganzen Jahres sieht man Sternschnuppen als vereinzelte, rasch bewegliche Lichtpunkte die parallelen Bahnen der stetig und monoton am Sirsmament vorüberziehenden Sirsterne durchschneiden, aber zu gewissen Zeiten erscheinen sie dem überraschten Auge in größerer Menge, in ganzen Schwärmen. Diese Zeiten bilden Perioden, die für den am I2. November erscheinenden dichten Schwarm nach J. A. [Jubert Anson] Newton's Untersuchung eine Länge von 33 Jahren umfassen, nach deren Verlause derselben am glänzendsten und zahlreichsten wiederkehrt, sast einem Lichtsunkenregen gleich sich den staunenden Erdbewohnern zeigt.

Weniger zahlreich, aber in seiner sährlichen Rückkehr gleichmäßiger, erscheint am 10. August der, von der Legende alf "die feurigen Tränen des heil. Laurentius" bezeichnete, auf dem Sternbild des Perseus sich
entwickelnde sog. Perseidenschwarm, wogegen der Novemberschwarm, der dem Sternbild des Löwen entquillt,
Schwarm der Leoniden von den Ustronomen genannt
wird. Auch die Nächte vom 18–20. April, vom 26–30.
Juni, vom 9–11. Dezember sind durch größere Zäusigkeit von Sternschnuppen ausgezeichnet.

Schiaparelli hat nun die glänzende Entdeckung gemacht, dass die Zahnen newisser Kometen mit denen der bezeichneten Sternschnuppenschwärme zusammenfallen eine Wahrnehmung, die bald von anderen Ustronomen bestätigt wurde und die der Chladni'schen Zypothese über die kosmische Natur der Meteorsteine höchst ungünstig ist. Denn es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass die kleinen leuchtenden Körper, welche unf an den bezeichneten Tagen als Sternschnuppenregen erscheinen, dem Schweise des der Erdbahn nahe vorübergezogenen oder sie durchkreuzenden Kometen angehören, und es schien demnach wohl annehmbar, dass einzelne den Erdkörper nahe streifende Teile dieses Kometenschweif von ihrer Zahn abgelenkt, und der Erdanziehung folgend, als Meteorsteine gebende Leuchtkuneln auf die Erde nelannen können, so wie Chladni es vermutete.

Vor Ersindung des Teleskope durch [Galileo] Galilei kamen nur die größeren Kometen zur Kenntnis des Menschen, die sich der Erde einigermaßen nähern. Auch

noch heute werden die Meisten, wegen ihrer Entfernung von der Erde oder weil sie den beobachtenden Ustronomen nicht zur günstigen Zeit erscheinen, nicht gesehen. In neuerer Zeit sind mit den lichtstärkeren Teleskopen so zahlreiche Kometen entdeckt worden, dass man annehmen darf, ihre Zahl betrage viele Tausende und dass Kepler Recht hatte, wenn er sante, die Zahl der Kometen im Weltraume sei größer, als die Zahl der Kische im Meere. Vielleicht täylich nähert sich einer oder der andere der Kometen unserer Erde so weit, dass Teile seines oft 20 Millionen Meilen langen Schweife uns bei Nacht als sporadische Sternschnuppen erscheinen. Ebenso fallen wohl zu allen Zeiten Meteorsteine auf die Erde herab, von denen aber nur die allerwenigsten von zivilisierten Menschen gesehen und beachtet werden, daher nicht zur allgemeinen Kenntnis gelangen.

Die Meteorsteine wären demnach, auch nach den Erstehnissen der neuesten astronomischen Forschung, Teile fremder Zimmelskörper, und zwar Teile irgend eines Kosmeten, und das Studium der Natur dieser Steine würde uns demnach das trefflichste Mittel geben, die Zusammenssetzung der Masse sener Zimmelskörper kennen zu lernen. Dieses Studium, welches mit allen, der heutigen Chemie zu Gebote stehenden Mitteln ausgeführt wurde, hat nun, wie oben angedeutet, ergeben, dass diese Meteorolithe aus den gleichen Stossen zusammengesetzt sind, wie unsere Erde.

Die Forschungen der Ustronomie über die physikalischen Eigenschaften der Kometen schienen darauf hinzudeuten, dieselben seien gleichsam in der Konsolidation begriffene Zimmelskörper, sie beständen auf einem glübend flüssigen oder dampsförmigen Kerne und einer erstarr ten Zülle, einem Mantel, welcher in Korm kleiner, fes ter, weit von einander entfernter Körperchen den Umfreis und den langen leuchtenden Schweif derselben bilde: Körperchen, die als Sternschnuppenschwärme von der Erde auf oft noch gesehen werden, nachdem der Zaupt körper des Kometen längst vorüberzog. Die Entfernung der den Schweif bildenden Körperchen von einander müsste eine sehr beträchtliche sein, da man durch eine solche die Dicke eines Kometenschweif bildende Masse von mehr als 20000 Meilen Ausbehnung hindurch, noch die kleinsten Sterne ohne Lichtverlust hindurchschimmern sieht. Zei ihrer außerordentlichen Entfernung von dem Kerne des Kometen könnten diese Machzügler dann wohl der Schwerkraft folgen und auf die Erde als Meteorsteine berabstürzen.

Die mikroskopische Forschung entdeckte in diesen Steinen ein Gemenge kristallinisch körniger Metall und Mineral-Körper, vor Allem Eisen in Verbindung und Mengung mit Nickel, Kobalt, Titan, Kupser, Jinn, Kiesel, Magnesium und anderen Stoffen. Manche Aërolithe bestehen fast gänzlich auf metallischen Eisen und seinen Metalllegierungen, andere fast nur auf nicht mes

tallischen Mineralkörpern. Je nachdem die Eisenlegierungen die Zauptmasse bilden, mehr oder minder zusammenhängend oder in Körnern einem aus Quarz und Rieselverbindungen (sehr häusig auf Bronzit, Olivin und Augit) bestehenden Gemenge eingelagert oder letzteres mit Meteoreisenkörnchen mehr oder minder gleichförmig gemengt erscheint, werden sie Pallasite oder Mesosiderite genannt. Line dritte Klasse, die am häufigsten fallenden Meteorsteine, bestehen auf einer helleren oder dunkleren Grundmasse, welche gebildet wird aus einem Gemenge von Körnchen von Meteoreisen, Magnetkies, Chromeis sen, Titanit, Olivin, Augit, Bronzit, Anorthit, Quarz sc., in welcher Masse sich auf's Zahlreichste eingelagert finden kleinere oder größere helle kugelige oder birnenförmige Kügelchen, $\chi o \nu \delta \rho o \iota$ [chondroi], scheinbare Kristalldrusen von Kieselverbindungen, Bronzit oder Enstatit genannt. Diese mineralogisch schwierig zu charakterisierenden, in chemischer Beziehung sehr variablen Steine werden Chondrite genannt. Zuweilen sind diese Chondrite yanz schwarz und in ihnen wurden amorphe Roble und bituminöse Stoffe als wahrscheinliche Zersetzungsprodukte organischer Verbindungen wahrgenommen, über deren Natur keine Vermutung gewonnen werden konnte.

Über diese Chondrite mit ihren manninfachen undesinierbaren Einschlüssen sind nun nicht nur Vermutungen, sondern Ergebnisse mühevollster Forschung, enthalten in einem Epoche machenden Werke: Die Meteorite (Chondrite) und ihre Organismen von Dr. Otto Zahn," welches kürzlich die Laupp'sche Presse in Tübingen verließ und die Unsicht über die Natur der Meteorsteine in ein neues ganz unerwartetes Licht stellt.

Diele meiner Leser werden sich der von dem selben Verstaffer 1879 veröffentlichten Mitteilung über Die Urzelle d. h. über die einfachsten organisierten Körper erinnern, welche derselbe in kristallinischen Gesteinen entdeckte. Wer hat dieses Zuch gelesen und nicht, ungeachtet seiner zahlereichen Darstellungen der in senen Urgesteinen gesehenen Pflanzen, gewisse Zweisel gehegt! Selbst in Meteorsteinen sollten Organismen, sollten pflanzliche Gebilde zu erstennen sein. Pflanzen, deren eine, den Algen und Farn verwandt, zu Ehren des deutschen Kaisers als Urania Guislielmi beschrieben und auf der 17. Tasel abgebildet wurde.

Ungeachtet mancher Widersprüche gegen diese seine Entdeckung, hat nun der seiner guten Sache bewusste Autor dieser beiden setzt uns vorliegenden Abhandlungen sich nicht abhalten lassen, seine Entdeckung weiter zu verfolgen. Zunderte von Dünnschlissen mussten angesertigt, auf das Sorgfältigste geprüft und mit einander verglichen werden, um das früher gewonnene Resultat zu bestätigen und dahin zu erweitern, dass manche Meteorite— und zwar nennt Jahn in der vorliegenden Schrift 18 verschiedene, von ihm untersuchte Meteorsteine auf der Reihe der Chondriten, deren Fallzeit genau bekannt

ist — fast gänzlich auf einem Gemenge von Organismen bestehen. So ist es also auch hier das Mikroskop, welches, wie schon [Friedrich August von] Quenstedt (Zandbuch der Mineralogie S. 722) es vorhersagte, das Kätsel der Jusammensetzung der Meteorsteine lösen musste.

Zahn gibt in seinen Beschreibungen der Organismen, welche er in den 18 von ihm untersuchten, auf den verschiedensten Genenden der Erde stammenden Meteorsteinen auffand, solche auf der Klasse der Schwämme, Nadelschwämme, Korallen und Crinoiden, indem er zu dem Refultate kommt, dass die vermeintlichen Enstatite, Bronzite u. a. Künelchen dieser Chondrit-Meteorsteine nichts anderef sind als Organismen, deren Gewebe, gleich Korallen und Crinoiden, muschel und schneckenschalig Mollusten sc. mit unorganischen Substanzen sich auf's Zöchste verband, so zu sagen mikroskopisch kleine Riesel und Kalk-Korallenstöcke, Schwämme sc., welche Kügelchen nun die Zauptmasse des Gesteines bilden. Zahn meint gesunden zu haben, dass sowohl Individuen einer und derselben ornanischen Urt dieser Chondrite auf verschiedenartiger Mineralsubstanz bestehen, bald der Zusammensetzung des Enstatites, bald der des Bronzites ähnlich: als auch umnekehrt, dass eine und dieselbe Mineralsubstanz von den verschiedensten in dem Meteorsteine vorkommenden Organismen assimiliert worden sei und zum Ausbau ihres Körpers gedient habe.

Übrigens dürste auf die Ligenschaft, dass des Vegetations

Zentrum das scheinbare "Kristallisation-Zentrum" bei diesen Körperchen stets erzentrisch liegt, als Unterscheidungs merkmal von wirklichen Kristalldrusen nicht allzugroßes Gewicht gelegt werden. Denn auch in Kristalldrusen liegt der Kristallisationsansang häusig erzentrisch, und zwar ganz am Rande, wenn die Drusen sich sehr früh auf einen festen Körper niederließen, etwas weniger erzentrisch, wenn dieses Festsetzen später geschah ganz zentrisch liegt der Kristallisationsanfang der Drusen nur, wenn sich dieser schwimmend in einer flüssigkeit bildete, wie ef z. B. häufig bei organischen Substanzen vorkommt, weshalb auch die Volithkügelchen als in einer Quelle, einem Sprudel, gebildet zu betrachten sind. Dass indes sen die Entdeckung von Organismen in den seither für Gläser (!!) oder Kristallisationen gehaltenen Chondriten richtig ist, bleibt für den zweifellos, der mit den nötigen Vorkenntnissen verseben sich mit der Untersuchung dieser Uërolithe beschäftinte.

Eine vorzügliche, höchst genaue physikalische Zeschreibung dieser Chondrite gibt [Karl Wilhelm von] Gümbel in seiner lehrreichen Abhandlung: "Über die in Zayern gesundenen Steinmeteoriten" (Sitzungsberichte der mathematisch physikalischen Klasse der königl. bayrischen Akasemie der Wissenschaften zu München 1878), auf der einige Sätze hier zitiert werden mögen, um den Standpunkt zu kennzeichnen, den die Wissenschaft bis heute in dieser Frage einnahm.

"Uberblickt man die Refultate der Untersuchung dieser wenn auch beschränkten Gruppe von Steinmeteoriten, so drängt sich die Wahrnehmung in den Vordergrund, dass sie, trotz einiger Verschiedenheit in der Natur ihrer Gemengteile, doch von vollständig gleichen Strukturverhältnissen beherrscht sind. Alle sind unzweiselhafte Trümmergesteine, zusammengesetzt auf kleinen und größeren Mineralsplitterchen, auf den bekannten rundlichen Chondren, welche meist vollständig erhalten, aber oft auch in Stücke zersprungen vorkommen und auf Gräupchen von metallischen Substanzen, Meteoreisen, Schwefeleisen, Chromeisen bestehen. Alle diese Fragmente sind an einander neklebt, nicht durch eine Zwischensubstanz oder durch ein Bindemittel verkittet, wie sich überhaupt keine amorphen, glaf oder lavaartigen Beimengungen vorfinden. Nur die Schmelzeinde und die oft auf Klüften austretenden, der Schmelzeinde ähnlich entstandenen schwarzen Ueberrindungen besteben auf amorpher Glasmasse, die aber erst beim Niederfallen innerhalb unserer Utmosphäre nachträylich entstanden ist. In dieser Schmelzrinde sind die schwerer schmelzbaren und größeren Mineralkörnchen meist noch ungeschmolzen eingebettet. Die Mineralsplitter tragen durchauf keine Spur einer Abrundung oder Abrollung an sich, sie sind scharfkantig und spitzeckin. Was die Chondren anlangt, so ist ihre Oberflächenie neulättet, sie ist vielmehr stets höckerin uneben, maulbeerartig rauh und warzig oder facettenartig

mit einem Unsatz von Kristallflächen versehen. Zeile derselben sind länglich, mit einer deutlichen Versüngung oder Juspitzung nach einer Richtung, wie es bei Zagelkörnern vorkommt. Oft begegnet man Stückhen, welche offenbar als Teile zertrümmerter oder zersprungener Chondren gelten müssen. Als Ausnahme kommen zwillingfartig verbundene Kügelchen vor, häufig solche, in welchen Meteoreisenstückhen ein oder angewachsen sind. Nach zahlreichen Dünnschliffen sind sie verschiedenartig zusammen gesetzt. Um häufigsten sindet sich eine erzentrisch strablig faserige Struktur in der Urt, dass von einer weit auf der Mitte nach dem sich versüngenden oder etwas zunespitzten Teile hin verrückten Punkte aus ein Strahlenbüschel gegen Außen sich verbreitet. Da die in den verschiedensten Richtungen geführten Schnitte immer fäulen» oder nadelförmige, nie blätter» oder lamellenarti» ge Unordnung in der diesen Büschel bildenden Substanz erkennen lassen, so scheinen es in der Tat säulenförmin Safern zu sein, auf welchen sich solche Chondren aufbauen. Bei gewissen Schnitten gewahrt man, dieser Unnahme entsprechend, in den senkrecht zur Längenrichtung gehenden Querschnitten der Sasern nur unregelmäßig eckige, Pleinste Feldchen, als ob das Ganze auf lauter Pleinen polyedrischen Körnchen zusammengesetzt sei. Zuweilen sieht ef auf, alf ob in einem Kügelchen gleichsam mehrere nach verschiedener Richtung hin strahlende Systeme vorhanden wären, oder als ob gleichsam der Ausstrahlungspunkt sich während ihrer Bildung verändert habe, wodurch bei Durchschnitten nach gewissen Richtungen eine scheinbar wirre, stengliche Struktur zum Vorschein kommt. Gegen die Außenseite hin, gegen welche der Viereinigungspunkt des Strahlenbüschels einseitig verschoben ist, zeigt sich die Kaserstruktur meist undeutlich oder durch eine mehr körnige Ungregatbildung ersetzt. Zei keinem der zahlreichen angeschliffenen Chondren konnte ich beobachten, daff die Büschel so unmittelbar bis zum Rande verlasen, als ob der Ausstrahlungspunkt gleichsam außerhalb des Küyelchens läge, sofern nur dasselbe vollständig erhalten und nicht etwa bloß ein zersprungenes Stück vorhanden war. Die zierlich quergegliederten Fäserchen verlasen meist nicht nach der ganzen Länge des Züschels in gleicher Weise, sondern sie spitzen sich allmälig zu, verästeln sich oder endigen, um andere an ihre Stelle treten zu lassen, so dass in dem Querschnitte eine manninfache, maschenartige oder netzförmige Zeichnung entsteht. Diese Käserchen bestehen, wie dies schon vielfach im Vorausgehenden geschildert wurde, auf einem meist helleren Kerne und einer dunkleren Umhüllung, sener durch Säuren mehr oder weniger zerlegbar, letztere dagegen dieser Einwirkung widerstehend. Zöchst merkwürdig sind die schalenförmigen Uberrindungen, welche auf Meteoreisen zu bestehen scheinen und in der Regel nur über einen Kleineren Teil der Kügelchen sich ausbreiten. Die gleichen einseitigen, im Durchschnitte mithin als bogenförmig gekrümmte Streischen sichtbare Überrindungen kommen auch im Innern der Chondren vor. — Doch nicht alle Chondren sind erzentrisch saserig viele, namentlich die kleineren, besitzen eine seinkörnige Zusammensetzung, als beständen sie aus einer zusammengeballten Staubmasse. Auch hierbei macht sich zuweilen die einseitige Ausbildung der Kügelchen durch eine erzentrisch größere Verdichtung der Kügelchen durch eine erzentrisch größere Verdichtung der Meteorite bemerkbar. — Der gewöhnliche Typus der Meteorite von steiniger Beschaffenheit ist soweit überwiegend dersenige der sog. Chondrite, und die Zusammensetzung sowie die Struktur aller dieser Steine so sehr übereinstimmend, dass wir den gemeinsamen Ursprung und die uranfängliche Zusammengehörigkeit aller dieser Art Meteorite — wenn nicht aller — wohl nicht weiter in Zweisel ziehen können.

Der Umstand, dass die sämtlich in höchst unregelmäßig geformten Stückhen in unsere Atmosphäre gelangen—abgesehen von dem zerspringen innerhalb der letzteren in mehrere Fragmente, was zwar häusig vorkommt, aber doch nicht in allen Fällen angenommen werden kann, namentlich nicht, wenn durch direkte Beobachtung das Fallen nur eines Stückes konstatiert ist, — lässt weister schließen, dass sie bereits in regellos zertrümmerten Stücken als Abkömmlinge von einem einzigen größeren Zimmelskörper ihre Bahnen im Zimmelsraume ziehen und in ihrer Zerstreutheit einzeln zuweilen in den Atstraktionsbereich der Erde geratend zur Erde niederfallen.

Der Mangel ursprünglicher, lavaartiger, amorpher Bestandteile, in Verbindung mit der äußeren unregelmäßisgen Form, dürste von geos oder kosmologischen Standspunkte aus die Annahme ausschließen, dass diese Meteoriste Auswürse von Mondvulkanen, wie vielsach behauptet wird, sein können. — Es scheinen daher die Meteorite aus einer Art erstem Verschlackungsprozess der Zimmelskörper, aber da sie metallisches Eisen enthalten — bei Mangel von Sauerstoss und Wasser hervorgegangen zu sein."

Unser Autor schließt sich diesem Urteil über die Aggeregatsorm der Meteorite vollkommen an, sedoch mit dem Vorbehalte, dass, wie gesagt, sene kleinen kugeligsbirnenförmigen Körperchen, welche der hauptsächlichste Gemengteil der Steinmeteorolithe ausmachen, nicht Misneralindividuen sind, sondern nur Organisiertes, ebenso wie auch sast die gesamte mit Aissen und Sprüngen durchsetzte quarzige Grundmasse. Im Gegensatze zu den von Gümbel beschriebenen Meteoriten sindet sich in dem von Knyahinya eine geringe quarzige, zersprungene Zwischenssubstanz. "Alles Leben" ein Urwald oder vielmehr ein Polypens, ein Spongienwald im Kleinen, ein Chaos von auseinander gewachsenen Sormen, den heutigen zum Verzwechseln ähnlich, nur Alles unendlich kleiner.

Auf 32 photographischen Taseln werden in 142 Abbildungen eine Unzahl der entdeckten Organismen abgebildet, neben anderen der irdischen Schöpfung, die zum Veryleiche herangezogen wurden. Leider hat sich unser Autor durch einen kritiklosen Kritiker verleiten lassen, seine in der Urzelle befolgte Methode des Selbstzeichnens aufzugeben und statt eigener Zeichnungen nur Photographien zur Erläuterung und Beglaubigung vorzulegen Beides nebeneinander würde den Leser mehr befriedigt haben! Denn so naturgetreu auch photographische Vilder einen bestimmten Zustand, eine bestimmte fläche, die gerade im Fokus des Mikroskops sich befindet, wiedergeben, falls Licht und Farbenverhältnisse günstig sind, so wenig genügen sie einem Beobachter dem Zwecke, ein Bild des sen zu geben, was er in einem bestimmten Zustande des untersuchten Objektes für das Charakteristische hält, wozu häufig perspektivische Zeichnungen dessen, was derselbe durch Veränderung des Fokus (der Sehweite) erkennen konnte, nicht zu entbehren sind.

Die umstehende Zeichnung eines längsdurchschnittenen, drusenartigen Kügelchens ist von mir mit Zilse eines in der Darstellung naturhistorischer, insbesondere mikroskopischer Gegenstände erfahrenen und geübten Künstlers, des Zerrn Prosessor [Friedrich Eduard] Metzger hierselbst, mit größter Sorgsamkeit angesertigt worden. Nach reislichster Überlegung haben wir das, dem Obsekte wirklich Ligentümliche von dem Zufälligen, d. h. von den äußerslich adhärierenden, von dem durch Lichtbrechung verurssachten Scheine zu sondern gesucht es kam hierbei zunächst daraus an, nachzuweisen, dass das Obsekt organisiert sei.

Ich glaube, es wird uns besser und vollständiger gelungen sein, als dem Photographen, so vollendet auch des sen Bilder, dem Justande der photographischen Technik entsprechend, von verschiedenen Eremplaren dieses Organismus auf Taf. I, 8, 9, 10, 11, wiedergegeben sind. Das, ungeachtet der Zartheit des Schliffes, z. T. oberseits hie und dort das Obsekt bedeckende Fremdartige, ferner Risse, die ich für zufälligt, durch die Operation des Sägens und Schleifens hervorgebracht hielt, haben wir nicht mitgezeichnet, um das komplizierte stark vergrößerte, dennoch minutiöse Bild nicht mit Nebensächlichem zu beladen. Vielleicht sind Strukturverhältnisse, die zu dem obliegenden Beweise hätten dienen können, dass das Objekt ein organisierter Körper ist, auf zu großer Vorsicht fortyelassen worden, z. 3. hier und dort eine querlaufende schränstehende Scheidewand in der einen ästigen Kaser wir hielten sie für gleichwertig mit anderen gleichlaufenden Linien, die unf zufällige Risse zu sein schienen. Mit einem Worte: das Bild gibt das, was ich dem Leser als von mir an dem Organismus beobachtet zeigen will, es foll eine lange schwer verständliche Beschreibung ersetzen.

Dieser dargestellte Körper stammt aus einem bei Knyahinya in Ungarn am 9. Juni 1866 gefallenen Steinmeteore, welches z. T., das heißt in einem 27 Pfd. schweren Stücke von dem Beobachter des Falles noch lauwarm ausgenommen, demselben einen 3 Tage anhaltenden, durchdringenden Knoblauchgeruch (Selen ?) mitteilte. Der Stein kam mit Donnergenkrach auf einer Wolke alf glühende Kugel mit langem Schweife, auf welchem nach allen Seiten kleinere herauffuhren. Ein großer $5^{1/2}$ Jentner schwerer Block war gleichzeitig II' tief in den Boden einer Wiese eingedrungen.

Dieser Ornanismus ist von Jahn als Koralle bestimmt worden er ist sehr ähnlich dem in den ältesten silurischen Schichten unserer Erdrinde vorkommenden favosites, wie Georg August Goldsuß auf seinen Tafeln 26 und 27 diese Korallen abbildet ebenso der von Georn Amadeus Carl Friedrich] Naumann auf der ersten Tafel seines Zandbuches nezeichneten silurischen Calamopora. Ich wählte diesen Körper zur Darstellung unter den zahllosen Bruchstücken von Geweben, — die in ihrer großzelligen Struktur sich leicht als Pflanzengewebe zu erkennen neneben haben würden, — weil er einen der Chondritenkügelchen bildet, denen die Mineralogen ihre besondere Aufmerksamkeit schenkten Künelchen, welche die chemische Unalyse als eine Urt Bronzit (Enstatit) nach wies, und die wegen ihrer Kristalldrüsenform und ihrer stenulichen Struktur mehr wie alle übrigen einem kristallinischen Körper gleichen. Das gezeichnete Individuum ist ein fast mittlerer Längenabschnitt einer jener birnenförmigen Körperchen die oberen und unteren Teile sind wenneschlissen, die Ränder z. T. von dem als Grundmass se dienenden Eisensilikate durchdrungen, im Ubrigen ist der nanze Ornanismus durch und durch verkieselte oder in

jene Enstatit genannte Kieselverbindung verändert. Er besteht auf fast geraden, schwach radialen, nach dem peripherischen Ende etwas erweiterten Röhren, die selten, wie in Sigur 2, eine Verzweigung erkennen lassen, wie es scheint, ohne Scheidewände, wenigstens in den jüngeren Teilen in den unteren engeren Enden vielleicht mit rechtwinkelig auf der Längenwand stehenden Scheidewänden. Einzelne Partien dieses Aöhrenspstemes sind, mitten zwischen den fast parallelen, etwas gebogen und scheinen in eine verdünnte abgerundete Spitze zu enden. Alle die Röhren sind, wie es mir schien, und wie in dem unter Sig. I bei b gezeichneten Stückehen dargestellt, angefüllt mit einer Reihe kugeliger, dickwandiger Zellen, die in den älteren Teilen unmittelbar aneinander liegen, während in den jüngeren Enden die Röhrenhaut verhältnismäßig dis der zu sein scheint, wohl aber noch eine Längenhöhlung, ein Lumen, zu erkennen ist, in welchem in regelmäßigen Abständen kleine, dunkelumrandete Bläschen liegen, wie in a unter figur I gezeichnet. Die Ubergangsformen zwischen diesen beiden Inhaltsanteilen der Köhren konnte ich nicht genau erkennen. Zwischen den Röhren befindet sich eine trübe dunkelgelbe bis braune Masse, in der aber gleichfalls eine Reihe von hellen Bläschen zu erkennen ist vielleicht die Inhaltsbläschen darüber liegender, zum größten Teile weggeschlissener Köhren. Wie gefant, bestimmte Zahn diesen Körper als Favosites, indem er diese scheinbaren Bläschen für durchschnittene Kanäle,

fog. Knospenkanäle hält. In der Tat hat derselbe, abgesehen von der außerordentlichen Kleinheit, die größte Ühnlichkeit mit den Abbildungen oben genannter Korallen ich halte dieselben, nach dem einen, mir zur Ansicht vorliegenden Exemplare, für eine farblose Fadenalge, für eine Zysterophyme, z. B. für Leptomitus oder Leptothrix ohne hinreichendes Material, wie es heute nur Sahnselbst zu Gebote steht, und wie es derselbe auf das Fleißigste benutzte, wäre es aber ein zu gewagtes Unternehmen, eine von der seinigen abweichende Meinung ausstellen zu wollen.

Jedenfalls ist dieser Körper keine Druse nadelförmiger oder säulenförmiger Kristalle, wie bisher die Mineralogen meinten, sondern ein organisiertes Gebilde denn wirkliche Kristalle, die aus verdunstenden oder abkühlenden Lösungen sich ausscheiden, sind strukturlos und homogen.

Von größtem Interesse für die Ausklärung der Mastur dieser Organismen der Meteoriten sind höchst ähnliche von Paul. F. Reinsch kürzlich in der Steinkohle entdeckste Gebilde eine Entdeckung, die zu meiner Kenntnis zu bringen der Zerr Zerausgeber die Güte hatte.

Nach Reinsch's Beobachtung bestehen einzelne Schichten der sächsischen Kohle zu 20% auf solchen Organismen, ebenso wie die Chondriten-Meteorite zum größtem Teile auf ihnen zusammengesetzt sind. Auch die von Reinsch entbeckten Pflanzen sind höchst kleine, mikroskopische Gebilbe, auch sie kommen in wenigen Formen, aber in größter

Unzahl beisammen als Grundlage der betreffenden Kohlenflötze vor z. T. bestehen sie, gleich dem in Sigur I und Sigur 2 gezeichneten Organismus, auf verästelten, mehr oder minder freie Zellen enthaltenden, konzentris schen Kasern. Reinsch hält sie für Algen und Vilze, etwa für Schleimpilze, indem auch er, gestützt auf vollgültige Gründe, aufdrücklich gegen unorganische Natur derselben protestiert. Auch darin stimmen diese Kohlenorganismen mit denen der Meteoriten, dass sie in ihren älteren Teilen vererzen (in Schwefelkief) oder verkieseln. Ich halte auch diese Organisationen der Steinkohle für Zysterophymen der die Kohle zusammensetzenden absterbenden, verwesenden Pflanzen: für Zysterophymen, deren Natur und Entwickelung ich wiederholt — zuletzt in meiner Deutschen medizinischen flora 1880 — beleuchtete Organisationen, die jeder vorurteilsfreie, sorgfältige Beobachter auf die von mir angegebene Weise aus pflanzlichen und tierischen Gewebezellen, als Metamorphosen derselben sich entwickeln sehen kann. In dem von Reinsch entdeckten Kalle geschieht die netrobiotische Metamorphose unter Wasser, in jenem von Zahn entdeckten in feuchtigs keitsschwangerer Utmosphäre in beiden Källen sind ef die einfachen Zellenvermehrungsformen, wie sie und das Studium der Kontagien und Miasmen kennen lehrte und wie ich sie in meiner Fäulnis und Ansteckung 1872 darstellte.

Zahn fand nun ferner, dass alle von ihm untersuchten Steinmeteorite, und nur über solche äußert er sich in dem vorliegenden Werke, die gleichen organisierten Geschöpfe enthalten. Ein Resultat, welches schon die mineralogische Untersuchung in Bezug auf chemischephysikalische Verbältnisse derselben erlangt hatte und diese Tatsache führt ihn S. 44 zu dem Schulke: "alle diese Chondrite als Trümmer, welche nach der Zerstörung des Planeten kreisten, bis sie glücklicherweise in den Fallkreis unserer Erde kamen."

Die Kormen der bis setzt in den Chondriten erkannten Geschöpfe gehören alle dem Wasser an die ganze Masse dieser Meteorite scheint unter Wasser newachsen zu sein, die zahllosen, mitrostopischen Ornanismen versteinerten entweder nachträylich oder, was die chemische Unalyse der verschiedenen Körperchen wahrscheinlicher macht, jedes einzelne verband sich in seiner Weise mit den im Wasser nelösten Mineralsubstanzen, assimilierte dieselben, gleich den jetzt noch lebenden Muscheln, Korallen, Bazillarien, Equiseten, verschiedenen Verbenazeen sc., deren Zäute gleich den Knochen der Wirbeltiere verkieseln und verkalken. Schließlich wurden sie dann in dem Auckstande der einnetrockneten Kieselreichen Nährstoffflüssinkeit mit einander verkittet und als quarzige Masse in ein zusammenhängendes Gestein umgewandelt. Man sieht daher auch so zahllose kleinste durchscheinende und durchsichtige Ornanisationen — in diesem Meteorsteine von Knyabinya wenigstens — übereinander gehäuft, dass dies die Erkennung der eigentlichen Form der meisten von ihnen sehr erschwert, dass selbst ihr Vorhandensein für diesenisen, welche mit den mikroskopischsorganischen Formen nicht vertraut sind, schwierig wahrzunehmen ist.

Den einzelnen organisierten Kügelchen und Gewebebruchstücken zwischengelagert, findet sich, wie gesagt, eine, wenn auch geringe, Rieselmasse und in dieser zerstreut sind größere und kleinere Splitter metallischen Lisens und Mickel, Titan oder Chrom-Lisen-Verbindungen, die z. T., wie es scheint, in das Silikat übernehen und auch die Organismen hie und da teilweise durchtränken, 3. T. aber, 8. h. die metallischen Eisenlegierungen, in scharfkantiger und unregelmäßig eckiger Korm vorliegen. Die Entstehungsweise dieser metallischen Eisensplitterchen kann, wenn sie auf die venetative Tätinkeit der Ornanismen bezonen wird, wie Zahn dies für naturnemäß hält, indem er sich dabei auf die von mir in dieser Richtung gemachten Versuche und Beobachtungen stützt, eine doppelte sein: entweder kann das Metall durch die Sekrete derselben auf seinen Lösungen von Kiesel oder Chlor, oder Chrom, sc. Lisen reduziert und metallisch auf dieselben niederneschlagen sein, wie dies auf Silber, und Queckfilbersalzen durch Pilzvegetationen geschieht oder es ist, gleich den Erden und Alkalien, gleich Natron, Kali, Kalk, Magnesia sc. von der assimilierenden Zellmembran aufgenommen und zur eigentlichen Konstitution derselben verwendet worden, indem diese Membran nach und nach immer höher basische Verbindungen formte und endlich

ihre ursprünglichen organischen Elemente gänzlich ausgeschieden wurden¹, so dass, gleich reinen Magnesia» oder Kalksalzen, reine Metalllegierungen übrig blieben. Die Organismen der Letztwelt geben uns bis setzt nur die ersten Entwicklungstufen dieser Metallverbindungen als Unhaltspunkte für diese Theorie, wie ich deren in meiner auch von Sahn berücksichtigten Abhandlung über "Chemismus der Pflanzenzelle" niederlegte. Diese Organismen der Meteoriten lassen sedoch, durch die außerordentliche Kleinheit, in der sie meistens auftreten, auf möglicherweise andere, von den heutigen verschiedene physikalische Verhältnisse ihrer Entstehung schließen, vielleicht auf eine bedeutend höhere oder niedrigere Temperatur sc. Wie sich unter solchen uns unbekannten Verhältnissen nun die affimilierende Zellenmembran die unorganischen Elemente aneignet, das ist uns bis jetzt noch gänzlich unbekannt. Dass die Organismen bei höherer Temperatur, z. 3. bei der des Siedepunktes des Wassers, in viel kleinerer Korm weiter vegetieren und sich vermehren, das erwähnte ich schon in der genannten Abhandlung über "Chemismus der Pflanzenzelle". Inzwischen überzeugte ich mich nun, dass selbst bei noch höherer Temperatur, d. h. bei 150°, die Lebenstraft der pflanzlichen Organisation nicht völlig erlischt, dass vielmehr die Inhaltkellchen einzelner Gewebezellen auch dann noch, wenn gleich spärlich sich entwickeln können, aber in ungewöhnlich zarter und kleiner

¹ Eine aufführliche Darstellung der afsimilierenden, organisierenden Tätigkeit der lebendigen Jellmembran gab ich vor Kurzem (I880) in meiner Votanik S. 17 × 22.

Form. Underseits vermehren sich Organismen auch noch bei niedrigen, unter dem Gefrierpunkte liegenden Temperaturen, und auch dann in bedeutend geringerer Größe, als bei +30 bis 35° C. Dass sich Zakterien eine Stunde lang bei einer Temperatur von 100° C. lebend erhielten, wurde wiederholt beobachtet könnte der Versuch lange genug fortgesetzt werden, so würde man vielleicht auch dann senes Gesetz der Formverkleinerung bestätigt sehen.

Jedenfalls fordert das vorliegende Zuch von Zahn durch die glänzende Entdeckung einer in den Meteoris ten zur Erde gebrachten neuen Welt von Organismen zur Revision vieler, uns schon als sichere Ernebnisse der Beobachtung und Berechnung erschienener Lehrsätze auf. Erkennen wir die so annehmbar erscheinende Vermutung, die Meteorite seien Teile von Kometen, als richtin an: so können die Kometen nicht glühend flüssige, am Umfreise nur erkaltete und in einzelne Bruchstücke getrennte Körper sein denn diese Steinmeteore sind, vor dem Zusammentresen mit unserer Utmosphäre, nicht auf bedeutende Wärmegrade erhitzt gewesen, sie würden zu Glas neschmolzen sein! Man erkennt aber nur eine neringe Einwirkung der Wärme — vielleicht, wie früher angedeutet, der Reibungswärme gegen die atmosphäris sche Luft während ihres Kalles — auf der äußeren Oberfläche als wenige Linien dicke Rinde um jeden der herabgefallenen Steine. Diese Schmelzrinde bildet sich, wie ef scheint, größtenteils erst nach dem häusig beobachteten und vernommenen Zerplatzen der die Leuchtkugel formenden ganzen Masse: denn sedes einzelne so entstandene kantine Stück ist ringsum mit einer, wie ef scheint gleich dicken Schmelzrinde umhüllt diese entstand demnach erst in den unteren dichteren Regionen der Utmosphäre. Gehörten nun dennoch diese Meteorsteine ursprünglich einem Kometen an, so befindet sich dieser nicht in geschmolzenem feurin-flüssigen Zustande, sein Licht ist ein erborutes, ein reflektiertes und seine Masse von solcher Beschaffenheit, dass sie durch die empfangene Wärme nicht zum Schmelzen oder auf eine Zöhe erhitzt wurde, welche dass Leben von Organismen unmöglich machen würde. Der Idee Zahn's und der Neptunisten über die Entstehung unserer Erde würde es entsprechen, sich den Kern der Kometen nicht feurin-flüssig, sondern wässrig-flüssig, und seine in Stückhen zersplitterte Kinde als Verdunstungs-Kinde zu denken. Denn wahrscheinlich war "der erste Unfang unseres und daher aller Planeten eine organische Bildung (S. 40), — die Zell sie erhält ihn, so lange noch ein Lichtstrahl die Erde trifft!" S. 50.

Aber auch an die oben schon berührte Idee des terrestrischen Ursprunges der Meteorsteine möchte wieder erinnert werden, an die historisch beglaubigten von Feuerkugeln und Meteorolithen begleiteten Staubregen müssten nicht auch in diesem Falle diese Meteorolithen zusammengeschmolzene Gläser sein, wenn diese Körper etwa erst in der Utmosphäre aus Passatstaub entstanden?

Nach der Unschauung Zahn's ist die ganze seste Masse der uns bekannten Zimmelskörper das Produkt organisierender Tätigkeit nach Sahn formen sich auf dem Chaos der Elemente zunächst Jellen, die sich neben son. organischen Elementen (Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff) auch in größter Menge unorganische Elemente, d. h. Erden und Metalle aneignen und in ihre eigene Masse aufnehmen. Dieser energische, durch die ganze dampfförmige und flüssige Masse der sich formenden Zimmelskörper verbreitete Vegetationsprozess der Organismen könnte auch das von ihnen uns gesandte Licht hervorbringen, ähnlich, wie wir ef von einigen leuchtenden Tieren, Pflanzen und Zysterophymen (Spaltpilzen) unserer Erde kennen, das demnach dort stärker erylänzen würde, wo sich die dasselbe erzeugenden Organismen in größerer Menge beisammen finden.

Dass diese mit organisierten Körpern durchsetzten Meteoriten vor dem Zusammentressen mit unserer Utmosphäre keine Schmelztemperatur zu ertragen hatten, zeigt auch ihre mittelst des Mikroskops erkannte Struktur zweisellos. Demnach kamen sie in ungeschmolzenem kalten Zustande in unsere Utmosphäre an einem anderen, uns unbekannten Orte in der Ferne gebildet, wie sie uns jetzt vorliegen.

Vielleicht ist auch die Idee des kosmischen Ursprunges, wenigstens für diese Urt von Meteoriten, zu verlassen und wieder auf deren Entstehung als Konglomerate von Meteorstaub oder Passatstaub ähnlicher Materie zurückerugehen, wie sie schon von [Pieter van] Musschenbroet, Dominikus Tata, [Eugène Louis Melchior] Patrin, [Ernst Friedrich] Wrede, Egen, v. Zof, Kesselmeyer u. U. verteidigt wurde, obgleich das Entstehen eines solchen Konglomerates mit unseren heutigen physikalischen Kenntnissen und Erfahrungen noch nicht bis ins Einzelne verfolgt werden kann.

Diese eben genannten Autoren, vorzüglich Kesselmeyer, betrachten die Leuchtkugeln und die aus diesen herabsallenden Meteorite als atmosphärische Sublimationsgebilde der von unseren Vulkanen ausgehauchten Mineral dämpese und allerdings hat sich dem analysierenden Chemiker die Slüchtigkeit aller Mineralstosse zum großen Nachetile der quantitativen Analyse, bevor diese Eigenschaft sester Körper hinreichend erkannt worden war, nur zu häusig in bedauerlicher Weise bemerkbar gemacht.

Überdief kennt seder Besucher tätiger Vulkane die interessante Erscheinung des kontinuierlichen Dampses dies ser zur Nachtzeit oft leuchtenden Feuerberge. Mit dem Wasser zugleich, welches den größten Teil dieses Dampses bildet, entquellen dem Krater auch beständig seste, pulverförmige oder dampssörmige Bestandteile des Gesteines, welches von den glübenden Wasserdämpsen durchzogen wird: pulverförmige Massen, sog. vulkanische Usche, denen sich zur Zeit der höchsten Tätigkeit mehr oder minder umfangreiche Gesteinsbruchstücke und geschmolzene Gesteis

ne beimischen. Letztere fallen mehr oder minder bald zur Erde zurück, aber die staubförmigen Unteile werden mit dem Wasserdämpfe bis zu erstaunlicher Söhe mitgerissen, um sich in den oberen Regionen der Utmosphäre zu verteilen. Mit großem Genuss betrachtete ich das anziehende Schauspiel, welches mir in den Kordilleren der Duracé gewährte durch die gegen 5000' hohe Dampsfäule, welche in der ruhigen Utmosphäre senkrecht in die Zöhe quoll, anfangs stürmisch auf dem Gipfelkrater hervorwirbelnd, dann nach und nach langsamer steigend, bis sie, in gewisser Zöhe angelangt, sich waagrecht ausbreitete und eine Wolkenschicht bildete, die sich in den oberen Luftschichten an den Kändern wieder auflöste. Wie anderseits Staubmassen von der Oberfläche des Erdbodens senkrecht in die Zöhe wirbeln, auch größere leichte Körper, trodene Blätter, Schmetterlingsflügel sc. mit sich führen bis zu Zöhen, wo sie dem Auge entschwinden, sah ich besonders in den heißen Tiefebenen der Aequatorialgegend zur Zeit der Jahreswende, wenn sich hie und dort leichte Wölkchen bilden, deren wenig umfangreiche, auf den erhitzten, trockenen Boden der abgebrannten Llanos geworfene Schatten, eine stellenweise geringe Abkühlung desselben bewirken, hinreichend, die Entstehung der aufstrebenden Luftwirbel zu veranlassen, welche mit dem Wölkchen vorwärtsichreitend die Ebenen absegen und die leichten Staubteile derselben himmelwärts führen, bis sie dem Auge entschwinden. Wie große Massen auf diese

Weise in den oberen Regionen der Utmosphäre angesammelt werden, um in oft sehr entfernten Gegenden sich wieder zu senken, das lehren die oben berührten Erscheinungen des Meteors und Passatstaubes, die das Mikroskop als Mischung organisierter und unorganisierter Körperchen nachwies. Dass die organisierten noch lebensfähigen Unteile diesef Staubes, wenn derselbe sich in der Atmosphäre mit feuchten Luftschichten mischt, wieder erwachen und ihre Lebenfäußerungen, ihre Uffimilationstätigkeit fortsetzen können und werden, wie wir sa die Entstehung der Bakterien und ihre Verwandten kennen und wie sie in der feuchten Kammer des Mikroskopikers beobachtet werden kann, ist wohl nicht zu bezweifeln bis wie weit aber die Gestaltungsprozesse dieser, in den lustigen kalten Zöhen weitergetragenen, mitrostopischen Zellchen fortgeführt werden können, darüber haben wir bisher noch keine Uhnung, würden eine solche vielleicht auf den überraschenden Mitteilungen Zahn's schöpfen können, wäre uns nicht der Kondensations-Alkt solcher mit Abkömmlingen des Passatstaubes geschwängerten Wolken noch durchauf rätselhaft und wir deshalb im Zweisel, ob wir diese Erscheinungen in Zusammenhang bringen dürfen.

Dass ungeheure Massen, die sicher der Erdatmosphäre entstammen, sich in deren Bereich koagulieren können, beweisen die Eismassen, die zuweilen auf die Erde hersabfallen. Ich selbst beobachtete einmal einen Zagelschauer in Südbaiern, dessen Körner die Größe von Zühnereiern

hatten, und diese waren nicht abgerundet, wie gewöhnliche Zagelkörner, sondern scharfkantige Stücke, wie es schien, Bruchstücke größerer Massen eine Erscheinung, die auch Delcroß beobachtete. Diese scharfkantigen Lisstücke erinnern dringend an das Bersten der Steinmeteorite in der Erdnähe. Im Jahre 1802 am 28. Mai fiel bei Duztemischel in Ungarn während eines Zagelwetters ein Eis klumpen zur Erde, der 3' Länge, 3' Breite und 2' Dichte hatte sein Gewicht wurde auf II 3tr. geschätzt. L. v. Buch berichtet auf Zeyne's Tracts historical and statistical on India von einer Lismasse, die bei Seringapatam in Indien fiel und die Größe eines Elefanten hatte, so dass sie, unyeachtet der großen Zitze dieses Landes, eines Zeitraumes von 2 Tagen bedurfte, um geschmolzen zu werden. Diese Lismassen entstehen durch Gefrieren von Regenwolken in Kolge der plötzlich erkältenden Einwirkung heftiger trockener Luftströme. In solchen Zagelkornern wurden selbst Metallkerne beobachtet so bei Mayo in Irland am 21. Juni 1821. Könnten vielleicht auch durch Aufeinandertreffen von verschiedenen mit Mineralyasen und Organismen geschwängerten Luftströmungen in den höchsten Regionen der Utmosphäre sene Chondritmassen sich koagulieren? Die am 14. Juli 1860 bei Dhurmsala in der Gegend von Labore unter Explosion herabgefallenen Steine sollen, obyleich sie an der Oberfläche geschmolzen waren, dennoch so kalt gewesen sein, dass Personen, welche sie ausheben wollten, sie nicht in der Zand behalten

konnten, weil sie vor Kälte ein Kriebeln in den Singern bekamen. Brachten nun diese Steine die Kälte des Weltzaumes oder die Temperatur der oberen Erdatmosphäre zu den Menschen herad? Diese Wahrnehmung an den Mesteoriten bei Dhurmsala erhielt kürzlich ein Seitenstück in dem von Thomas Carnalley im Vakuum bis auf +180° C. erhitzten Likylinder.

Schon manche Erscheinungen beim Kallen der Meteor steine machen ihre Natur als kosmische Körper zweiselhaft und erinnern an die dichten Wolken von Passatstaub, die sich bin und wieder in Europa und Usien als Massen von Millionen von Zentnern niederlassen und der Westküste Ufrika's die Benennung "Nebelküste" dem benachbarten Ozeane die des Meeres der Sinsternisse eintrugen. Ehrenbern fand dernleichen Passatstaub auf Minertrümmern, ornanisierten Fraymenten von Land, und Süßwasser, formen zusammengesetzt. Sollte, trotz aller Zweifel der Physiker, dennoch ein Teil der Meteoriten solchen Staubwolken ihre Entstehung verdanken? Dies wiederum ungeprüft von der Zand zu weisen, würde uns fast in denselben Sebler verfallen lassen, den die Mitylieder der Pariser Utademie der Wissenschaften Jahrzehnte hindurch sich zu Schulden kommen ließen, wie sie diesenigen als Toren abwiesen, die, als Augenzeugen, ihnen auf den Wolken oder vom Zimmel gefallene Steine überbrachten.

Verschiedene Tatsachen und Beobachtungen sprechen dafür, dass die Leuchtkugeln erst innerhalb der Atmos

phäre auf dampfförmigen Körpern sich verdichten, dass auf Wolkenmassen sich feste Körper bilden können. So sahen Landleute am 14. Juli 1847 Morgens $3^{3/4}$ Uhr in der Gegend von Braunau am nordwestlichen Zorizonte ein schwarzes Wölkchen aufsteigen, welches plötzlich erglühte, nach allen Seiten Blitze und unter Donnergetöse zwei seurige Streifen zur Erde sandte. Un dem unteren Ende des einen dieser Streifen fand ein Bauer ein frisch in die Erde gebohrtes Loch, auf welchem nach sechsstündiger Arbeit ein 47 Pfund schweres Eisenstück hervorgezogen wurde, welches noch so glübend war, dass man sich noch die Zand daran verbrennen konnte. Der zweite Streisen war in ein Zaus eingeschlagen, in welchem eine, jenem ähnlich, 34 Pfd. schwere Lisenmasse große Verwüstungen angerichtet hatte. Auch der oben eingehend besprochene Meteorit von Knyahinya soll auf einer furchtbar krachenden Wolke gefallen sein, die in der Ferne als glübende Kugel mit Schweif erschien, auf welcher nach allen Seiten kleine Kugeln hervorsprühten. Dergleichen Beobachtungen werden noch mehrere angeführt, und scheint es etwas voreilig, sie alle auf ein zufälliges Zusammentresen von herabfallenden Sternschnuppen oder Leuchtkugeln mit heraufziehenden Wölkchen erklären zu wollen.

Die Reibung solcher pulvrigen Masse, wie sie als Passatstaub beisammen vorkommen, erzeugt ohne Zweisel elektrische Spannung und könnte diese wohl eine Vers

einigung desselben veranlassen, eine Vereinigung, die bei Gegenwart genügender Mengen von Wasserdampf vielleicht ohne eigentliche Schmelzung vor sich geht.

Dass die vorausgesetzte Reibung, in die Erdatmosphäre gelangter Körper gegen diese Utmosphäre allein nicht genüge, das Leuchten und die Erhitzung der Meteoriten zu erklären, darauf hat schon 1835 v. Zos aufmerksam gemacht, indem dasselbe nicht in den obersten, dünnsten Luftschichten beginnen und in den untersten dichtesten erlöschen würde, vielmehr bis zum Erreichen der Erdsobersläche mit der stets zunehmenden Fallgeschwindigkeit beständig zunehmen müsse.

Auf die Verschiedenartigkeit der Sternschnuppen und Leuchtkugeln deutet schon die außerordentliche Verschiesdenartigkeit der Fallgeschwindigkeit beider Meteore. Während die Sternschnuppen mit einer Geschwindigskeit von IO-20 Meilen in der Sekunde das Firmament durcheilen, bewegen sich die viel größeren Leuchtkugeln nur mit einer Geschwindigkeit von I oder wenige Meislen in der Sekunde. Die auf denselben herabgesallenen Lisen-Meteorite kommen zuweilen noch im halbslüssigen, geschmolzenen Justande glühend heiß zur Erdobersläche, so dass sich Kieselsteine in dieselben hineindrücken, was 3. 3. 1808 bei Parma [Borgo San Donino] und bei Belaja Jerkara [Bielaja Jerkov] in Russland beobachtet wurde. Auch die Steinmeteore hat man im halbweichen Justande zur Erde gefallen angetrossen, so 3. 3. bei

Cold Bokkeveld auf dem Kap der nuten Zoffnung, wo am 13. Ott. 1838 auf einer Feuerkugel, unter heftigen Explosionen viele, anfangs weiche, schwarze, kohlige, beim Unhauchen ammoniakalisch riechende, vom Wasser und bituminöser Substanz durchdrungene Steine von zusammen mehreren 100 Pfd. Gewicht noch weich zur Erde gelangten und erst später erhärteten. Uhnlich verhielt sich ein Stein, der 1864 bei Orgueil zur Erde siel er war weich und zwischen den Fingern zerdrückbar nur die Schmelzrinde und ein Zement löslicher Salze hielt ihn zusammen. Sollten Erscheinungen so verschiedener Natur: Leuchtkunel, die einmal halbflüssine feurine Metallmassen, ein andermal wässerig-weiche Erdkonglomerate zur Erde senden, nicht vielleicht völlig verschiedenen Vorgängen ihre Entstehung verdanken? Leuchtkugeln und Sternschnuppen eine verschiedene Abstammung haben?

Vieles bleibt hier noch zu beobachten zunächst, nach Zahn's Vorgange, alle Meteorsteine nochmals gründlich zu untersuchen.

Wäre auch nur dies das Resultat der Jahn'schen Urbeit, so würde demselben der Dank der Wissenschaft für diese Unregung gebühren so aber ist sein Verdienst durch die Entdeckung der organisierten Beschaffenheit des größten Teiles der Meteorsteine ein positives und nur zu wünschen, dass derselbe auf dem betretenen Pfade rüstig fortschreite.

2 Abbildungen



