
## Die Meteorit (Chondrit) und ihre Organismen

Dargestellt und Zeschrieben von Dr. Otto Zahn

32 Tafeln mit 142 Abbildungen



 ${\cal I}^{st}$  Edition, Tübingen I880 Verlag der J. Laupp'schen Buchhandlung

Internet Archive Online Bottion Vamensnennung Vicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

# Inhaltsverzeichnis

Ţ	Linl	eitun <del>g</del>	6
	1.1	Einleitung	6
	1.2	Geschichte und Überblick	IJ
	1.3	Die Bisherigen Unsichten über die Meteorit	21
	1.4	Die Meteorit und ihre Mineralogischen Eigenschaften	31
2	Die	Organische Natur der Chondrit	40
	<b>2.</b> J	Organisch oder Unorganische	40
	2.2	Die Einzelnen Formen: Schwämme — Urania	47
	2.3	Die Einzelnen Formen: Schwämme — Nadel Schwämme	50
	2.4	Die Einzelnen Formen: Die Korallen	52
	2.5	Die Linzelnen Formen: Crinoiden	56
	2.6	Alles Leben	60
	2.7	Stein im Stein	63
	2.8	Sortpflanzung	66
	2.9	Entwickelung	68
3	Das	Meteoreisen	70
4	Das	Eisen von Ovifat	81
5	Schl	ufffolgerungen	83
	<b>5.</b> I	Ursprung der Meteorit	83
	5.2	Die Erdbildung	89
	5.3	Die Zukunft Unseres Planeten	95
6	Erklärung der Tafeln		100
	6.J	Vorbemerkung	100
	6.2	Tafelverzeichniff	107
થા	phabet	rischer Inder	250

# Abbildungsverzeichnis

Ţ	Tafel I: Figur I — Enstatit (Bronzit) vom Kupferberg V	108
2	Tafel I: Figur 2 — Enstatit von Teraf V	
3	Tafel I: Sigur 3 — Spherulite-Liparite from Lipari M	110
4	Tafel I: Sigur 4 — ein Theil der Coralle Taf. 8, 9 und 10	III
5	Tafel I: Sigur 5 — Kettenkoralle D. 0,90 mm.	112
6	Tafel I: Figur 6 — Crinois D. 1,20 mm	113
7	Tafel 2: Figur I — auf Knyahinya. Dieselbe Tafel 5. Fig. I	114
8	Tafel 3: Figur I — auf Knyahinya D. 0,60 mm.	
9	Tafel 3: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,30 mm. (man übersehe nicht	
	die prachtvollen Crinoidenglieder linkf oben!)	116
IO	Tafel 3: Figur 3 — auf Knyahinya D. I mm.	117
IJ	Tafel 3: Figur 4 — auf Knyahinya D. I mm.	118
12	Tafel 3: Kigur 5 — auf Knyahinya D. I mm. (zu beachten die Schich-	
	tung oben)	119
13	Tafel 3: Figur 6 — auf Knyahinya D. I mm. (Schichtung wie 5, boch	
	im Bilde nicht wiedergegeben, 5 und 6 auf einem Dünnschliff.)	120
14	Tafel 4: Figur I — auf Knyahinya D. 0,90 mm.	121
<b>15</b>	Tafel 4: Kigur 2 — auf Siena D. 3 mm. (der dunkle Strich rührt von	
	gelber Färbung def Präparats)	122
16	Tafel 4: Figur 3 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.	123
<b>J</b> 7	Tafel 4: Kigur 4 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (Luftblase)	124
18	Tafel 4: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,60 mm.	
19	Tafel 4: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 1,00 mm. (Luftblase)	126
20	Tafel 5: Figur I — auf Knyahinya D. 1,40 mm. (siehe Tafel 2. Rings	
	Crinoidendurchschnitte. Form unten links, veryl. Tasel I. Sig. 6 und	
	Tafel 25. 1, 2)	
21	Tafel 5: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.	
22	Tafel 5: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.	
23	Tafel 5: Kigur 4 — auf Knyahinya D. 1,30 mm. (undeutlichef Bild) .	
24	Tafel 5: Kigur 5 — auf Knyahinya D. 1,40 mm. (Luftblase)	131
25	Tafel 5: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 0,60 mm. (manyelhaftef Bild.	
	Der weiße Aing ist der Durchschnitt)	
26	Tafel 6: Kigur I — auf Siena D. 4,00 mm	
27	Tafel 6: Kigur 2 — auf Knyahinya D. 0,80 mm.	134
28	Tafel 6: Kigur 3 — auf Siena D. 1,20 mm	135
29	Tafel 6: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,70 mm. (in der Mitte zu	
	stark beleuchtet)	136
30	Tafel 6: Kigur 5 — auf Knyahinya D. 0,30 mm.	137
31	Tafel 6: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (Luftblase)	138
32	Tafel 7: Sinur I — auf Knyabinya D. 2.30 mm.	139

33	Tafel 7: Kigur 2 — auf Knyahinya D. 1,80 mm. (ein Aiss im Präparat.	
	Die Nadeln)	140
34	Tafel 7: Sigur 3 — auf Knyahinya D. 2,10 mm.	<b>J4J</b>
35	Tafel 7: Sigur 4 — (Crinois Querschnitt?) auf Knyahinya D. 3,00 mm.	142
36	Tafel 7: Ligur 5 — Schwamm? D. 1,00 mm.	143
37	Tafel 7: Sigur 6 — Schwamm? D. 2,40 mm	<b>J44</b>
38	Tafel 8: Figur I — (Favosites) aus Knyahinya (veryl. Tafel I: Figur 4)	145
39	Tafel 9: Sigur I — Strukturbild auf links oben Tafel 8	146
40	Tafel IO: Figur I — auf Knyahinya Guerschnitt D. 0,40 mm	<b>J47</b>
<b>4</b> J	Tafel Io: Figur 2 — Längsschnitt 0,50 mm.	148
42	Tafel IO: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.	149
43	Tafel IO: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (siehe Tafel 8. 9.)	150
44	Tafel IO: Figur 5 — auf Knyahinya D. 0,30 mm.	<b>J</b> 5J
45	Tafel IO: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,80 mm	152
46	Tafel II: Sigur I — auf Knyahinya D. 1,20 mm.	153
47	Tafel II: Sigur 2 — auf Knyahinya D. 1,00 mm.	154
48	Tafel II: Sigur 3 — auf Knyahinya D. I,80 mm.	155
49	Tafel II: Sigur 4 — auf Knyabinya D. 1,20 mm.	156
50	Tafel II: Sigur 5 — auf Parnallee D. 0,80 mm	157
51	Tafel II: Figur 6 — auf Moung County D. 0,60 mm.	158
52	Tafel 12: Kigur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.	159
53		160
54	Tafel 12: Kigur 3 — auf Knyahinya D. 1,30 mm.	J6J
55		162
56		163
57	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164
58	Tafel 13: Sigur I — auf Parnallee D. 0,20 mm	165
59	•	166
60	•	167
6I	•	168
62	Tafel 13: Sigur 5 — auf Knyahinya D. 1,70 mm.	169
63	Tafel 13: Sigur 6 — auf Cabarraf D. 0,30 mm.	170
64	Tafel 14: Kigur I — Koralle D. 0,90 mm.	
65	Tafel 15: Kigur I — Koralle. Strukturbild von 14. Der linke obere	
	Teil des Präparats, Vergrößerung 300, zeigt die Knospen-Kanäle	J72
66	Tafel Id: Kigur I — auf Knyahinya D. 0,40 mm.	J73
67	Tafel 17: Kigur I — auf Knyabinya D. 2,00 mm.	J74
68	Tafel 18: Kigur I — auf Knyahinya, 4 Zauptarme durchschnitten, D.	
	2,20 mm	175
69	Tafel 19: Figur I — Crinoid, veryl. Tafel 25. I und 2.	176
70	Tafel 20: Figur I — Crinois und Boralle durchschnitten auf Anyahinya	
	D. 1,20 mm.	J77
7J	Tafel 21: Kigur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.	J78
72	Tafel 21: finur 2 — permrößertes Bild von finur I	179

73	Tafel 21: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,20 mm	180
74	Tafel 21: Sigur 4 — vergrößertef Bild von Sigur 3	181
75	Tafel 21: Figur 5 — aus Knyahinya D. 1,80 mm. (ich bemerke die	
	ähnlichkeit mit Figur I)	182
76	Tafel 21: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,30 mm. (bie Mundöffnung	
	zwischen den Armen sichtbar)	183
77	Tafel 22: Kigur I — auf Knyahinya D. 0,50 mm	184
78	Tafel 22: Figur 2 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.	185
79	Tafel 22: Figur 3 — auf Knyahinya (Titelbild) D. 1,50 mm.	186
80	Tafel 22: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,70 mm.	187
81	Tafel 22: Kigur 5 — auf Knyahinya D. 0,60 mm	
82	Tafel 22: Figur 6 — auf Knyahinya D. 1,20 mm	189
83	Tafel 23: Figur I — aus Knyahinya D. 0,90 mm	190
84	Tafel 23: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,60 mm	191
85	Tafel 23: Figur 3 — auf Knyahinya D. I,00 mm.	192
86	Tafel 23: Sigur 4 — auf Knyahinya D. I,40 mm	193
87	Tafel 23: Figur 5 — aus Knyahinya D. 1,30 mm.	194
88	Tafel 23: Sigur 6 — auf Knyahinya D. 0,60 mm	195
89	Tafel 24: Figur I — auf Siena D. 0,80 mm.	196
90	Tafel 24: Figur 2 — auf Knyahinya D. 2,80 mm.	197
91	Tafel 24: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,00 mm	198
92	Tafel 24: Figur 4 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.	199
93	Tafel 24: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,50 mm.	200
94	Tafel 24: Figur 6 — auf Cabarraf D. 0,80 mm.	201
95	Tafel 25: Figur I — auf Knyahinya D. 1,20 mm.	202
96	Tafel 25: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,20 mm	203
97	Tafel 25: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.	204
98	Tafel 25: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,60 mm	205
99	Tafel 25: Kigur 5 — auf Siena D. 1,80 mm.	206
100	Tafel 25: Figur 6 — auf Knyahinya D. 1,40 mm. (Zeide letztere	
	Ouerschnitte von Crinoiden)	207
101	Tafel 26: Figur I — auf Knyahinya D. 0,20 mm	208
102	Tafel 26: Sigur 2 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.	209
103	Tafel 26: Sigur 3 — auf Knyahinya D. 1,20 mm	210
104	Tafel 26: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,20 mm. (bis hierher gewun-	
	bene Crinoiben)	211
105	Tafel 26: Figur 5 — auf Knyahinya D. 2,00 mm	212
106	Tafel 26: Figur 6 — auf Knyahinya D. 2,20 mm. (die dunkle Linie	
	in 5 und 6 ist der Nahrungskanal)	213
107	Tafel 27: Figur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.	214
108	Tafel 27: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,50 mm.	215
109	Tafel 27: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.	
IIO	Tafel 27: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.	217
III	Tafel 27: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.	
	·	

112	Tafel 27: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 1,00 mm	219
113	Tafel 28: Figur I — auf Knyahinya (Corallez) D. 3,00 mm. auf	
	demselben Dünnschl. wie Tafel 18.	220
<b>JJ4</b>	Tafel 28: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.	
115	Tafel 28: Kigur 3 — auf Knyahinya D. 2,30 mm	222
116	Tafel 28: Higur 4 — auf Knyahinya D. 0,90 mm.	223
117	Tafel 28: Kigur 5 — auf Knyahinya D. I,50 mm.	224
118	Tafel 28: Figur 6 — auf Knyahinya D. 1,40 mm	225
119	Tafel 29: Sigur I — auf Knyahinya D. 0,20 mm	226
120	Tafel 29: Sigur 2 — auf Knyahinya D. 0,90 mm.	
121	Tafel 29: Sigur 3 — auf Tabor D. 2,10 mm.	228
122	Tafel 29: Sigur 4 — auf Knyahinya D. I, 10 mm	
123	Tafel 29: Sigur 5 — auf Borkut D. 1,50 mm.	230
124	Tafel 29: Sigur 6 — auf Knyahinya D. 1,30 mm. (zweifelhaft)	231
125	Tafel 30: Sigur I — auf Knyahinya D. 1,10 mm. (Korallez)	232
126	Tafel 30: Sigur 2 — auf Knyahinya D. 1,40 mm. (Koralle und Cri-	
	noid, vergl. Tafel 20.)	233
J27	Tafel 30: Kigur 3 — auf Knyahinya D. 0,30 mm. (Sie Arme nezförmig	
	verschlungen)	234
128	Tafel 30: Kigur 4 — auf Knyahinya D. 1,85 mm. (Unschnitt)	235
129	Tafel 30: Kigur 5 — auf Knyahinya D. 0,70 mm. (Anschnitt)	236
130	Tafel 30: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 0,40 mm. (Struktur dem def	
	Schreibersits im Meteoreisen gleich)	237
131	Tafel 31: Sigur I — auf Knyahinya D. 1,20 mm. (nicht ganz vollständis	
	gef Bild)	238
132	Tafel 31: Figur 2 — auf Knyahinya D. 0,50 mm	239
133	Tafel 31: Kigur 3 — auf Knyahinya D. 1,20 mm. (Drei übereinstim-	
	mende Formen auf 3 Dünnschliffen, in I und 2 beidemale der horizontale	
	Auffdynitt)	240
134	Tafel 31: Kigur 4 — auf Knyahinya (ob Schwamm ober Koralle?) D.	
	0,90 mm.	241
135	Tafel 31: Higur 5 — auf Knyahinya D. 1,50 mm.	
136	Tafel 31: Kigur 6 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.	
137	Tafel 32: Figur I — auf Knyahinya (Kinfchluff) D. 1,50 mm.	
138	Tafel 32: Figur 2 — Vorkutkugel D. 1,00 mm.	245
139	Tafel 32: Figur 3 — Nummulit von Kempten. Die Kanäle sind (mit	<b>A</b> 4 /
1.1.4	Ser Lupe) scharf zu erkennen	246
140	Tafel 32: Signer 4 — Dünnschliff von Liaf $\gamma\delta$ . Dieser Dünnschliff ist	
	der von mir zusammengestellten Sammlung von 30 Dünnschliffen von	
	Sedimentgesteinen entnommen, gefertigt von Geognost Fildebrand in	
	Ohmenhausen bei Reutlingen, welche ich zum Studium der mikrosko-	
	pischen Beschaffenheit der Sedimentgesteine nebst Einschlüssen dringend	A 4-
	emnfeble	247

141	Tafel 32: Kigur 5 — Kozoön canadense, angebliches Kanalsystem des	
	Еозооп	248
142	Tafel 32: Kigur 6 — besyl. Beide Gesteine, denen die Schliffe entnommen	
	sind, von mir in Little Nation gesammelt. Man vergleiche Kanalspstem	
	def Nummuliten Sig. 3 mit diesem angeblichen Kanalsystem! Bild 3 und	
	5 sollen dasselbe Ding sein. Zu Sig. 5 veryleiche Urzelle Tafel 4. 5	249

### I Einleitung

#### I.I Einleitung

Aicht die zum Teil wenig sachlichen Angrisse auf meine Urzelle waren es, welche mich in meinen Anstrengungen, gewisse neue geologische Tatsachen sestzustellen — nicht ermüden ließen: es war die durch Beobachtungen gewonnene Überzeugung von der Unhaltbarkeit der bisherigen Anschauung in dem unstreitig wichtigsten Teile der geologischen Wissenschaft, in dem Teile, durch welchen er gerade mit dem Kosmos zusammenhängt — in der Lehre von den sogenannten plutonischen Gesteinen.

Zatte ich es im ersten Teile meiner Urzelle noch mit Ergebung hingenommen, dass der Erdern und damit auch die Erkenntnis der wirklichen Entstehungs Geschichte unserer Erde uns stets verborgen bleiben werde: so bot sich doch am Schluss dieses Zuchs schon ein Ausblick: der Meteorstein zeigte die ferne Durchsahrt, welche noch von keinem Forscher gewagt worden war.

Mit diesem führer nun entschloss ich mich vorwärts zu schreiten.

Ich tat ef, begleitet auf der einen Seite von dem bald leiser bald schärfer ausgesprochenen Spotte der Jachemänner, auf der andern Seite aufgemuntert durch die früher und nun täglich neu gewonnenen Ergebnisse und unterstützt von dem Rat weniger Freunde, welche zu

überzeugen mir gelungen war.

Das was mir meine bei einem anstrengenden Beruf fast über Menschenkraft gehenden Arbeiten des letzten Jahref an Ergebnissen geliefert haben, ist in den folgenden Blättern niedergelegt.

Estift die Tierwelt in einem Gesteine, welches auf unsere Erde herabsiel und uns Kunde brachte von kleinsten Wesen aus fernsten Käumen — eine Tierwelt, welche zu erblicken ein sterbliches Auge kaum hoffen konnte: eine Welt von Wesen, welche uns zeigt, dass dieselbe Schöpferkraft, welche unsere Erde aus einem Dunstnebel hat werden lassen, überall und gleichmäßig im Weltraum gewirkt und geschafft hat.

Freilich weist das Gestein der Meteorit und zwar der Chondrit — denn diese sind's, welche ich vorzugsweise zum Gegenstand meiner Untersuchung machte, — keine Tiere höheren Zaus auf Alles sind niedere Tiere — dieselben, welche in unseren Silurschichten vorherrschen — Schwämme, Korallen und Crinoiden, und auch in ihren Spezies Merkmalen stimmen sie mit dieser Schöpfung.

Das Gestein der Chondrite, welche ich untersucht habe, ist ein Olivin-Enstatit-Gestein. Es hat von der Zeit seiner Entstehung, vom Tierknochen, bis es siel, Verwandlungen durchgemacht, aber keine erhebliche: es ist nur von einer Silicatlösung durchtränkt worden, wie alle unser Turameer-Ablagerungen von einer Lösung von Kalk. Wahrscheinlich machte es, so lange es noch ein Teil eis

nes Planeten war, noch mehr Planeten Perioden durch, wie auch den tieferen Schichten unserer Erde andere gestolgt sind, unter deren Einfluss dann die früheren eine gewisse, freilich nicht so erhebliche Umwandlung als man gewöhnlich annimmt, erfahren haben.

Wesentlich geändert hat sich nur die Obersläche des Gesteins und zwar im letzten Augenblick seines planetarischen Lebens durch den Linfluss der Reibungswärme, entstanden im Falle durch die Erdatmosphäre. Doch das Bild des urssprünglichen Gesteins ist im Wesentlichen geblieben. Wir sehen nun vor uns ein Stück Planeten wie er im Werden war, und damit ist uns die Geschichte unseres Ledförpersausgeschlossen, sosern wir ein Recht haben von der Bildung eines seiner Bewegung nach gleichartigen, in seiner chemischen Jusammensetzung gleichen Weltkörpers auf die gleiche Bildung der Lede zu schließen und umgekehrt.

Gleichzeitig war mir durch die Zusendung des "Meteorit von Ovisak" (ich verdanke ihn der Güte des Zerrn Prosessors Dr. von Nordenskjöld) Gelegenheit geboten, dieses Gestein in die Untersuchung hereinzuziehen.

Ich halte ef für irdisch — halte ef für die tiefste Schichte unserer Erde, der Olivinschichte, die unter dem Granit layert, angehörend. Ich nenne die ursprüngliche Schichte Olivin-Formation. Da das Gestein einem Meteorit sehr ähnlich ist, lay ef nahe, dasselbe für einen solchen zu erstären. Die Gründe, warum ich ef nicht für meteoritisch, sondern für den wahren Erdern halte, sind in diesem

Buche niedergelegt.

So haben wir zwei seste Punkte gewonnen, von welschen auf ein Zebel angesetzt werden kann.

Die Chondrite, ein Olivin-Feldspat-(Enstatit-)Gestein besteht auf einer Tierwelt, sie sind nicht ein Lager, nicht ein Konglomerat, sondern ein Filz von Tieren, ein Gewebe, dessen Maschen alle lebendige Wesen waren, und zwar Tiere der niedersten Art, Anfänge einer Schöpfung.

Ich konnte nun allerdings von dieser Tierwelt, welche uns in den Meteoriten erhalten ist, keine systematische Aufzählung machen: ich wollte nur nachweisen, dass sie ist — da ist. Ich bildete daher nur ganz unzweiselhaft organische Wesen ab, wobei ich mich damit begnügen musste, einerseits die Gattungen sestzustellen, welche mit unseren terrestrischen Formen übereinstimmen, andererseits die spezisisch meteoritischen Formen außusondern und beides kes künstiger Untersuchung in die Zand zu geben.

Es ist zu erwarten, dass meine Aufzählung durch weitere Forschung mit Zilse eines reicheren Materials, als
mir zu Gebot stand, bald sich vermehren und ergänzen
werde. Es mussten daher insbesondere Untereinteilungen
unterbleiben: sedes neu gefundene Wesen würde die Einteilung umgestoßen und damit die mühevolle, voreilige
Urbeit auch zur vergeblichen gemacht haben.

Dies war der Grund warum ich nur die großen Absteilungen und diese nur insoweit gemacht habe, als dies zum Verständnis der Formen beiträgt: erschöpfend und

abyeschlossen soll, das wiederhole ich, die Arbeit in dieser Richtung nicht sein.

Auch in anderer Aichtung muss ich Nachsicht in Ansspruch nehmen: in der Abyrenzung der Zauptabteilungen selbst.

Wer meine Formen nur oberflächlich überblickt, wird bald finden, dass sie eine wirkliche Entwicklungsgeschichte an die Zand geben. Alle die Übergänge vom Schwamm zur Koralle, von der Koralle zum Crinoiden sind da, so dass es wirklich zweiselhaft werden kann, will man nicht eine neue Tiergattung machen, wohin man diese Übergänge stellen soll.

In solchen Unfängen sind Irrtümer unvermeidlich, ef ist daher nur eine Forderung der Billigkeit, sie zu verzeihen. Uuch wollte ich die Veröffentlichung des Werkesnicht zu lange verzögern, und habe es daher eben so wie es setzt vorliegt, abgeschlossen.

#### 1.2 Geschichte und Überblick

Δός μοι κέντρον

Uls ich im vorigen Jahre mein Tagebuch enthaltend gewisse neue Beobachtungen über die Zusammensetzung der Gesteine unserer Erde und schließlich auch der Meteorit, niederschrieb, war mir die Wichtigkeit der letzteren für unsere Erdkunde noch nicht völlig klar.

Erst als ich durch die Angrisse der Gegner gezwungen war, die Untersuchung auff Neue in die Zand zu nehmen, trat es mir klar vor die Augen, welch' hohe Bestuung eine sorgfältige Ersorschung der Meteorit für die Geschichte unserer Erde haben müsse. Juletzt kam ich zu der Überzeugung, dass bei dem setzigen Stand unserer Erdkunde die Meteorit und nur die Meteorit den Punkt abgäben, von welchem aus unsere Erdgeschichte wenigstens mit ziemlicher Sicherheit ersorscht werden könne.

Wenn ich also in meiner Urzelle mit dem Granit die mögliche Grenze der Forschung erreicht zu haben glaubete, so wurde ich bald eines Bessern belehrt. Ich erwog, dass unser Erdern vermöge seines spezisischen Gewichts ebenfalls mindestens aus gediegenem Lisen bestehen müsse, erwog serner die sehr wahrscheinliche Reihensolge in den Meteoritn, welche vom reinen Lisen bis zu den Feldspatzgesteinen unserer Erde geht. Ich glaubte serner, dass ein Rückschluss von unserer Erde auf die Meteorit gewagt

werden dürfe, der Schluff, daff auch in den übrigen Planeten und in densenigen oder demsenigen, deren (oder dessen) Trümmer wir wohl in den hunderttausend von Preisenden Meteoriten vor uns haben, eine Reihenfolge der Schichtung vom Schweren zum Leichten bestanden habe, eine Schicht-Folge, welche wir wahrscheinlich in der Reihe vom reinen Lisen durch die Zalbeisen (Pallasit, Zainholz) hindurch zu den Chondriten und Lukriten, dann zu den Ton-(Rohle-)Meteoriten (Zokkefeld) vor uns haben.

Nachdem diese Wahrscheinlichkeit einmal gewonnen war, lay es nahe, die Meteorit einer genauen Prüfung hinsichtlich ihrer morphologischen Eigenschaften zu unterwerfen. Dies war auch in hohem Grade geboten, denn dass bisher in dieser Richtung so gut wie nichts geschehen ist, davon kann man sich durch Vergleichung meiner Abbildungen mit den etwa zwanzig dürftigen Bildern überzeugen, welche zusammen das heute vorliegende Material unserer Wissenschaft bilden. Die akademischen Schriften von Berlin, Wien, München haben se nur einige Taseln aufzuweisen, die Zeichnungen sind klein, und wie sich sosott zeigt, von den am wenigsten für diese Richtung der Untersuchung geeigneten Meteoriten und ferner wahrzscheinlich auch nicht von dem besten Teile, dem Innern, genommen.

Sollte also auch, dachte ich, meine frühere Behauptung: der Meteorstein von Knyahinya bestehe durchauf auf Pflanzen, durch meine neuen Untersuchungen sich nicht bestätigen, so wäre der Wissenschaft doch ein Dienst getan, wenn ich nur die wahre Form dieses Gesteins zur Darstellung bringen würde. Doch dieser Rückzug blieb mir glücklicherweise erspart, im Gegenteil: das Ergebnis der neuen Forschung war ein alle Erwartung weit übersteigendes — eine neue Welt tat sich auf.

Aber freilich — unsere Wissenschaft ist unyläubig — sie fordert mit Recht strengere Beweise, als ich in meiner Urzelle geboten habe ein Buch, das fast mehr im Stadium, ich möchte sagen, der Intuition geschrieben ist. — Zeute lege ich Beweise vor.

Man überblicke die Tafeln dieses Werks und es wird sofort zur Gewissheit, dass es sich hier nicht um Mineral, sondern um organische Kormen handelt, dass wir die Bilder von Tieren vor uns haben, Bilder von Tieren der niedersten Stufe, einer Schöpfung, welche zum größeren Teile wenigstens ihre nächsten Verwandten auf unsserer Erde sindet — hinsichtlich der Korallen und Trinoiden ist dies mit unbedingter Sicherheit sestgestellt: die Schwämme aber haben wenigstens eine solche ähnlichkeit mit den Kormen der Erde aufzuweisen, wie sie eben innerhalb verwandter irdischer Gattungen besteht.

So war die Entstehung hinsichtlich der Teile sestyestellt. Nun bestätigte sich aber auch bei meiner Untersuchung von 20 Chondriten (und 360 Dünnschlissen davon) die in meiner Urzelle aufgestellte Behauptung, dass das

Gestein der Chondrit nicht etwa nach Art der Sedimentsgesteine unserer Erde nur ein Schlamm sei, in welchen die Versteinerungen eingelagert sind, dass ef nicht eine Konglomeratbildung sei ihre ganze Masse ist vielmehr völlig auf organischen Wesen gebildet, wie unsere Korallenselsen. Also keine Pflanze, wie ich früher annahm, aber Pflanzentiere! Und der ganze Stein ein Leben: — ich denke, die Wissenschaft darf mir den ersten Irrtum gerne verzeihen.

Selbstredend war nun auch das Meteoreisen nochmals einer Prüfung zu unterwerfen. Zier blieb es bei meiner ersten Beobachtung.

Allerdings gestatteten mir Zeit und Umstände, insbesondere der Mangel an verfügbarem Material nicht, die Untersuchung darüber vor dieser Veröffentlichung abzusschließen. Wenn ich aber heute die erste Behauptung, dass das Meteoreisen nichts als ein Pflanzensilz sei, in der Zauptsache wiederhole, so darf ich mich doch setzt zu der Behauptung eher legitimiert ansehen, als zur Zeit, als ich die Urzelle schrieb. Beizusügen habe ich, dass ich auch im Eisen Tiersormen sand. Die Sorscher, denen die Sormen der Chondrit entgingen, welche ich abbilde, können auch übersehen haben, dass die sogenannten Widmannstätten'schen Siguren in der Tat größtenteils Pflanzenzellen und keine Kristalle sind.

Die bisherigen Untersuchungen auf dem ganzen Gebiete mit Ausnahme der Arbeit [Karl Wilhelm von]

Gümbel's in den Schriften der Münchener Akademie sind, sowohl was Genauigkeit der Beobachtung, noch mehr aber was die auf solcher Beobachtung, auf unbewiese nen Zypothesen und leeren Voraussetzungen ruhende Deutung betrifft — wenig geeignet, als eine wissenschaftliche Seststellung angesehen zu werden. So war mir in der Tat das Seld noch völlig offen, wobei ich nur bedaure, dass ich bezüglich der Eisen vorerst noch keine Vorlage machen kann.

Ich komme nun zur Schlufsfolgerung für unsere Erdende. Sind nämlich die Chondrit — also ein Olivinund Enstatit-Gestein wirklich, was ich zur Gewissheit bringe, nur Stücke von Schwamm-Korallen-Crinoiden-Selsen, so ist für die Wissenschaft unserer Erde eine Tatsache von unermesslicher Trayweite gewonnen.

Ein Feldspatmineral ist reines Wasserprodukt, ist Versteinerungsmittel für Millionen von Organismen! Damit fallen alle Zypothesen über die metamorphischen und plustonischen Gesteine unserer Erde, damit fällt die Theorie von dem seuerslüssigen Erdinnern, — wenigstens kann auf dem Gestein kein Schluss mehr darauf gezogen wersden.

Ich muss dies noch näher begründen. Die Vergleichung der Gesteine der Erde und der Meteorit zeigt, dass der Chondrit, wenigstens nach seiner chemischen Beschaffenbeit, seine allernächsten Verwandten auf der Erde hat.

Das Olivingestein unserer Erde ist als Llerzolith ein

Layeryestein, als Zasalt sehen wir es den Granit durchbrechen ich traf hier mit den Ergebnissen, welche [Gabriel Auguste] Daubrée gewonnen hatte, zusammen.

Der tieferlienende Granit ist also sedenfalls sünner als der Olivin. Ist aber das Olivingestein der Meteorit vermöne seiner Zusammensetzung ein Wassergestein, so wird ef wohl der Granit unserer Erde auch sein besteht das Olivinnestein der Meteore auf niederen Tieren, so wird dasselbe bei dem Olivingestein der Erde der Kall: es wird wohl der Schluff unf erlaubt sein, dass auch dieses Gestein unserer Erde auf seiner ursprünglichen Lagerstätte auf denselben Tieren zusammennesetzt ist, wie der Chondrit. — Und auf demselben Grunde wird auch der Granit, als jüngeref Gestein, wohl denselben Ursprung haben. Zaben wir in unserem (schwäbischen) Zasalt nur Auslaugungen auf dem ursprünglichen Olivingestein zu erblicken, so ist doch die Lagerung des Clerzoliths unter dem Granit festyestellt. Und erscheint auch dieses Gestein als eine Wasferablagerung ohne unterscheidbare Formen, so hat doch das Eisen von Ovifak solche dieses aber ist so sehr mit dem Zafalt, so innig und nicht bloß mechanisch verbunden, dass beide als ein Gestein angesehen werden müssen. Dieses ist also das ursprüngliche Olivin-Lagergestein. Damit aber ist der Annahme einer Entstehung der Erde auf feurigem Wege der wissenschaftliche Grund entzogen.

Bestand die Oberfläche der Planeten oder des Planeten in den Schichten des Olivins aus Tieren, so ist dies

felbe Schichte unserer Erde wohl auch nicht durch zeuer entstanden: wenigstens ist nicht der mindeste Grund zu dieser Vermutung mehr vorhanden, im Gegenteil, es ist anzunehmen, dass auch dieselbe Schichte der Erde eine Wasserbildung gewesen sei. — Zier tras ich nun auf die Kant-Laplace'sche Theorie.

Ich kann mir die Stoffe der Planeten (einschließlich des Wassers, welches gewöhnlich vergessen wird!) zur Zeit der ersten Massenbildung, wie [Immanuel] Kant und [Pierre-Simon] Laplace nur in Dunstform, aber freilich nicht als einen glühenden Dunst denken, sondern nur als Dunst- und Gasmasse im kalten Weltraum. Zier hat man aber den großen logischen Sehler in der genannten Theorie übersehen.

Die Massenanziehung sollte die Masse bilden! Die Wirstung sollte zugleich Ursache sein! Die Masse nämlich sollte sich durch Masseanziehung bilden, also dadurch entstehen, dass sie schon da war! Es ist zu bedauern, dass man diesen Denksehler nicht früher entdeckt hat. Die Masse kann, wenn sie da ist, sich durch Anziehung vergrößern, aber nicht dadurch werden: es ist als ob Jemand sein eigne Vater sein sollte!

Also eine andere Kraft musste die Masse bilden: diese aber konnte nur entweder die Kristallisations-Kraft oder die organische Bildungskraft sein.

Erstere reicht zur Erklärung der Planetenbildung nicht hin, und ef finden sich keine Kristalle: folglich bleibt bloß die zweite Kraft übrig — die organische. Zier erinnere ich an meine Beobachtungen der Struktur des Meteoreisens und so steht heute, für mich wenigstens, die Tatsache sest, dass der erste Unfang unserer Erde, wie der übrigen Planeten, eine organische Ursache hatte.

Erscheint der Satz auch etwas betäubend, so braucht man nur zu ganz Bekanntem zu greisen.

Erstens Die Masse der Zaustosse, welche im Unfang der Planetenbildung zu Gebot stand, reicht vollständig hin, um die Zildung auch einer Planeten-Masse auf organischem Wege zu erklären.

Zweitens lehrt die Erfahrung von heute, in welch' kurzer Zeit sich die niedersten Pflanzen und Tiere vermehren, dass ihre Zahl, also auch ihre Masse, lediglich durch die Masse der Baustoffe bedingt ist, während ihre Organisation selbst eine Ausbehnung ins Unendliche (so lange nämlich Baustoffe da sind) möglich macht.

Was dieser Erklärung entgegen zu stehen scheint, ist nur die Erdwärme und die damit in Verbindung gebrachte Erscheinung der heute noch tätigen Vulkane. Allein bezüglich dieser beiden Tatsachen ist man längst auf eine andere Erklärung, als auf ein seuerflüssiges Erdinneres, zurückgeführt. Das Wasser wirkt auf Feldspat zersetzend ein. Bei diesem Zersetzungsprozess wird Wärme frei. Die Vulkane solgen dem Meere, weil das Wasser die Gase bilden hilft, welche, von oben entzündet, das anstehende Gestein und auch nur dieses schmelzen.

Wie sollte endlich ein seuriger Erdern ohne Sauerstoff bestehen können! Und führt nicht eben auch das Dassein brennbarer Gase (denn solche sind die Ursachen der vulkanischen Erscheinungen,) insbesondere das der Schwesselgase auf organische im Erdinnern vorhandene Stoffe zurück: Zier bedarf es wahrhaft keiner neuen Beweise, sondern nur des Aufgebens gewisser Vorstellungen, welche sich der aus einigen augenfälligen Erscheinungen erregten Phantasie bemächtigt haben.

Dies sind die Schlufffolgerungen aus der Untersuchung über die Meteorit für unsere Erdbildung. Ungleich beseutender aber sind die Tatsachen, welche die Ustronomie darauf ableiten kann.

Die Dünnschliffe von 20 von mir untersuchten Meteoriten (Chondriten), von Sällen, welche über ein Jahrbundert auseinander liegen, zeigen dieselben Formen, ähnblich wie eine Leitmuschel überall in derselben Formation vorkommt dies hat schon Gümbel, wenn er die Formen der Chondrit auch nicht richtig gedeutet hat, trefflich ausgesprochen.

Diese Chondrit stammen also wahrscheinlich von einem und demselben Weltkörper, einem Planeten. Oder ist gar bei verschiedenen Planeten die Entwicklung eine so sehr übereinstimmende gewesen?

Dieser Weltkörper trägt Wassertiere, ist also im Wasser und durch Wasser entstanden, auch nicht durch Seuer vergangen, denn Spuren des Jeuers zeigen diese Gesteine

nicht: der Meteorit ist zersprungen, seine Trümmer haben nur in ihrem kurzen Weg durch unsere Utmosphäre eine I mm dicke Schmelzrinde, in Kolye der Reibungswärme, erhalten.

Die Tier-Schöpfung der Chondrit ist beinahe durchaus eine mikroskopische, Tiere sind es von 0,20 bis höchstens 3 mm Durchmesser, oft bedarf es einer Vergrößerung von 1000, um ihre zarte Struktur klar zu sehen, während bei solcher Vergrößerung unsere Petrefacten in eine gestaltlose Släche sich auflösen.

So war mir durch die erste in meiner Urzelle niedergelegte Beobachtung ein Weg geöffnet, auf welchem weite, weite Strecken unserer Wissenschaft gewonnen werden müssen.

Es bedurfte aber wahrlich gerade keiner Titanenkraft mehr, um das alte Gebäude umzustürzen, es war schon viel vorgearbeitet, nur nicht beachtet: es bedarf nur eines einzigen durchschlagenden Beweises und die Urbeit ist gestan. Überlieferungen, auf ungenügende Beobachtungen gestützt, lösen sich in das auf, was sie sind, und nun hat die Wissenschaft wieder freie Bahn.

#### 1.3 Die Bisherigen Unsichten über die Meteorit

Es folgt nun zunächst eine kurze Darstellung der bisherigen Ansichten über die Entstehung und Natur der Meteorit.

Mur die morphologischen Arbeiten über einzelne Mesteorit, von der Zeit an, als man das Mikroskop in der Geologie anzuwenden begann, sollen aufgezählt werden.

Was das Mikroskop bis setzt zur Deutung der Meteorit geliesert hat, das ist, abgesehen von den vergrößerten Olivinkristallen in [Nikolai Ivanovich] Kokscharow's Mineralien Russlands VI Band S. 4, in solgenden Schriften enthalten:

- I. Gustav Tschermak: "Sie Trümmerstruktur der Meteoriten von Orvinio und Chantonnay", vorgelegt in der Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften (Wien) am I2. November I874. (XX. Band der Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften, I. Abteilung, November-Zeft I874. Mit 2 Taseln.)
- 2. Alexander Makowsky und G. Tschermak: "Bericht über den Meteoritenfall bei Tieschitz in Mähren". Mit 5 Taseln und 2 Holzschnitten, vorgelegt in der Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse (der Kyl. Akademie der Wissenschaften in Wien) am 21. November 1878. XXIX. Band der Denkschriften der genannten Klasse.
- 3. Johann Gottfried Galle und [Urnold Constantin Peter Franz] von Lasault, vorgelegt von [Christian Friedrich Martin] Websty: "Bericht über den Meteorsteinfall bei Gnadenfrei am I7. Mai 1879". Sitzung vom 31. Juli 1879. Monatsberichte der K. preußischen Abademie zu Berlin.

Die früheren Zeschreibungen beschränken sich auf die Untersuchung mit bloßem Auge und der Lupe, sowie die chemische Analyse. Sie stimmen alle dahin überein: Die Chondrit bestehen auf einer Grundmasse mit Kuyeln von Enstatit (Bronzit), Olivin und Eisen, eingesprengtem Nickel und Chromeisen.

Eine andere Stellung nimmt ein: Gümbel: Über die in Bayern gefundenen Steinmeteoriten Sitzungsberichte der mathematischephysikalischen Klasse der K. b. Akademie der Wissenschaften zu München 1878. Zeft I, S. 14 ff. In der Beschreibung der Meteorit von Lichstädt und Schöneberg erwähnte er "Maschenstruktur" (S. 27. 46.) Allerdings spricht er auch von "Abkömmlingen zerbrochener größerer Chondren" (S. 28). Das Bedeutende seiner Beobachtungen ist auf S. 58, welche ich hier folgen lasse:

"Überblickt man die Resultate der Untersuchung dieser wenn auch beschränkten Gruppe von Steinmeteostien, so drängt sich die Wahrnehmung in den Vordergrund, dass sie, trotz einiger Verschiedenheit in der Natur ihrer Gemengteile, doch von vollständig gleichen Strukturverhältnissen beherrscht sind. Alle sind unzweisfelhafte Trümmergesteine, zusammengesetzt auf kleinen und größeren Mineralsplitterchen, aus den bekannten rundlichen Chondren, welche meist vollständig erhalten, aber oft auch in Stücke zersprungen vorkommen und aus Gräupchen von metallischen Substanzen Meteoreisen, Schweseleisen, Chromeisen. Alle diese Fragmente sind aneinander geklebt, nicht durch eine Zwischensubstanz

oder durch ein Bindemittel verkittet, wie sich überhaupt keine amorphen, glaf oder lavaartigen Beimengungen vorfinden. Nur die Schmelzeinde und die oft auf Klüften auftretenden, der Schmelzrinde ähnlich entstandenen schwarzen Uberrindungen bestehen auf amorpher Glasmasse, die aber erst beim Niederfallen innerhalb unserer Utmosphäre nachträylich entstanden ist. In dieser Schmelzrinde sind die schwerer schmelzbaren und größeren Mineralkörnchen meist noch ungeschmolzen eingebettet. Die Mineralsplitterchen tragen durchaus keine Spuren einer Abrundung oder Abrollung an sich, sie sind scharfkantin und spitzeckin. Was die Chondren anbelannt, so ist ihre Oberfläche nie geglättet, wie sie sein müsste, wenn die Künelchen das Produkt einer Abrollung wären, sie ist vielmehr stets höckerig uneben, maulbeerartig rau und warzin oder facettenartin mit einem Ansatz von Kristallflächen versehen. Viele derselben sind länglich, mit einer deutlichen Verjüngung oder Zuspitzung nach einer Richtung, wie es bei Zagelkörnern vorkommt. Oft begegnet man Stückhen, welche offenbar als Teile zertrümmerter oder zersprungener Chondren gelten müssen. Als Ausnahme kommen zwillingsartig verbundene Kügelchen vor, häusiger solche, in welchen Meteoreisenstückhen ein oder angewachsen sind. Nach zahlreichen Dünnschliffen sind sie verschiedenartig zusammengesetzt. Um häufigsten sindet sich eine erzentrisch strablig faserige Struktur in der Urt, dass von einer weit auf der Mitte nach dem sich

versüngenden oder etwas zugespitzten Teil hin verrückten Punkte auf ein Strahlenbüschel gegen Außen sich verbreitet. Da die in den verschiedensten Richtungen geführten Schnitte immer fäulen, oder nadelförmige, nie blätter, oder lamellenartige Unordnung in der diesen Büschel bildenden Substanz erkennen lassen, so scheinen es in der Tat fäulenförmige Kasern zu sein, auf welchen sich solche Chondren aufbauen. Bei gewissen Schnitten gewahrt man, dieser Unnahme entsprechend, in den senkrecht zur Längenrichtung gehenden Querschnitten der Kasern nur unregelmäßig eckige, kleinste Feldchen, als ob das Ganze auf lauter kleinen polyedrischen Körnchen zusammennesetzt sei. Zuweilen sieht es auf, als ob in einem Kügelchen gleichsam mehrere nach verschiedener Richtung hin strahlende Systeme vorhanden wären oder als ob gleichsam der Aufftrahlungspunkt sich während ihrer Bildung geändert habe, wodurch bei Durchschnitten nach gewissen Richtungen eine scheinbar wirre, stängliche Struktur zum Vorschein kommt. Gegen die Außenseite hin, gegen welche der Viereinigungspunkt des Strahlenbüschelf einseitig verschoben ist, zeigt sich die Kaserstruktur meist undeutlich oder durch eine mehr körnige Angregatbildung ersetzt. Bei keinem der zahlreichen angeschliffenen Chondren konnte ich beobachten, dass die Züschel so unmittelbar bis zum Rande verlaufen, als ob der Ausstrahlungspunkt gleichsam außerhalb des Kügelchens läge, sofern nur dasselbe vollständig erhalten und nicht etwa ein

bloßes zersprungenes Stück vorhanden war. Die zierlich quergegliederten Säserchen verlaufen meist nicht nach der nanzen Länge des Büschels in gleicher Weise, sondern sie spitzen sich allmählich zu, verästeln sich oder endigen, um andere an ihre Stelle treten zu lassen, so dass in dem Querschnitte eine mannichfache, maschenartige oder netzförmige Zeichnung entsteht. Diese Käserchen bestehen, wie dies schon vielfach im Vorausgehenden geschildert wurde, auf einem meist helleren Kern und einer dunkleren Umhüllung, jener durch Säuren mehr oder weniger zerlegbar, letztere dagegen dieser Einwirkung widerstebend. Zöchst merkwürdig sind die schalenförmigen Uberrindungen, welche auf Meteoreisen zu bestehen scheinen und in der Regel nur über einen kleineren Teil der Kügelchen sich ausbreiten. Die gleichen einseitigen, im Durchschnitt mithin als bogenförmig gekrümmte Streischen sichtbaren Uberrindungen kommen auch im Innern der Chondren vor und liefern einen starken Gegenbeweis gegen die Unnahme, dass die Chondren durch Abrollung irgend eines Materials entstanden seien, wie denn überhaupt die ganze Unordnung der büscheligen Struktur mit Entschiedenbeit gegen ihre Entstehung durch Abrollung spricht. Doch nicht alle Chondren sind erzentrisch faserin viele, namentlich die kleineren besitzen eine seinkörnige Zusammensetzung, als beständen sie auf einer zusammengeballten Staubmasse. Auch hierbei macht sich zuweilen die einseitige Ausbildung der Kügelchen durch eine erzentrisch

größere Verdichtung der Staubteile bemerkbar".

Und ferner S. 61:

"Der gewöhnliche Typus der Meteorit von steiniger Beschaffenheit ist soweit überwiegend dersenige der sog. Chondrit und die Zusammensetzung sowie die Struktur aller dieser Steine so sehr übereinstimmend, dass wir den gemeinsamen Ursprung und die uransängliche Zusammensehörigkeit aller dieser Art Meteorit — wenn nicht aller wohl nicht weiter in Zweisel ziehen können.

"Der Umstand, dass sie fämtlich in höchst unregelmäßig neformten Stückben in unsere Utmosphäre nelannen abgesehen von dem Zerspringen innerhalb der letzteren in mehrere Fragmente, was zwar häusig vorkommt, aber doch nicht in allen Fällen angenommen werden kann, namentlich nicht, wenn durch direkte Beobachtung das Kallen nur eines Stückes konstatiert ist, — lässt weiter schließen, dass sie bereits in regellos zertrümmerten Stücken als Abkömmlinge von einem einzigen größeren Zimmelskörper ihre Bahnen im Zimmelsraume ziehen und in ihrer Zerstreutheit einzeln zuweilen in das Uttraktionsbereich der Erde geraten zur Erde niederfallen. Der Mangel ursprünglicher, lavaartiger, amorpher Bestandteile in Verbindung mit der äußern unregelmäßigen form dürfte von geo- oder kosmologischen Standpunkte auf die Unnahme ausschließen, dass diese Meteorit Auswürfe von Mondvulkanen, wie vielfach behauptet wird, sein fönnen."

Gümbel fasst, nachdem er die Meteorit in die Olivingesteine unserer Erde eingestellt hat, seine Ansicht hinsichtlich der Entstehung (S. 64) in den Satz zusammen:

"Es scheinen daher die Meteorit aus einer Urt erstem Verschlackungsprozess der Zimmelskörper, aber da sie mestallisches Eisen enthalten — bei Mangel von Sauerstoss und Wasser hervorgegangen zu sein."

"So geistreich, fährt er (S. 68) fort, diese zypo» thesen Daubrée's und Tschermat's sind (Entstehung auf zertrümmertem Vulkangestein), so kann ich mich doch in Bezug auf die Entstehung der Kügelchen (Chondren) ihrer Ansicht auf Grund meiner neuesten Untersuchungen nicht anschließen. Ich habe im Gegensatze zu Tschermat's Unnahme nachzuweisen nesucht, dass das innere Gefüne der Chondren nicht außer Jusammenhany mit ihrer Luyeligen Gestalt stehe, und dass man diese Kügelchen weder als Stücke eines Mineralkristalls, noch eines festen Gesteins ansehen könne. Spricht schon ihre nicht geglättete, nicht polierte Oberfläche, welche, wenn durch Abreibung oder Abrollung gebildet, bei solcher Zärte des Materis alf spiegelylatt sein müsste, während sie rauh, höckerin, oft strichweise kristallinisch facettirt erscheint, gegen die Ubreibungstheorie, so ist auch yar kein Grund einzuseben, weshalb nicht alle anderen Mineral splitterchen wie Sandkörner abgerundet seien und weshalb namentlich das Meteoreisen, das Schwefeleisen und das sehr harte Chromeisen, wie ich in dem Meteorit von L'Aigle mich

überzeugt habe, stets nichtgerundete, oft äußerst sein zerschlitzte Formen besitzen. Wie wäre es zudem denkbar, dass, wie häusig beobachtet wird, innerhalb der Kügelchen konzentrische Anhäusung von Meteoreisen vorkommenz Auch erscheint die erzentrisch saserige Struktur der meisten Kügelchen in ihrem einseitig gelegenen Ausstrahlungspunkte in Bezug auf die Obersläche nicht als zufällig, sondern der Art der Struktur der Zagelkörner nachzebildet. Dieses innere Gefüge steht im engsten Zusammenhang mit dem Akt ihrer Entstehung, welche nur als eine Versichtung Mineral bildender Stosse unter gleichzeitiger drehender Bewegung in Dämpsen, welche das Material zur Fortbildung lieserten, sich erklären lässt, wobei in der Richtung der Bewegung einseitig mehr Material sich ansetzte."

Weiter freilich spricht Gümbel sich dahin auf, dass das Material, auf welchem die Chondrit bestehen, durch eis ne gestörte Kristallisation und Zertrümmerung in Folge von explosiven Vorgängen innerhalb eines Raumes sich gebildet habe, welcher von den die Mineralien bildenden Stosse liesernden Damps und Wasserstossgasen erfüllt war. Er schließt S. 72 bei Besprechung des Meteorites von Kaba:

"Vielleicht gelingt es dennoch, die Anwesenheit organischer Wesen auf außerirdischen Körpern nachzuweisen." Ich hoffe dies sei gelungen. — Auf seinen Abbilduns gen ersieht man, dass bei der Untersuchung ein schlechtes Material zu Gebot stand. Auch hätten immerhin mehr Dünnschliffe gesertigt werden müssen, zudem reicht die Vergrößerung bei Weitem nicht. Ich verweise hier auf das Folgende und die Beschreibung meiner Taseln.

Was ich in dem Berichte Gümbels so hoch schätze, ist die gewissenhafte vorurteilsfreie, ich möchte sagen unparteilsche Beobachtung. Ich habe mir erlaubt, die Schrift Gümbels wörtlich anzuführen, weil es mir in der Tatschwer wird, solche Darstellungen zusammenzufassen und Tatsachen und Deutung zu trennen.

Richtige Beobachtungen und unrichtige Erklärungen stehen so nahe beisammen, dass ef unmöglich ist beides zu sondern. Ich glaubte, als ich die Gümbel'sche Abhandlung (nach dem Abschluss meiner Untersuchungen und meine Manuskripts) durchlas, in sedem Augenblick auf meine Resultate zu treten. Aber wie die Woge der Brandung den, welcher das Land gewinnen will, sedes mal dann wieder ergreift und zurückwirft, wenn er schon das Land gefasst zu haben glaubt, so auch hier: allemal reißt das alte Dogma den geehrten Forscher von der rettenden Klippe hinweg in den bodenlosen Strudel der Traditionen zurück.

Daubrée's verdienstvolles Werk Experimentalgeologie erhielt ich erst in der Übersetzung zur Zand und ebenfalls nach Abschluss meiner Arbeit. Dass es diese widerlegte, wird wohl Aiemand sinden. Daubrée hat selbst Knyahinya abgebildet. M. hat gepresst, geschmolzen, aufgelöst,

berechnet, nur nicht — gesehen.

#### 1.4 Die Meteorit und ihre Mineralogischen Eigenschaften

Die Literatur der Meteorit ist eine sehr umfangreiche. Sie ist sedoch, was die Urt und Jahl, chemische Jusammensetzung betrifft, so bekannt, dass ich auf diesen Teil derselben, also insbesondere die früheren Urbeiten, nicht einzugehen brauche.

Die Meteorit werden eingeteilt in Lisen und Steine, zwischen beiden steht jedoch noch eine Klasse: Zalbeisen, d. h. eine Verbindung von gediegenem Lisen und Stein— die Pallasit. Während die Lisen eine ziemliche Übereinstimmung, sowohl in ihrer chemischen Zusammensetzung, als in der Form ihrer Struktur zeigen, sind die Pallassit (je nach dem Vorwiegend des Lisens) sehr verschieden. Über es sinden sich noch weitere Verschiedenheiten darunter. Zainholz z. Z. hat neben Lisen und Olivin ein blaues Mineral (Lustatit) und in diesem einen großen Reichstum von Tierformen. — Die Steine werden eingeteilt in Chondrit, Stannerit [eukriten], Luotolarer [howarditen], Zokkefelder [karbonatisch], Zishopvillit [aubriten], (Ouenstedt, Klar und Wahr S. 280 folg.)

Ich habe mich vorzugsweise mit den Chondriten beschäftigt und, wo ich von Meteoriten rede, rede ich von dieser allerdings auch am zahlreichsten vertretenen Klasse von Stein-Meteoriten.

#### Ich habe untersucht:

Tabor, Zöhmen [Tschechische Republik]	July 3, 1753
Siena, Toskana [Italienische Republik]	June 16, 1794
L'Aigle, Normandy [Französsische Republik]	Upril 26, 1803
Weston, Connecticut [Vereinigte Staaten]	December 14, 1807
Tipperary, Irland	November 23, 1810
Blansko, Brünn [Tschechische Republik]	November 25, 1833
Château-Aenard, Loiret [Französische Republik]	July 12, 1841
Linn [Marion] County, Jowa [Vereinitte Staaten]	February 25, 1847
Cabarras [Monroe] County, North Carolina (Vereinigte Staaten)	October 31, 1849
Mező-Mabaraf [Romanía]	September 4, 1852
Borkut, Unyarn	October 13, 1852
Bremervörde, Jannover [Deutschland]	May 13, 1855
Parnallee, Osten Indien [Tamil Nadu]	Sebruary 28, 1857
Seredia, Kostarika	Upril I, 1857
New Concord, Ohio [Vereininte Staaten]	May I, 1860
Knyahinya, Unyarn	June 9, 1866
Pultust, Warschau [Republik Polen]	January 30, 1868
Orvinio [Italienische Republik]	August 31, 1872
Simbirft [Auffland]	[1838]

Alle Gesteine sind durchaus beglaubigt. Ich habe hier vor Allem der Liberalität meines verehrten Lehrers, Zerrn Prosessor Dr. [Friedrich August] von Quenstedt, mit welcher er mir die vorzügliche Tübinger Universitäts Sammlung (welche bekanntlich zum größten Teil vom Freiherrn [Karl Ludwig] von Reichenbach in Wienstammt) dankend zu gedenken.

Von Knyahinya besitze ich 360 Dünnschliffe, von L'Aigle 6, von Pultust 6, von den übrigen I.3. Ich werde sämtliche Steine kurz nach dem Fallort benennen. Bei Zerstellung der Dünnschliffe habe ich die Schnitte in 2 Richtungen genommen. Es ergab sich nämlich nach mehreren Versuchen an Knyahinya, dass derselbe nach einer bestimmten Richtung bricht.

Es konnte dies aus den Linschlüssen entnommen wersden, welche, nachdem einmal die Stellung gefunden war, regelmäßig bestimmte Kormen Durchschnitte ergaben, welchen dann die Kormen in einem senkrecht auf diese Stellung gesertigten Schnitte entsprachen.

Waren die Formen an diesem Steine gestellt, so wäre wohl dieselbe Stellung in den übrigen Steinen zu erhalten gewesen, vorausgesetzt natürlich, dass das Material zu Gebot gestanden hätte. Zei einzelnen ergab sich dieselbe zufällig — bei anderen nicht, es musste aber auf den angeführten Gründen auf weitere Feststellung in dieser Richtung verzichtet werden.

Ich fertigte ferner die Schliffe absichtlich in dreierlei Dicke: schwer durchsichtig, um die ganzen Linschlüsse möglichst vollständig zu bekommen: sehr dünn, um die Strukturverhältnisse klar zu stellen den größten Teil aber so, dass beides noch zur Unschauung kam.

Ich reihe hier eine Bemerkung an, welche mir Jester bestätigen wird, welcher sich mit Dünnschliffen von Petrefacten beschäftigt hat.

Mur in seltenen Fällen ist in völlig durchsichtigen, also ganz dünnen Schliffen, noch die Struktur sichtbar. Wer seinen Schliff, wenn er halbdurchsichtig, im Mikroskop betrachtet, ist im höchsten Grad erfreut über die schönen Formen und Linien. In der Freude darüber will er die Sache noch besser machen und erwartet bei fortgesetzetem Schleisen ein vollendetes Bild. Aber wenn er den

Schliff zum zweiten Mal unter das Mikroskop legt—
ist nichts mehr da als eine fast strukturlose Fläche, kaum
angedeutete, sogar in den Umrissen verschwommene Formen, aus welchen nun das, was man vorher schon mit
der Lupe wahrnahm, nicht einmal mehr mit dem Mikroskop zu ersehen ist. Diese Erscheinung hängt aber mit
der Art der Metamorphose des Gesteins und der darin
eingeschlossenen Formen zusammen. Die Sache ist sedoch
bekannt und bedarf des halb keiner weiteren Aussührung.
Ich musste der Tatsache nur des halb erwähnen, damit
solche, welche Beobachtungen erst anstellen wollen, ohne
dass sie dieselbe kennen, nicht überrascht werden und ihre
Beobachtungsweise verbessern können.

Dass die Chondrit zum größten Teile auf Bronzit-Enstatit (Augit) und Olivin sowie Magnetkies bestehen, ist eine in der Wissenschaft angenommen Tatsache. Quenstedt, Zandbuch der Mineralogie S. 722.

Insbesondere aber sind die Linschlüsse, welche ich für Korallen erkläre, für Lnstatit angesprochen worden. Damit glaubte man die Struktur derselben erklären zu können. Undere gingen noch weiter und erklärten die Linschlüsse zum Teil für Gläser: (Tschermak).

Ehe ich also an die Begründung meiner Ansicht komme, muss die mikroskopische Erscheinung des hauptsächlich vorkommenden Minerals, des Enstatits, genau sestgestellt werden.

Ich erlaube mir hier Kürze halber dassenige an-

zuführen, was [Karl Zeinrich Ferdinand] Rosenbusch in seinem Buch: Mikroskopische Physiographie der pertrographisch wichtigen Mineralien Stuttgart 1873 S. 252, über Enstatit (und Bronzit) sagt:

"Bekanntlich hat man seit den optischen Untersuchungen von Alfred Des Cloizeaux den Enstatit, Bronzit und Zypersthen als rhombisch kristallisierend vom Dyroren netrennt und sie in eine einene Gruppe zusammennestellt. Dieselben zeigen neben der Spaltung nach dem Prisma von 87° noch weitere Spaltungen nach den vertikalen Pinakoiden, über deren relative Vollkommenheit die Ungaben der verschiedenen Forscher nicht genau übereinstimmen. Chemisch bilden diese 3 Mineralien eine ununterbrochene Reihe, an deren Unfange der fast eisenfreie Enstatit und an deren Ende der sehr eisenreiche Zypersthen steht. Enstatit und Bronzit sind sich überdies auch in allen physikalischen Einenschaften so ähnlich, dass eine Trennung derselben in zwei Spezies kaum durchzuführen sein dürf te. Der Zypersthen danenen zeint eine verschiedene optische Orientierung und mag daher immerhin eine eigene Spezies bilden. Interessant ist die von Tschermak gegebes ne Zusammenstellung der negativen Winkel der optischen Uchsen und des Lisenzehaltes der drei genannten Mineralien, wobei ef sich ergibt, dass mit zunehmendem Gehalte an SeV der Winkel der optischen Achsen stetin abnimmt. Die Mikrostruktur aller Mineralien der Enstatit-Gruppe ist im Allyemeinen eine so ähnliche, dass im speziellen Kalle eine sichere Entscheidung unter ihnen nur durch chemische und genaue optische Unalyse gegeben werden kann."

"Enstatit und Bronzit sinden sich in den Gesteinen nicht als Kristalle, sondern fast nur in unregelmäßig begrenzten Kristallkörnern, welche meistens eine sehr dichte Streifung erkennen lassen, die bei dem Enstatit mehr geradlinig, bei dem Bronzit mehr sanst wellig gewunden verläuft. Doch ist dieser Unterschied kein durchgreisender. Die gleiche Streifung zeigt auch der monokline Diallag und der rhombische Bastit, der sich aber durch andere, später zu besprechende, optische Erscheinungen nicht unschwer vom Bronzit trennen lässt. Traf der Schliss den Enstatit oder Bronzit stark geneigt zu seiner Zauptspaltungsstläche, so ist die Obersläche nicht in gleicher Weise seinsassen, sondern treppensörmig rauh. Guerliegeende Absonderungsstlächen und Zierbrechungen sind nicht selten."

"An fremdartigen Linlagerungen sind beide verhältnismäßig arm sa sie sehlen z. Z. im Enstatit aus dem
Pseudophit des Aloysthals in Mähren und in manchen
Enstatiten oder Bronziten der Lherzolithe und Olivinselsen ganz. Ersterer ist nur von häusigen Adern des Pseudophit durchzogen, von welchen aus in senkrechter Richtung
seinfaserige Zersetzungsprodukte in den Enstatit eindringen. Andere Vorkommnisse und selbst andere Individuen desselben Zandstücks enthalten dagegen oft massenhafte
Einschlüsse von grünen oder braunen Lamellen, Leistchen

und Körnern (se nach der Lage der Schlissebene), welsche ausnahmslos der vollkommensten Spaltungsrichtung parallel gelagert sind. Der Gedanke liegt nahe, dass die verschiedenen Ungaben über die relative Vollkommenheit der pinakoidalen ( $\infty p_{\infty}$ ) Spaltung gegenüber der prismatischen vielleicht auf die mehr oder weniger massenhafte Unwesenseit dieser Interpositionen zurückzuführen seien, die zweisellos auch den Metalloiden Schiller auf dem Bradhypinakoid bedingen. Dann wäre aber die Leichtigkeit der Trennung in der genannten Richtung mehr eine Abssonderung, als eine eigentliche Spaltbarkeit."

"Der Enstatit ohne und der Bronzit mit metallischem Schimmer auf der brachypinakoidalen Spaltungsfläche sinden sich in Serpentinen von Moysthal in Mähren (Enstatit) und Mont Brésouars in den Vogesen, in den Lherzolithen und Olivinselsen, in manchen Olivingabbros, in Streng's Enstatitsels vom Radauthal bei Zarzburg und in den Olivindomben des Dreiser Weihers, sowie in manchen Meteoriten also stets in Gesellschaft des Olivin und in veränderten Olivingesteinen."

Für diesenigen, welchen das Buch nicht zu Gebote steht, gebe ich 2 Abbildungen, die eine von Bronzit vom Kupsferberg Tafel I. I, die andere von Enstatit von Texas Tafel I. 2, welche mit den Rosenbusch'schen ziemlich überseinstimmen.

Was den Olivin betrifft, so bedarf es keiner Abbildung, da die Formen dieses Gesteins durch Iirkel vollständig

erschöpft sind. Es genügt zu sagen, dass reiner frischer Olivin keine Struktur zeigt. Struktur zeigt der Olis vin bloß, wenn man seine Linschlüsse oder Unwachstellen des Kristalls oder Zersetzungserscheinungen (Serpentinbildung) Struktur nennen wollte. Über sicher findet sich in keinem Kristall etwas, was meinen Formen auch nur ähnlich sieht. Was die Behauptung betrifft, die Kugeln seien Gläser, so wird nicht einmal unterschieden, welche che mische Zusammensetzung diese Gläser gegenüber Enstatit, Bronzit und Olivin haben sollen. Offenbar werden als le formen zusammen geworfen und für Gläser erklärt, obyleich Enstatit nach Quenstedt (Mineralogie S. 318) unschmelzbar, nach Naumann-Zirkel S. 585 wenigstens schwer schmelzbar ist. Es wird sogar behauptet, dass diese Gläser erst im Kallen entstanden seien. Allein Keuereinwirkungen sinden sich bloß in der Ainde. Die Schmelzrinde der meisten Meteoriten hat kaum 2 mm Durchmesser.

Die Behauptung, ef seien Gläser, wurde der Mitteilung meiner ersten Dünnschlisse entgegengehalten und dabei auf die ähnlichkeit der meteoritischen Form mit solchen
Gläsern in dem Gesteine unserer Erde hingewiesen. So
wurde ich von [Ferdinand] Zirkel auf einen SphaerulitLiparit verwiesen, dessen Abbildung ich Tasel I. Sigur 3
gebe. Diese Form sollte dartun, dass meine Urania eine
Täuschung sei. Ich halte die Form im Liparit für eine Kristallit-Bildung (wahrscheinlich Zeolith). Nun betrachte man die Strukturbilder daneben Tasel I, Sigur

4, 5, 6!

Unsere Forscher, mit Ausnahme Gümbels, sprechen von den Meteoriten als vulkanischen Bomben, erklären das Gestein als identisch mit dem Vulkangesteine der Erde, zählen also den Meteorstein ohne Bedenken zu den vulkanischen. Der Gegenbeweis ist der Gegenstand dieses Buchs.

Richtig allein hat Quenstedt die Frage für eine offene erklärt und gesagt: es sei dem Mikroskop vorbehalten, das Rätsel der Jusammensetzung der Meteorit zu lösen! Zandbuch der Mineralogie S. 722.

# 2 Die Organische Natur der Chondrit

### 2.1 Organisch oder Unorganisch?

Um den Beweis zu führen, dass ein pflanzlicher oder tierischer Organismus vorliege, halte ich für notwendig darzutun:

- I. eine geschlossene Form,
- 2. eine wiederkehrende form,
- 3. wiederkehrend in Entwicklungsstufen,
- 4. Struktur und zwar entweder Jellen oder Gefäße,
- 5. ähnlichkeit mit bekannten formen.

Sind diese Erfordernisse da, so bleibt nur noch zu entscheiden, ob Pflanze oder Tier? Tun fragt sich, erfüllen meine Formen diese Forderungen?

Ich glaube, ehe ich an den positiven Beweis gehe, den negativen Beweis führen zu sollen.

Der Zeweis nämlich, den ich für das Dasein organischer Wesen antrete, ist ein doppelter: ein negativer, indem ich dartue, dass die meteoritischen Formen nicht dem Mineralreich angehören: ein positiver, indem ich die Übereinstimmung derselben mit den Formen unserer Erse, sei ef lebender oder ausgestorbener, begründe: das erste also, was zu beweisen, ist der Satz:

Die Linschlüsse der Meteoriten sind keine Mineralbildungen.

- I. Unsere Mineralogen erklären die Einschlüsse der Chondrit für Enstatit, Bronzit, Olivin.
  - Olivin hat keinen sichtbaren Blätterbruch, Enstatit und Bronzit einen deutlichen. Ich bilde einen Bronzit von Kupferberg, Tafel I. I. einen Enstatit von Texas, Tasel I. 2. (Dünnschliff bei 75 facher Vergrößerung) ab. Sigur 2. zeigt einen der besten Blätterbrüche. Man vergleiche nun damit zuerst Tassel I. Sigur 4, einen Teil eines Favositen des Meteorssteins von Knyahinya (etwa 250 mal vergrößert) und man wird wohl nicht mehr davon reden, dass der Blätterbruch die Ursache der Strukturerscheinungen der Chondrit sei. Nun betrachte man aber noch sämtliche Taseln und es wird diese Erklärung ein für allemal abyetan sein.
- 2. Wenn die Einschlüsse der Chondrit nach der bisherigen Deutung aus Enstatit oder Olivin bestehen, oder wenn es Gläser wären: wie wäre es, frage ich, möglich, dass dasselbe Mineral oder Glas im Ganzen in so verschiedenen Formen (Umrissen und Strukturen), und verschiedene Minerale in so scharf überein

stimmenden Formen auftreten? Man betrachte einmal einen Zypersthen, eine Zornblende, einen Augit! Absgesehen von einigen sichtbaren, leicht zu erklärenden Einschlüssen — (und um diese handelt es sich sa hier nicht) immer dasselbe Bild! Von höchstens 3 Mineraslen hundert verschiedene Bilder!

Das Mineral ist einfach, muss seinem Zegriff nach einfach sein und daher stets das Zild einer homogenen Masse (fläche) geben, höchstens mit einigen Linschlüssen. Wie sollte nun dasselbe Mineral in so verschiedenen Strukturen, dabei in so übereinstimmenden von den Kristallsormen abweichenden Umrissen vorskommen?

3. Die Minerale sind entweder kristallisiert oder nicht kristallisiert. — In dem ersten Justand haben sie bestimmte gesetzmäßige also wiederkehrende Kormen: sie rühren von Klächen, welche im Durchschnitt sich als gerade Linien prosizieren. Diese Kormen (Linien und Winkel) sind wiederkehrend, wechseln bloß der Größe, nicht dem Verhältnis nach. Solche Kormen sinden sich unter den von mir als organisch angesprochenen Kormen nicht. Zier ist keine Korm mit einer Kläche oder mit einem Winkel Alle sind Kugeln, Ellipsen mit Abweichungen von der mathematischen Korm, Abweichungen, welche aber doch konstante sind. Also ganz abgesehen von der übereinstimmenden Struktur, zeint sich eine Konstanz der

Umrisse, aber andere Formen als die Kristallformen des Enstatits, des Olivins sie geben müssten.

Allerdings kommen seltene, kleine Stellen mit wirklichen Kristallen vor, aber in einer Weise, welche durchauf auf den Beweiswert dieser Tatsachen nicht einwirkt. Zierüber siehe unten und Tasel 32. Sigur 2.

4. Waren die Minerale ursprünglich kristallisiert, haben aber durch mechanische Gewalt ihre Kristallisorm verloren, so ist die einzige Sorm, welche hier sich wiederholen könnte, die Kugel oder eine dieser sich nähernde Sorm, etwa die Ellipse. Zier wäre eine Wiederholung möglich, ohne dass auf der Sorm ein Schluss gezogen werden könnte. In den Rollsteinen schneidet die Obersläche den Körper in einer Weise, dass sofort die Einwirkung der mechanischen Gewalt hervortritt, — insbesondere werden Einschlüsse ganz willkürlich getrossen.

In den Meteoreinschlüssen aber ist die Struktur im Stein stets, ich möchte sagen: symmetrisch, im Eineklang mit den Umrissen.

5. Zei Verwitterung von Kristallen ändern sich die Schichten von außen nach innen — konzentrisch: — von Verwitterung aber ist keine Spur in den Linschlüssen der Chondrit zu sehen und die Strukturen sind stets erzentrisch.

6. Was die Einschlüsse der Mineralien betrifft, so können diese se nach ihrer Beschaffenheit verschies dene Bilder geben. Es kommen ganz willkürliche Formen der Linlagerung vor, wie Glas-Slüssigkeitselisselchlüsse, Kristalliten.

Wo aber ein Formengesetz in der Linlagerung aufetritt, richtet sich dieses stets nach der Kristallform. Beides trifft bei den Meteoritsormen nicht zu. Keine Spur von Linlagerung nach einer Kristallform!

7. Ein Blätterbruch wird nur sichtbar, wenn durch medanische Gewalt Spalten und nun Lichtbrechungserscheinungen auf den Spaltungsflächen entstehen. Ohne diese ist er nicht wahrnehmbar. Spaltungsflächen sind nicht da, Lichtbrechungserscheinungen zeigen die Meteorit-Linschlüsse auch nicht, bloß "Linstäubungen".

Es sinden sich in den terrestrischen Mineralien Interpositionen parallel mit dem Blätterbruch eingelagert: diese zeigen die Meteoriten nicht.

Ich glaube, der Unblick meiner Formen wird eine weitere Auseinandersetzung über ihre Verschiedenheit von Mineral und insbesondere von Kristallbildern nicht notwendig machen.

8. Es ist aber soviel von Kristalliten, von Kristallkonkretionen gesprochen worden.

für solche wurden die Enstatit-Bronzit-Olivin-

Rugeln bisher gehalten. Gümbel wies dementyes gen darauf hin, dass es keine Rugel gebe, wo der Mittelpunkt nicht erzentrisch liege!

Zier gerade tritt der wesentliche Unterschied zwischen den Meteoritsformen und den Kristalliten recht deutlich hervor.

Die Kristalliten legen sich stets um einen Punkt (konzentrisch) an. Die Formen in den Meteoriten sind alle elliptisch und birnensörmig: wenn die äußere Form aber auch kugelig ist, sind die angeblichen Einschlüsse erzentrisch geordnet und zwar liegt der Mitstelpunkt an der Peripherie, (sogar senseits derselben, nämlich dann, wenn er weggeschlissen ist, was Gümbel übersah) — eine Erscheinung, welche nie im Mineralreich vorkommt. Es ist eben die Bedingung der Kristalliten d. h. Kugelbildung, dass die Kristalle um Einen Kristall gleichmassig sich anlegen, wodurch dann notwendig die konzentrische Form entsteht.

Wären also die Kuyeln in den Meteoriten Kristallisten, so müssten sie, wenigstens nach dem Gesetz der Erde, konzentrische Bildungen ausweisen.

9. Schließlich muss ich einen Widerspruch aufzeigen, in welchen die Wissenschaft mit sich geriet, wenn sie die Struktur der Chondriten aus der Mineral-Ligenschaft erklären wollte. Dies ist das optische Verbalten dieser Linschlüsse.

Wären sie Kristalle und wäre der Blätterbruch (freilich Olivin hat keinen, und doch sinden sich auch
in den angeblichen Olivin-Kuyeln Strukturen, also
Blätterbruch!) die Ursache der Struktur, so müsste das Mineral notwendig das Licht brechen. Bei
den meisten der Einschlüsse zeigt sich aber keine Lichtbrechung, nicht einmal Aggregat-Polarisation!
So können sie also weder einsache Mineralien noch
Kristalle sein, am allerwenigsten ließe sich die Struktur aus Blätterbrüchen erklären. Diese Tatsache, das
optische Verhalten, sollte allein schon zur richtigen
Deutung geführt haben.

All diese Beweise sind freilich dem Botaniker und 300logen fremd, während sie seder Mineraloge kennt: daher muss ich diesen bitten dem Kollegen Botaniker und 300logen das eben Vorgetragene zu bestätigen, zu bestätigen was meine Lichtbilder zeigen: Diese Formen sind keine Mineralsormen. Damit hat der Mineraloge seinen Anteil an der Arbeit getan und nunmehr geht sie in die Zand des Paläontologen, oder richtiger des Joologen über und es beginnt die positive Beweissührung.

### 2.2 Die Linzelnen formen: Schwämme — Urania

Aundlappige Körper mit deutlicher Unwachsstelle. Tafel 2. gibt ein größeres Normalbild einer Urania (vergleiche Tasel 5. Sigur I, dasselbe Bild). Man sieht hier: die Gesamtsorm scharf, den äußersten Lappenrand angeschnitten (weis links), die Salten, welche beim Jusammenziehen entstehen, die Unwachsstelle. Noch deutlicher ist letztere mit Kelch, Tasel 4. Sigur 3.

Urania spiralförmig zusammengelegt Tafel 3. Figur 5, 6.

In der Windung begriffen Tafel 4. Sigur I: die Struktur besteht in einer Außenhaut über lamellaren Schichten Tafel 3. Sigur 4. Tafel 4. Sigur 6 (letztere mit der Lupe zu betrachten). Mittlerer Durchmesser Urania I mm, Farbe smalteblau.

Diese Struktur wurde für den Blätterbruch des Bronzits gehalten! Ob Tasel 4. Sigur 4 zu den Uranien gehört, ist zweiselhaft. äußern Korm und Karbe sprechen dafür. Die Anschnitte an beiden Seiten zeigen deutliche Struktur.

Tafel 5. Sigur 5 zeigt vollständig gewundene Lappen. Entweder ist ef ein Körper spiralförmig aufgewunden oder sind ef mehrere Lappen, von welchen der äußere die inneren mantelartig umgibt.

Tafel 4. Sigur 6 ist ein Querschnitt, welcher allerdings wenig zeigt. Im Obsekt selbst sieht man den Durchschnitt der Außenhaut weis.

Tafel 5. Sigur 2 zeigt so deutliche Schichtung, dass wenn die äußere Sorm nicht wäre, man versucht sein könnte, die Sorm zu den Korallen zu stellen.

Tafel 4. Sigur 5 zeigt Querschnitte durch beide flügel der Lappen.

Tafel 6. Sigur 3 Lamellen-Struktur. Sigur 5 und 6 können auch die einfachsten Crinoiden sein, deren Arme sich an einander angelegt haben. Sinsichtlich des Übergangs der Formen in andere muss ich auf das betreffende Kapitel verweisen.

Um rätselhaften ist Tasel 6. Sigur I und 2. Bei Sigur I ist die matte Stelle im Präparat gelb, die gestreiste blau. Ich habe sie neben Sigur 2 gestellt, diese zeigt deut lich zwei Lappen, welche wie zwei Muschelschalen an einer Stelle verbunden sind und beim ersten Anblick auch vollkommen den Lindruck eines Zweischaligen machen. (List ist nicht ein blosser Anschnitt.) Denkt man an Muscheln, so könnte die matte Stelle von Sigur I der Steinkern sein. Allein die Struktur ist eben Uranienartig.

Tafel 5. Kigur 3. 2 Individuen zeigen die Struktur überauf deutlich, ebenso die Unwachsstellen. In Kigur 4 (welche ein schlechtes Bild gibt) legen sich mehrere Individuen fächerartig aneinander.

Bei Tafel 3. Higur 3, IV. I, 2 glaubt man oben eine runde Mundöffnung angedeutet zu sehen.

Ziernach halte ich die Urania für einen festgewachsenen Schwamm, welcher sich spiralförmig zusammenzieht, hiebe Wasser einsaugt und austreibt, wie unsere lebenden Schwämme.

Urania nimmt etwa 3/20 der Gesteins-Masse ein.

### 2.3 Die Linzelnen formen: Schwämme — Nadels Schwämme

Tafel 7. Die Formen figur I, 2, 3, 5, 6 zeigen ein Maselnerüste. Figur I stelle ich zu Ustrospongia. Die Madeln liegen regelmäßig gekreuzt. Figur 6 ist ein unregelmäßis ges Nadelgerüste mit einem Johlraum, welchen das Bild allerdings sehr schwach andeutet. Diese beiden Formen scheinen mir unzweiselhaft zu sein.

Unnäherns sicher sind Figur 2 und 5 (in Figur 2 ist der weiße Strich ein Gesteinsriss).

Die Korm Kinur 4 habe ich bei der Zusammenstellung der Tafeln für einen Schwamm gehalten. Nachdem eine änderung der Unordnung nicht mehr möglich war, erkannte ich in dieser Korm den schiefen Durchschnitt eines Crinoiden und was ich Anfangs für Nadeln hielt — als feine Crinoidenarme. Ich bemerke, dass die Bestimmung sehr schwierig ist wegen der außerordentlich einfachen meteoritischen Crinoidenformen, weshalb eine Entscheidung weiterer Untersuchung aufgespart bleiben muss. Es lässt sich der Zohlraum der Schwammnadeln mit dem Nahrungskanal der Crinoidenarme verwechseln, wenn letztere gerade gestreckt liegen und die Glieder nicht mehr deutlich erhalten sind. Diese Tatsache, so wenig angenehm sie für den Untersucher der einzelnen Formen ist, ist um so lohnender für densenigen, welcher dem Zusammenhang der Kormen nachgeht — für den Nachweis der Entwis

Eelung einer Form auf der andern. Es reicht immer eine an die andere hin. In günstigere Lage versetzen uns

### 2.4 Die Einzelnen formen: Die Korallen

Zier haben wir so wohl erhaltene terrestrische Formen, dass ein Zweisel nicht übrig bleibt.

Tafel 8. zeigt ein Musterbild, Tafel 9. dessen Kanalstruktur: deutliche Knospen-Kanäle, welche die Röhren (denn solche sind es) verbinden. Dazu kommt die mit einem Blätterbruch absolut nicht zu verwechselnde Kurvenrichtung der Kanäle, dazu kommen die ganz deutlichen Röhrenöffnungen und endlich die ebenso deutliche Unwachsstelle. (Tasel I. Sigur 4 zeigt ein noch schärferes Bild desselben Obsekts.) Leider geben Färdungen des Präparats dem Struktur-Bild Tasel 9. widerwärtigen Schatten. Die Knospen-Kanäle stehen 0,003 mm von einander ab. Gewiss alles, was man von einer Struktur eines Savositen verlangen kann.

Tafel IO. Higur 3, 4 zeigen uns das Zild des Favosites multisormis auf dem Silur so, dass man hier auch nicht einmal Spezies zu trennen vermöchte.

Auf Tafel II. in Sigur I, 2, 3 (wo 2 auch die Anwachsstellen zeigt) wird seder Forscher das Bild lebender Korallenformen leicht erkennen, umso mehr als in Sigur I oben noch die Becherform (Johlraum) angedeutet ist. Dasselbe Obsekt zeigt ferner in den Röhren Ouerscheidewände, die klar hervortreten. Leider ist ein Teil des Bildes in Folge der gelben Färbung des Präparats in der Photographie durch Schwarz verdeckt.

Tafel IO. Sigur I und 2 zeigen weniger gut erhaltene Quere und Längsschnitte, doch hebt die ganz gleiche Wiederholung beider in mehreren Schlissen den Zweisfel daran, dass es organische Formen sind, und sind es solche, so können es bloß Korallen sein. Sigur 3 scheint eine Zecher-Koralle zu sein, Sigur 4 ist an dieselbe angewachsen. Dass Sigur 6 Korallenstruktur hat, bedarf wohl keines Nachweises. Diese Form kehrt mehrsach wieder.

Tafel II. Sigur 4. Diese Sorm kehrt ebenfalls mehrsach wieder. Eigentümliche Korallensormen zeigen Sigur 5 und 6. — Sigur 5 ist gebildet aus Aöhrenringen und höchstwahrscheinlich auch Sigur 6. Ich bemerke, dass diese Sorm hundertmal wiederkehrt.

Bei höherer Vergrößerung zeigen Zwischenwände Tafel II. Sigur I, 2, 3, 6.

Tafel 12. Sigur I, 2, 3 zeigen deutliche Lammellarstruktur. Die Guerfurche in Sigur 4 erinnert an Sungia. Wahrscheinlich gehören auch hierher Tafel 30. Sigur I, 2 und Tafel 20.

Die Übereinstimmung der Struktur in Tafel 20. mit Tafel 30. Sigur I (in zwei verschiedenen Schliffen) würde allein hinreichen seden Gedanken an eine unorganische Bildung außuschließen. Überdies kehrt die Korm in 350 Schliffen etwa zwanzigmal wieder.

Tafel 12. Sigur 5 habe ich nur einmal gefunden. Im Original sind deutliche Lamellen, welche im Bilde bloß am unteren Teil hervortreten. Sigur 6 ist ein milchweißes Objekt, daher undeutlich. Ich glaube Sternform zu erkennen und habe die Korm deshalb als Sternkoralle hierher gestellt.

Tafel I3. Sigur I, 2, 3, 4 sind Korallen, welche ganz unzweiselhaft den Röhrenkorallen angehören. Es sind im Original deutlich zu unterscheiden: Glasartige Zwischenmasse, schwarze Röhrenwand, gelbe Füllmasse der Röhren, zuweilen sind beide letztere schwarz. Diese Form kommt hundertfältig vor und zwar in allen Chondriten. Sigur 5 auf Lamellen zusammengesetzt zeigt deutliche Johlräume und Sigur 6 Röhren mit Zwischenwänden. Die Formen gehören zu den größten Formen: sie haben bis zu 3 mm. Durchmesser.

Tafel 25. I und 2. Die Form ist hier so ausgezeichnet erhalten, dass an dem Vorhandensein eines Organismus nicht gezweiselt werden kann, um so weniger, als sie in zwei Schlissen übereinstimmend vorkommt und auch sonst häusig wiederkehrt. Vergl. Tasel 2. links unten, Tasel 5. Sigur 6. Ich habe die Formen Tasel I. Sigur 6 und Tasel 25. Sigur I, 2 in der Folge zu den Crinoiden gestellt die Kanäle sind unzweiselhaft, die Querlinien lassen sich auch als Crinoiden Glieder deuten. Man sieht Linsschnitte, ferner sind die Arme geknickt, was sich bloß bei Crinoiden denken lässt.

Geknickte Urme zeigt auch Tafel 25. Sigur 4. Von dieser Form sind mehrere Exemplare da, welche genau dasselbe Vild geben.

Während die Korallenformen etwa I/20 des Volumens der Gesamtmasse des Chondrit-Gesteins einnehmen, bilden den Rest mit I6/20 — also den bei weitem größten Teil der ganzen Masse:

### 2.5 Die Linzelnen formen: Crinoiden

Sie sinden sich von der einfachsten Form eines gestliederten Armes bis zum ausgebildeten Crinoiden mit Stiel, Krone, Zaupts und Zilfsarmen. Ihre Erhaltung ist größtenteils sehr gut. Die Schwierigkeit liegt bloß in den tausenderlei Richtungen der Schnitte, welche immer verschiedene Bilder desselben Obsekts geben. Die birsnenförmigen Körper, welche man als Gläser ansah, sind Crinoiden-Kronen.

Ich stelle 4 Crinoiden in aufrechter Stellung und in großem Format in Tafel I6, XVII, XVIII, I9 dar und einen im Ouerschnitt Tafel 20.

Tafel 21. Sigur 1, 2, 3, 4, 5 zeigt senkrechte Durchschnitte eines schon höher entwickelten Crinoiden. Es sind Zauptarme mit Zilfsarmen und deutlichen Gelenkflächen.

Tafel 21. Sigur 3 zeigt Stiel und Krone. (2 und 4 doppelte Vergrößerung von I und 3.) Sigur 5, auf eisnem andern Dünnschliffe, ist da, um die Übereinstimmung der Formen zu zeigen. In Sigur 6 glaube ich die Mundösstrung in dem Zöcker zwischen den Armen erhalten zu sehen.

Tafel 22. Sigur I, 3, 4, 5 und Tafel 23. Sigur I, 2 zeigen die Jahl 5 der Urme, sowie die Zilfsarme.

In Tafel 23. Figur 2 und 3 sieht man die Knickung der Urme durch Druck von oben.

Tafel 22. Sigur 2 und 4 erinnern an Comatula.

Eine besondere Urt sind die Crinoiden, welche bloß auf einer beliebigen Unzahl von Urmen bestehen. Zu diesen rechne ich Tasel 23. Sigur 4, 5, Tasel 24. 4, 5, 6, Tasel 26. (Es ist auf dem Bilde Tasel 24. Sigur 6 in kleinerem Maßstab die Koralle aus Cabarras, Tasel 13. Sigur 6.)

Tafel 29. Sigur I, 2, 3, 4, 5, 6 und Tafel 27. Sigur 3 geben Bilder von Crinoiden von oben gesehen.

Tafel 27. Sigur 2 und Tafel 29. Sigur 4 zeigen Crinoiden von unten: hier tritt der Stielansatz als heller Punkt hervor. Diese Querschnitte kehren in dutzend Sällen in übereinstimmender Form wieder. (Man vergleiche auch Tafel 3. Sigur 2 links oben. Bessere Durchschnitzte kann man wohl nicht fordern: die Muskelschichten sind hier deutlich sichtbar.)

Eigentümliche Verschlingungen zeigen Tafel 26. Sigur 1, 2, 3, 4.

Die deutlichsten Querschnitte geben Tafel 25. Sigur 5 und 6. Ein Längsschnitt ist Tafel 27. Sigur 3 mit geknickten Urmen.

Tafel 24 Sigur I und 2 sind Formen, welche ich ansfangs für Korallen ansah.

Tafel 28. Sigur I könnte doch diesen letzteren zuzuzählen sein (die Struktur sollte deutlicher erhalten sein, um endgültig zu entscheiden).

Etwas deutlicher ist Tasel 27. Sigur I: eine scheinbare Außenwand, welche aber nichts als der Durchschnitt des regelmäßig gelagerten Zauptarms ist.

Ein sehr schönes Bild gibt Tasel 30. Sigur 3 ob Crinosid; ist zweiselhaft. Tur bemerke ich, dass die beiden Teile symmetrisch und die Urme nicht aneinander gelegt sind, sondern sich kreuzen.

Tafel 30. Figur 5 mit einem Anschnitt hatte ich ansfangs zu den Uranien gestellt. Sie wird den Crinoiden zuzuzählen sein.

Tafel 31. Sigur 1, 2, 3 sind offenbar dieselben Kormen. In Sigur I und 3 ist eine deutliche Kurche wahrzunehmen, vielleicht die Stelle wo zwei Crinoiden Arme sich aneinander legen. Im Polarisationsapparat tritt diese Kurche noch deutlicher hervor. Sigur 4, zwei Individuen zusammengelegt, ließe die Deutung auf Schwamm oder Koralle offen. Sigur 5 mit Maschenstruktur in dem mittleren Teil, ein Gewebe von Gliedern, zeigt oben Arme mit deutlicher Struktur. Gehören diese Dinge zu stammen? Da die Korm nur einmal vorkommt, wage ich keine Entscheidung. Ausstallend ist nur die ähnlichkeit des Mittelbildes mit der Struktur des Schreibersits im Mesteoreisen. Sigur 6 sindet sich zweimal, weshalb ich beide Teile als zusammenhängend angesehen habe.

Dieselbe Maschenstruktur zeigt Tasel 30. Sigur 6 bei Lupenvergrößerung. Die Struktur beider stimmt, wie erwähnt, mit der Struktur des Schreibersits in dem Meteoreisen und kehrt mehrmals wieder.

Wie ich schon im Lingang bemerkte, halte ich es nicht für meine Aufgabe Spezies zu machen. Meine Aufgabe

war nur das Dasein von Organismen mit dem Nachweise geschlossener wiederkehrender Formen von organischer Struktur unzweiselhaft sestzustellen. Dies glaube ich gestan zu haben und ich denke, es sollte Niemand auch nur den mindesten Iweisel mehr hegen, (insbesondere nach dem Unblick eines Dünnschlisses im Original), dass es sich hier nicht um Mineralsormen handle. Sind aber nur 5 organische Formen unzweiselhaft nachgewiesen, so sind auch die übrigen weniger gut erhaltenen Formen organisch.

Um endgültig Genera und gar Spezies sestzustellen, gehört mehr Material und sahrelange Untersuchung dazu. (Für ersteres werde ich dankbar sein.) Vor Allem müsste ich mehr Zeit haben, als die Nachtstunden und mehr Kraft, als mir mein anstrengender Zerus übrig lässt, um die Arbeit zu vollenden. Doch meine ich den gesorderten Punkt gegeben zu haben, auf welchem man stehen kann.

Jum Schluss verweise ich auf die Tafelerklärung.

Damit sind die Formen vorgeführt. Ich habe eine Zeitlang den Plan verfolgt, eine förmliche Statistik über das Vorkommen der Formen in meiner Dünnschliffsammlung zu machen, aufzuzählen, wie oft ein und dieselbe Form in den 500 Dünnschliffen sich sindet. Ich stand davon ab, weil ich mir sagen musste, dass ef doch keinen großen Wert haben werde. Iede Vermehrung meiner Sammlung um nur 12 Aummern würde die Verhältnischläbl ändern. Ich zog daher vor, bei einzelnen Formen das Jahlenverhältnis annähernd anzuneben.

### 2.6 Alles Leben

Es sind im Vorstehenden die einzelnen Formen zur Anschauung gebracht. Alle diese Formen sind nicht tot eingesbettet, sondern die eine aus der anderen gewachsen und in Wahrheit lebend vom Leben begraben. Zier kann freilich nur die Anschauung Überzeugung geben. — Zu diesem zweck betrachte man in sämtlichen Bildern die einzelnen Formen mit ihrer Umgebung!

Waf auf den ersten Blick auch nur alf ein heller fleck erscheint, bei genauerer Untersuchung zeigt es den Durchsschnitt eines Schwamms, einer Koralle, oder eines Crinoidengliedes. Nirgends sind, wie Gümbel ganz richtig beobachtet hat, Zierstück, zerbrochene, abgerollte Formen, Splitter — auch ist kein Bindemittel zwischen denselben. Nur die Weichteile sehlen, alles Undere ist erhalten, wie es sich im Leben im Wasser bewegte. Die Crinoidensormen zeigen dies am deutlichsten. Denn auch diese sind höchstens auf die Seite gebogen, gewunden, selten geknickt man sieht auch den nur schwachen mechanischen Wiederstand gegen den über dem Zaupt entstandenen Nachbar.

— Aber Alles aneinander, auseinander gewachsen, Nichtsniedergelegt, Nichtst tot eingebettet. Da ist auch keine Masse, welche ein Grab hätte bilden können.

Die Tatsache, dass nichts Unorganisches in dem Chondrits Gestein und kein Raum ohne Leben darin ist, halte ich für ebenso bedeutend, als das Dasein der Organismen felbst. Diese Tatsache erst wirft auf die Entstehung des Planeten das volle Licht. Nimmt man hinzu, dass das Gestein, welche diese Bildungen einschließt, auf Mineralen besteht, welche dem sogenannten Urgebirge, sa "vulkanischem" Gebirge angehören: so muss unsere Geologie notwendig einen andern Weg in der Erklärung der Tatsachen einschlagen. Ich glaube nun freilich keineswegs, dass es Schwämme, Korallen, Crinoiden aus den Mineralen gegeben habe, welche heute die Kormen bilden. Die Organismen müssen ursprünglich anders zusammengesetzt gewesen sein, müssen also eine Umwandlung erlitten haben.

So viel ist, denke ich, über allen Zweisel erhaben, dass das, was setzt Zornblende, Augit, Olivin ist und die genannten Formen ausfüllt, früher in einem andern Zustand gewesen sein muss, nämlich eine flüssige, und zwar was serflüssige Lösung.

Vun finden wir aber diese Minerale in unserem Urgebirge in Formen, welche nicht Kristalle, wohl aber den meteoritischen ähnlich sind. Wir sinden Gebirgsmassen auf solchen Formen zusammengesetzt. Also waren es auch hier höchst wahrscheinlich organische Formen, nachher verwandelt in das, was wir setzt Gestein nennen. Dieses Gestein weist aber auf eine Schichte, welche ganz unzweiselhaft mit der meteoritischen (den Chondriten) näher, sa nächst verwandt ist — den Olivin. Und unter diesem muss Eisen liegen: das bezeugt das spezisische Gewicht der Erde.

— Wieder eine gleiche Tatsache sehen wir in den gestallenen Eisen-Meteoriten: hier, wie im Ovisak-Gestein sinden wir Übergänge, Zusammensetzung von Eisen und Olivin.

Damit sind uns die größten Grundlinien der Geologie gegeben — wir haben die zeitliche Entwicklung des Erdkörpers. Die Formentwicklung — die Ursache der Entwicklung der Formen selbst ist damit zugleich aufgesschlossen. Ist der Organismus in den untersten Schichten, die wir kennen, die Ursache der Massenbildung, so wird er auch die Ursache des Anfangs des Planeten selbst gewesen sein.

Die Annahme einer bloßen Massenanziehung, der meschanische Ansang der Erde und der Weltkörper übershaupt, wäre damit widerlegt.

Allerdings müssten auch noch Organismen im Lisen, im Erdern, in dem Meteoreisen nachgewiesen werden. Diese Aufgabe habe ich mir als nächste gestellt die bisherigen Resultate lassen ihre Lösung hossen.

#### 2.7 Stein im Stein

Wenn ich gesagt habe: die Chondrit sind nichts als ein Tiergewebe, ein Tiersilz, so leidet dies eine Einsschränkung.

Es kommen allerdings in diesem Tierknochengesteine ganz kleine, scharf umschriebene Stellen vor, welche von Unfang an wahrscheinlich (aber nicht notwendig) Gestein find. Das sind blaugraue, seltene Linschlüsse von 3,5 mm. Durchmesser ohne bestimmt wiederkehrende Korm, welche in der grauen Masse deutliche Kristalle eines gelbgrünlis chen Minerals, dessen Durchschnitte das einmal Quadras te oder Ahomben, das andermal Sechsecke sind, einschließen. Dieses Mineral kann Augit oder Olivin sein. Zier spricht die Kristallform für ein Mineral. Allein das Vorhandensein solcher Teile spricht auch für meine Unsicht. Warum hätten sich die Kristalle nicht überall gleich gebildet? Und warum sollten nicht auch Sohlräume neben Organismen übrig bleiben? Sodann ist bekannt, dass auch bloke füllmassen in organischen Kormen nachträglich kristallisieren. Endlich sinden sich aber auch in organischen Formen Auffüllungen von Söhlen, welche sich in ihren Umrissen dem Aussehen von Flächen und Winkeln nähern.

Der Grund, warum ich diese Linschlüsse aber doch als unorganische Teile der Chondrit zugebe, als eigentlichen Meteorstein (Stein im Stein), ist, weil die Umrisse einen Unhaltspunkt nicht geben, um die Form als organische anzusprechen. Diese Linschlüsse können Linlagerungen einer schon gebildeten Gesteinsmasse sein oder könnten sie sich in den Zohlräumen erst gebildet haben.

Dass eine Schlammablagerung möglich, dass ein Zineinfallen von Teilen eines schon abgelagerten, also sertig gebildeten Gesteins möglich, sogar wahrscheinlich sei, braucht nicht geleugnet zu werden: es stößt die Tatsache nicht um, dass in den Olivinschichten organische Bildungen vorhanden und dass diese den Ausbau des Planetenskörpers bewirkt, den Bau selbst gebildet und zusammensgesetzt haben.

Unter allen Umständen aber ist im Chondrit-Gestein das Verhältnis das umgekehrte wie bei den Sedimentschichten unserer Erde. In diesen sind die Organismen eingelagert, das Gestein umschließt sie senes ist eben nichts als Organismen und das Gestein ist eine Masse solcher. Ich füge ein Bild eines wirklichen Gesteinteils auf Borkut bei. Tafel 32. Sinur 2. Daneben (Sinur I) habe ich eine form abyebildet, graublau wie Urania, aber ohne bestimmte Struktur, auch in ihren Umrissen unbeständig, weshalb sie eine bloke Küllmasse sein könnte. Wäre sie eine organische Korm, so wäre sie die eines niedersten Wesens. Zur Vergleichung bilde ich in Tafel 32. Kinur 4 einen Dünnschliff von Liaf  $\gamma\delta$  (Zwischenkalk) ab. Hier liegen die Schalen zum Teil ganz im Kalke, größtenteils aber sind es bloß Stücke von Schalen die Teile sind in alle Größen zerschlagen, und, was ihre Zerkunft betrifft,

gerollt bis zur Unkenntlichkeit. Im Chondrit bleibt fast keine Stelle, welche Zweisel über ihre Zusammensetzung übrig ließe.

### 2.8 fortpflanzung

In den Steinen findet sich eine Unzahl runder und birnenförmiger Formen von 0,10 mm. — 0,50 mm. Durchmesser, mit kaum angedeuteter Struktur. Ich halte Siese für die ersten Entwicklungsformen. Unter diesen bebt sich am meisten bervor eine Kunelform auf durchsichtinem Gestein, in der Mitte die Anfänge von Kanälen. Da finden sich Kuneln mit einem Kanal, mit zwei weiteren unterhalb und oberhalb des größeren, und so fort bis zu den Formen Tafel 13. Figur 1, 2, 3, 4. Die Sache ist bier, glaube ich, sicher. Diese Form lässt sich nicht nur in allen Chondriten nachweisen in allen sinden sich auch alle Entwicklunusstufen von einem bis zu 20 und mehr Kanälen: sie ist die häufinste und zunleich, wegen der deutlichen Struktur der Kanäle, sicherste. Sie hat sich deshalb auch in densenigen Chondriten erhalten, welche die übrigen Kormen kaum mehr zeigen. Die Entwicklung besteht also darin, dass sich die Kanäle vermehren.

Aun sinden sich aber eine Menge von Kugel und Birnenformen mit schwach angedeuteter Struktur. Sie scheinen auf Sarcode bestanden zu haben, als sie einst begraben wurden. Ich würde es nicht wagen, diese Kormen hereinzuziehen, wenn sie nicht doch eine bestimmte Bliederung zeigten. Sie bestehen auf zwei, drei, vier, fünf lappenförmigen Urmen und sind wahrscheinlich die Unfänge von Crinoiden.

Dass die Seststellung von Entwicklungsformen am schwierigsten ist, ist bekannt. Ich erlaube mir daher hier auch nicht zu weit vorzugreisen. Was ich hier sage, kann nur ein Singerzeig für künftige Forschung sein.

Die gute Erhaltung ist eine Unmöglichkeit. Die meteoritischen Formen werden daher auch zum mindesten das Schicksal der lebenden teilen: es ist immer die letzte Urbeit, die ersten Unfänge der Entwicklung, die Embryonen festzustellen.

Aur einer Tatsache will ich hier noch erwähnen, welche zugleich ein erhebliches Beweismoment für die organische Natur der Formen ist: die immer auftretende Vergessellschaftung der einzelnen Formen. Die meisten Formen sinden sich mit gleichen zusammen: wenige stehen einzeln und zugleich als Unica da. Ich halte dies für sehr wichtig. Wenn mehrere Individuen der gleichen Spezies sich zusammensinden, so geht darauf hervor, dass sie im Muttersoder Geschwisterverhältnisse stehen. Dieselbe Erscheinung tritt auch bei den terrestrischen Urten auf. Dies wird um so bedeutender, als oft das Mineral, auf welchem eine Form besteht, unzweiselhaft das gleiche ist mit dem eine andere Spezies auffüllenden Mineral, also ein mineralogischer Grund nicht da ist, auf welchem die Verschiedenheit der Struftur abgeleitet werden könnte.

### 2.9 Entwickelung

Nachdem ich die einzelnen Formen dargestellt habe, habe ich auch ihr Verhältnis zu einander, die Entwickelung der Formen aus einander, zu besprechen.

Dass Urania die einfachste Form ist, ist sicher. Diese Form bildet aber auch den Anfang zu den folgenden.

Der halbrunde Lappen teilt sich in Schichten, diese Schichten in Röhren, die Röhren teilen sich quer — jetzt bilden sich Urme, welche ein Kanal verbindet. Es entwi-Lelt sich eine Krone zwischen Urmen und Unwachsstelle und der einfachste Crinoid ist da. — May diese Kette allzukühn geschlungen erscheinen, die Kormen sordern unwillkürlich dazu auf. — Aber muss denn, wenn wir nur irgendwo in unseren lebenden Formen eine Entwicklungs reihe feststellen wollen, nicht auch hier dieselbe Wandlung vor sich gegangen sein? — Sicher. Aur, glaube ich, finden sich in den meteoritischen Formen mehr und viel sichtbarere Ubergänge. Man kann den Stammvater des Pentacrinus Briareus auf unserer Erde nirmends anders suchen, als in den Korallen und gewiss darf man den Unfang der Korallen selbst in der Schwammform erblicken: sie ist entschieden eine niederer Form als die der Korallen.

Was der Meteorschöpfung die größte Wichtigkeit für die Entwicklungslehre gibt, ist nicht nur das Vorkommen von Tierformen in den tiefsten Schichten, sondern der einheitliche Typus aller meteoritischen Organismen. Dies

sein wird klar, wenn man hunderte von Dünn-Schliffen nach einander betrachtet. Die Größe der Organismen ist eine gleichartige, verhältnismäßig mindestens 1000 mal kleinere als die der Erde: die Entwickelung der einzelnen Formen erreicht annähernd einen gleichen Zöhepunkt. Der Aufbau der Formen entspricht vollkommen den Umständen, unter welchen sie entstanden, nämlich der überauskurzen Lebenßeit, welche sie gehabt haben können: es ist eine hastige, relativ unvollkommene Schöpfung. Der Crinoid ist der höchsten Repräsentant dieser Tierwelt. Ich halte für den höchstentwickelten die Form Tasel 22. Sigur I, 3, 5, 6, weil er schon die Fünszahl enthält.

Will man aber nicht so weit gehen, die Crinoiden nicht durch die Korallen hindurch ableiten, so bietet die Form der Urania selbst Anhaltspunkte. Ich habe noch einige Formen abgebildet, welche lose Glieder zeigen. Sie sind in der Beschreibung bezeichnet. Insbesondere fand ich bei höherer Vergrößerung übereinanderliegende Arme.

Auch hier reicht die Beobachtung im Einzelnen noch nicht hin, um abschließen zu können.

## 3 Das Meteoreisen

Ich habe schon in meiner Urzelle darauf hingewiesen, dass die Struktur des Meteoreisens nichts anders sei, als die eines Silzes von einzelligen Pflanzen. Die sogenannten Widmannstätten'schen Siguren sind größtenteils nichts anderes als einzellige Pflanzen.

Ein Stück Meteoreisen von Toluca liegt mir vor, in welchen die zylindrischen Jellen eine auf der andern hervorgeben, häusig sind zwei kopuliert. Die einzelnen Jellen zeigen doppelte Jellwände (Bandeisen), zeigen Guerscheisdewände, zeigen deutliche runde Ansatzstellen in manchen hat die Marksubstanz (wie man sie gar nannte), wirklich im Innern der Jellen noch Struktur. Die ganzen Jellen selbst liegen in einer matten füllmasse (Fülleisen).

Man veryleiche mit diesen Siguren die Formen auf dem Liasschiefer, insbesondere Algacites granulatus und frage sich, welche von beiden Formen die Pflanzen-Struktur deutlicher zeigt, Toluca-Lisen oder die Alge auf Lias-Lysilon.

Diese Formen sind zylindrisch, mitunter sieht man (im Durchschnitt) annähernd polyedrische Flächen: sie haben Wandungen. Was sie aber ganz besonders von Kristallen unterscheidet (abgesehen von ihrer runden Form), sind die Unwachsstellen.

Kristalle, welche aneinander wachsen, setzen sich stets mit einer bestimmten Kristallfläche an eine andere ebenso bestimmte fläche an, (Dendriten von Silber, Rupfer). Sie legen sich an die fläche des andern an, ohne in sie einsudringen, Im Meteoreisen aber sindet ein Eindringen statt. Der Querschnitt ist nicht eine gerade Linie (Kristallfläche), sondern eine Kurve.

Damit hört alle ähnlichkeit mit Kristallen auf, außer man nähme an, dass es auf andern Planeten Zylinder-Kristalle yäbe, welche auseinander hervorwachsen. Die Zehauptung, dass die Siguren bestimmte mathematische Lagen haben, may stellenweise zufällig zutressen allein alle Forscher geben zu, dass die Winkel nirgends konstante sind, was bei den Dendriten stets der Fall ist. Sindet man auch eine Stelle, worauf man ein Oktaeder, einen Würsel, oder eine andere reguläre Kristallsorm, oder auch ein Khomboeder abzuleiten im Stande wäre: sofort ist die Ordnung daneben eine ganz andere. Und wie wollte man noch von Kristallgesetzen sprechen, wenn von demselben Mineral nicht einmal ein bestimmtes Kristall-System eingehalten wäre: Denn es sinden sich, wie gesagt, rhomboedrische Schnitte neben regulären.

Ich finde nur zwei Linwürfe scheinbar begründet:

I. den Linwurf, dass die Siguren zuweilen Platten sind.

Ziergegen möchte ieh einwenden, dass, wenn einmal Zylinderform nachgewiesen ist, die Formen eben keine Kristalle sind, und dass nun die Folge nicht ist, dass jene Zylinder Kristalle, sondern umgekehrt, dass die Platten, welche dieselbe Struktur tragen, keine Kristalle sind.

2. Der zweite Linwurf ist der: Wie sollen sich Pflanzen in Lisen verwandeln?

Dieser Linwurf ist nicht schwer zu widerlegen. Man denke nur an die meisten unserer verkieselten Versteinerungen, insbesondere die verkieselten Stämme im Lias man erinnere sich der sogenannten Mansselder ähren im Zechstein (Cupressites Ulmanni), wo Cypressen in silberhaltiges Kupser verwandelt sind. Man sollte meinen, ein solcher Linwand könne nicht gemacht werden.

Tun bin ich aber durch einen verehrten Freund, Professor Dr. Z. Karsten in Schaffhausen, in der Lage, für die Verwandlung von Pflanzen in Lisen einen schlagenden Beweis auf der Jetztzeit beizubringen. Karsten hat schon im Jahre 1869 nachgewiesen, dass unsere niedersten Pflanzen in ganz hervorragender Weise Lisen aufnehmen seiner Güte verdanke ich Lisenpflanzen von heute. Mit seiner Erlaubnis lasse ich einen Außug aus seiner ausgezeichneten Schrift: Der Chemismus der Pflanzenzelle, Wien 1869, S. 53 hier solgen:

"Bringt man Oidium lactis oder Zese, welche einige Zeit in mäßig seuchter Luft (nicht unter flüssigkeit) mit Milchzucker in Berührung war, mit metallischem Eisen zusammen, indem man über die auf dem Objektträger vegetierende Milchhese Lisenseilspähne streut, so nehmen zuerst manche dieser das Lisen berührenden Zellen, später auch viele von demselben entserntliegenden, mehr oder minder rasch eine intensiv rote Farbe und bald auch eine erstaunliche Größe an."

"Man würde sich gezwungen glauben, die Ursache der merkwürdigen und außerordentlichen, oft sehr beschleunigten Vergrößerung allein nur in einem mechanischen Aufquellen der Zellhäute zu suchen, sähe man nicht zugleich die im Innern der hiebe zum Teil schichtig verdickten Mutterzelle unter den oben angedeuteten Kulturverhältnissen vorhandenen Tochterzellchen verhältnismäßig mit heranwachsen und sich so vermehren, dass sie Mutterzelle gänzlich ausfüllen."

"Auch die Zaut der Tochterzellchen produziert Säure, wie die Lisenreaktion erkennen lässt ihre Gestalt ist nach der Verbindung ihrer Zaut mit dem Lisen dersenigen der oben beschriebenen Protein-Kristalloide sehr ähnlich wie diese sind sie flache, 3-4-5seitige, wenn auch weniger scharfkantige und eckige Täselchen unregelmäßig neben einanderliegend, füllen sie die große Zellhöhlung völlig aus, fallen aber, wenn die Zaut der Mutterzelle zerbrochen wird, mehr oder minder mit einander vereinigt aus derselben hervor."

"ähnliche Metamorphosen erfahren auch die Gidium» mycellen, besonders die in die Luft hineinragenden zerglie» bernden äste, wenn sie in ähnliche Verhältnisse gebracht werden, und zwar der Urt, dass die verschiedenen Gliedzellen sich oft ungleich ausdehnen, meistens die oberen zuerst und mehr als die unteren, gewöhnlich stielrund bleibenden, sich etwas streckenden, wodurch diese Zweige mit ihren knopssörmig angeschwollenen Endzellen Mucorroder später frucht oder blumenähnlich werden, wenn sie die oberste vergrößerte Zelle am Scheidel deckelartig, oder von oben nach unten klappig anreißend zu öffnen beginnt. Die Zäute der primären und sekundären Zellen zerreißen, sede in ihrer eigentümlichen Weise."

"Auch in Rücksicht auf die Organisation der Pflanzenzelle im Allgemeinen sind manche dieser Vegetationen der Milchfäurezellen von großem Interesse."

"Diesenigen nämlich, welche die oben beschriebenen Kristalloid-Zellchen enthalten, sind auch an der inneren Obersläche seder der beiden in einander geschachtelten Zellhäute, welche die Wandung bilden, mit einer Schichte kleiner Zellchen belegt, die, entweder eng beisammen liegend und an einander abgeplattet, oder etwas von einander entsernt, dem ganzen Zellsysteme das Unsehen und die Struktur einer kleinnetzig, warzig oder porös verdickten Parenchym Zelle geben. De Cella Vitali 1843. Ges. Zeislage pag. 37 und 437. Diese Zellchen, morphologisch den Sekretion Zellchen der zusammengesetzten Pflanze gleichwertig, wachsen gleichzeitig mit ihrer Mutterzelle zu der Größe heran, dass die zwischen der primären und sekun-

bären Jelle liegenden eine Epidermis bilden. Das ganze Jellsystem ist oft höchst ähnlich, mit der Außenhaut vieler Pollen- und Diatomaceen- (Gallionella, Biddulphia, Coscinodiscus, Triceratium, Amphitetras etc.) Jellen."

"Wird ein solches von aufgenommenem Lisen rotyefärbtef Zellsystem in eine neue Mischung der oben bezeichneten Nährstofflösung ohne Lisen gelegt, so zerfällt ef
bald in seine Llemente. Die Zellchen, welche dasselbe zusammensetzen, sowohl die kristalloidischen Inhaltsellchen
als auch die der Oberhaut beginnen sich abzurunden und
sich etwas zu Vergrößerern ef entstehen neue Generationen
in ihnen, die endlich frei werden, indem ihre Spezialmutterzelle verflüssigt wird, und so sieht man sie bei Monate
hindurch sortgesetzter Beobachtung sich in der Weise der
Unterhese mikrosporonartig, d. h. durch Entwicklung
freier Tochterzelien vermehren."

"Diese mit milchsaurem Lisen durchdrungenen, warzig verdickten Vidiumkellen waren ef auch, an welchen ein Zervorwachsen von sehr langgestielten Inhaltkellchen, auf oder neben den Zellchen, welche die netzig-warzige Oberhaut darstellen, beobachtet wurde, nach Art des Miscrococcus, der Vibrionenkeime."

"Auch Zyphomyzeten, besonders Penicillium und Botrytis, sowie Rhizopus gaben, nachdem sie einige Zeit mit Milchzucker ernährt vegetierten und darauf mit metallischem Eisen in Berührung gebracht wurden, sehr interessante Präparate, zum Teil ähnlich denen des

Didium mit angeschwollenen Gonidienketten oder Zyphengliedzellen. An den Gonidienketten von Penicillium schwellen in der Regel die obersten ältesten Gonidien zuerst etwas an, dann solgen nach und nach die unteren. Die in Milchzuckerlösung mit Nährstoffsalzen gesättigten und bald darauf mit Eisen in Berührung gebrachten Penicillium Gonidien schwellen langsam an und entwickeln an der inneren Obersläche ihrer nach und nach außerordentlich vergrößerten und verdickten Außenhaut zahlreiche Zellchen, die derselben ein netzigoder porös verdicktes Ansehen geben, so dass dadurch Formen entstehen, die den oben von Oidium beschriebenen, porös dickwandigen ähnlich sind. In andern Fällen füllen die Tochterzellen mehr die Jöhlung an und werden einem mit Gonidien gefüllten Mucorköpschen ähnlich."

"Sehr häusig sinden sich auch hier wie bei Oidium, wenn es mager kultiviert war, inhaltsleere Zellen mit ganz glatten Wandungen. Nicht selten durchbricht die innere, mit milchsaurem Eisen durchtränkte Zelle die äußere einstache oder auch zelligswarzigsetc. verdickte Zaut, welche abblättert oder zerspaltet, während sene hervorwächst."

"Die für diesen Zweck angestellten Kulturen dürfen nicht seucht gehalten, nur in seuchter Luft unternommen werden, da diese mit saurem Lisensalze durchdrungenen Vegetationen dem Zerfließen sehr ausgesetzt sind. Auch ohne solche vorgängige Kultur habe ich die Gliedzellchen und Gonidien genannter Schimmel, sowie im Staube enthaltene Micrococcuf-Zellen und Vibrionenkeime in beschriebener Weise anschwellen sehen, wenn sie mit polierstem metallischem Lisen in Berührung gebracht wurden, ohne Zweisel, weil diese Zellchen Säuren oder saure Salze enthielten."

"Wird ef auf den eben mitgeteilten Erscheinungen des Wachstums dieser Pilzzellen ersichtlich, dass es deren assimilierende Membranen sind, welche die zersließende Säure bilden, so ist die Ursache der abnormen Vergrößerung dieser Zellen in der nachträglichen Verbindung dieser Säure mit dem neutralen milchsauren Eisen zu einem sauren Salze zu suchen, so dass also die ganze Erscheinung der merkwürdigen Missbildung auf einem rein chemischen Prozesse beruht, der denjenigen, welcher in den unter normalen Zedingungen vegetierenden Zellen stattsindet, in der Weise ändert, dass die normale Entwicklung eine Erankhaste wird, welche die endliche Zerstörung des Organismus herbeisührt."

"Gegen die Idee, dass die Säure hier bei den Pilzen ebenso wie das Zarz, Wachs etc. durch die Ussimilitations Tätigkeit der Zellmenbran entstehe, könnte noch das Bedenken erhoben werden, dass es vielleicht die Sekretionskellchen (Microgonidien, Vibrionenkeime) allein seien, welche zwischen diesen Membranen des Zellensystems (der in einander geschachtelten Zellen I., 2., 3. etc. Grads) wie oben bemerkt eingeschlossen, diese organischen Säuren durch ihre vegetative Tätigkeit erzeugen, um so mehr,

da ohne Zweifel die Vibrionen, die sich auf ihnen entwis deln, auch bei völliger Abwesenheit von entwickelteren Zellenformen sehr energische Erzeuger von Säuren, z. 3. von Milch, Butter, Essigsäure sind. Dagegen sprechen sedoch diesenigen durch Aufnahme von Lisen in gleicher Weise vergrößerten Zellen, deren Wandung durchaus strukturlos ist, d. h. ohne erkennbar zellige Ornanisationen zwischen den beiden sie zusammensetzenden Membranen der in einander geschachtelten Zellen und ohne einneschlossene freie Zellchen in ihrer Köhlung ferner die Tatsache, dass von dem Vidium-Mycelium und deren Zefezellen, wenn dieselben untergetaucht sich entwickeln, zuerst die Membranen, dann erst der flüssige Inhalt, der sich außerhalb der Kernzelle befindet, durch Lisenund Schwefel-Ummonium geschwärzt werden. Gegen andere Metalle, gegen Aluminium, Magnesium, Zink, Robalt, Mickel, selbst gegen Kupfer verhalten sich diese Milchfäurezellen ähnlich wie gegen Lisen, bilden mit demselben sedoch farblose oder nur schwach gefärbte, zum Teil (besonders mit Kupfer) sehr leicht zerfließliche Organisationen. Zu Versuchen mit dieser Säurehefe sind daher diese Metalle weniger günstig."

Ich denke, wenn vor unserem Auge Lisenpflanzen entstehen, sollte man ein Bedenken gegen die Annahme desselben Vorgangs zu einer früheren Zeit, zu einer Zeit, als sämtliche Stoffe der organischen Bildung zur Verfügung waren, nicht erheben. Zaben wir heute noch Massenbil-

dungen vor uns in den Utollen des stillen Meeres, haben wir in den Chondriten die Jusammensetzung auf ähnlichen Tieren, wie dort nachgewiesen: was steht im Wege, vorhergehende Pflanzenmassenbildungen anzunehmen?

Endlich haben wir in der Zefebildung einen Vorgang, welcher vollständig analog ist, sobald nur die Gluthitze weggedacht wird.

Ich komme hier auf die Kant-Laplace'sche Zypothe se von der Massenbildung zurück. Oben schon habe ich ihren logischen Fehler erwiesen. Wie will man auf der Dunstmasse, welche sicher auch das Wasser einschloss, einen glübenden Ball herausbringen? Oder soll die Erde erst, nachdem sie gebildet war, in Glut gekommen sein? Nun wodurch? Die Erfahrung spricht bloß für Massenbildung auf organischem Wege. Offenbar hat nur der Anblick der Vulkane dazu neführt, ein feuerflüssines Erdinneres anzunehmen, und diese Vorstellung führte zu der Unnahme, dass die ganze Erde einmal in diesem Zustande newesen und dass die plutonischen Gesteine die Produkte sener Periode seien. Auch ist es sa keineswegs gewiss, dass der Wärmestrahl der Sonne von einem feuerflüssigen Körper herrühre. Wenn aber auch, so spricht eben die Tatsache der Lossösung unserer Erde mit dem Wasser und insbesondere des Mondes (ohne Utmosphäre!) dafür, dass die Masse von Unfang an eine feuerflüssige feste Masse se nicht gewesen und eine solche auch nicht geworden sein fann.

Soviel ist jedenfalls gewiss, dass das Meteoreisen nicht ein Schmelzprodukt ist, und was sollte das Meteoreisen in Glut versetzt haben? Ich habe auch im Meteoreisen Crinoiden und Schwammformen gefunden. Ganz unzweiselhaft zeigt Zainholz solche.

Jeigen aber schon die Pallasit organische und sogar tierische Formen, Gesteine, welche den Übergang von reinem Lisen zum Chondrit bilden, so ist auch kein Grund vorhanden, das reine Lisen für eine unorganische Bildung, noch weniger aber, einen ehemals flüssigen Justand desselben anzunehmen.

Sobald das Lisen als Planetenkern angenommen wird, glaube ich es hiermit aber als im höchsten Grade wahr-scheinlich aussprechen zu dürsen, dass der erste Unfang unseres und daher aller Planeten eine organische Bildungwar.

## 4 Das Lisen von Ovifak

Durch die Güte des Zerrn Prosessors Dr. von Mordenstisch wurden mir 6 Stücke des Lisens von Ovisak und des Zasalts, in welchem dasselbe gefunden wurde, zur Untersuchung gegeben.

[friedrich] Wöhler (Neuef Jahrbuch für Mineralogie 1869, S. 32) hält ef auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung nicht für meteoritisch. Das Vorkommen eines der mir vorliegenden Stücke in einer Kluft spricht ebenfalls nicht für meteoritischen Ursprung. Lisenteile mit Wismannstätten'schen Figuren finden sich auch im Basalt und im Olivingestein eingewachsen, und doch werden beide nicht als meteoritisch angesprochen. Endlich sinden sich völlige Ubergänge von Stein in Eisen, worauf hervorgeht, dass das Lisen nicht zufällig in den Basalt gefallen ist. Es wäre doch ein großes Wunder, wenn dieses Eisen gerade zu der Zeit, als der Basalt flüssig war, in denselben gefallen wäre, ganz abgesehen davon, dass dieses Eisen, wie festgestellt ist, sich kaum einige Jahre erhalten würde. — Und doch soll dieses Lisen seiner Struktur wegen meteoritisch sein.

Wir wissen aber, dass unser Erdern mindestens von der Dichtigkeit dieses Metalls ist, und es wird derselbe wahrscheinlich auch aus Eisen von derselben Beschaffenheit bestehen, so dass die Wahrscheinlichkeit nahe läge, dass wir in dem Lisen von Ovisak den Lisenkern der Erde zu Tage

treten sehen.

Damit wäre uns unendlich mehr gewonnen, als mit einem neuen Meteoriten.

Auf der Fläche dieses Lisens, das ich freilich, da ich dieses schreibe, anzugreisen die Erlaubnis noch nicht habe, sinde ich Strukturen, welche denen der Crinoiden in den Chondriten sehr ähnlich sind.

Line Untersuchung im Dünnschliffe aber muss ich auf die Zeit aufsparen, wo mir das Material zur freien Verfügung gestellt wird.

# 5 Schluffolgerungen

#### 5.1 Ursprung der Meteorit

Dass kleine Planeten, Planeten im Gewicht von I/2 Kilogramm auf die Erde fallen und solche daher auch kreisen, ist ganz gewiss. Es lassen sich nun solgende Möglichskeiten denken:

- I. die Meteorit kreisen außerhalb des Sonnensystems (ein solcher will einmal von Petit in Toulouse beobachtet worden sein),
- 2. die Meteorit kreisen innerhalb des Sonnensystems und zwar: für sich um die Sonne, um die Sonne mit Planeten (vielleicht also auch einzelne mit der Erde) um die Sonne, die Planeten und deren Trabanten,
- 3. die Meteorit kreisen in allen diesen Zahnen.

Man weis auf langjährigen Zeobachtungen setzt sicher, dass in gewissen Zeitabschnitten (10. August, 13. November) Schwärme von Meteoriten unserer Erde sich nähern und unsere Erdbahn schneiden weis dass diese Schwärme in gewissen Jahren zahlreicher sind, als in andern, weis, dass einzelne Meteorit auf unsere Erde fallen, eine Tatsache, welche ihren Grund in der Anziehung der Erde hat. — Die Zahnen der Meteorit aber sind noch nicht

festgestellt, weder die der Schwärme, noch die von einzelnen weder von solchen, welche gefallen, noch von solchen, welche bloß an der Erde vorbeigezogen sind. Somit lässt sich auf den Zahnen, welche man nicht kennt, nichts für die Entstehung der Meteoriten ableiten.

Nun fragt ef sich, was aus der Zusammensetzung der Meteorit folgt. Ihre chemischen Elemente sind dieselben, wie die unserer Erde. Diese Tatsache lässt sich nun auf gemeinsame Entstehung, also darauf deuten, dass die Erde mit den Meteoriten Eine Masse gebildet habe, wie darauf, dass die Entstehung und Entwicklung aller Planeten dieselbe sei. Die bloße Tatsache der chemischen Gleichheit lässt also verschiedene Folgerungen offen. Nun habe ich aber irdische Organismen in den Meteoriten nachgewiesen und es kann noch nicht einmal als gewiss angenommen werden, dass die nicht übereinstimmenden auf der Erde nicht auch vorkommen. — Zu meinem Zedauern mussich es gestehen, dass die Jahl der Zweisel durch meine Entsbeckung eben nur vermehrt worden ist.

Auff Neue erheben sich setzt die Fragen: Entstanden die Meteorit mit der Erde? Kommen sie von der Erde? Waren sie also von Anfang an mit der Erde eine Masse und wurden von ihr getrennt, so dass sie vielleicht eine Art unsichtbarer Trabanten derselben gewesen wären oder gar noch sind?

Ich hebe zunächst nur diese Fragen hervor, denn sie sind für die Geologie die wichtigsten. Das spezisische Ge-

wicht der Erde und das Gestein von Ovisak machen es wahrscheinlich, dass die Erde ganz auf denselben Gesteinen zusammengesetzt ist wie die Meteorit, vorausgesetzt, dass Eisen- und Stein-Meteorit zusammengehören. Darauf ließe sich schließen, dass die Meteorit ursprünglich ein Teil der Erde gewesen, und zwar zur Zeit, als die Erdbildung bis zu den Olivinschichten vorgeschritten war, und dass sie jetzt erst von ihr losgelöst worden seien. Letzteres müsste geschehen sein in Folge des Stoßes eines Weltkörpers auf die Erde, denn ohne einen solchen wäre eine Trennung nicht zu erklären, es müsste denn die Erdanziehung plötzlich aufgehört, oder doch in so hohem Grade sich gemindert haben, dass ein Teil ihrer Masse aus ihrem Unziehungstreis hinausgeschleubert werden konnte. — Un ein Zerspringen, also an einen Stoß von innen durch Gaskraft und deryleichen ist schwer zu glauben, obyleich auch das nicht völlig ausgeschlossen wäre.

Man kann also auch setzt aus chemischen und morphologischen Gründen so wenig als aus der Gesteinsbeschaffenheit einen Schluss ziehen, ob die Meteorit Kinder oder Brüder der Erde sind und man ist zunächst auf den Ausspruch des Astronomen angewiesen.

Wenn nun aber dieser bestätigt, dass die Meteorit vermöge ihrer Zahnen nicht ein Teil der Erdmasse gewesen sein können, so treten zweitens die Fragen ein: wie verhalten sich die einzelnen fälle zu einander? Sind die Steine und Lisen ursprünglich zusammengehörig, oder haben Steine und Eisen verschiedenen Ursprung: Und drittens wäre die Frage: haben wenigstens die chemisch und morphologisch gleichen Steine Einem Planeten angehört, welcher durch irgend eine Ursache in Trümmer ging?

Letzteres könnte auf den ersten Anblick eben auf der chemisch morphologischen ähnlichkeit gefolgert werden und in der Tat, die Sache schiene ganz einfach und klar. Aber es wäre doch noch eine andere Möglichkeit, die Möglichkeit, dass unter gleichen Bedingungen sich eine Unzahl kleiner Planeten bilden könnte und vielleicht heute noch bildet. Die Stücke wären dann nicht Trümmer, sondern eigene Weltkörper.

Eisen und Steine könnten nun eigene Weltkörper sein — die Größe allein stünde der Annahme nicht im Wege. — Wenn aber die kleinen Massen auf Wassergeschöpfen bestehen und sie bestehen sa auch auf einer bloß mikroskopischen Schöpfung — so fragt es sich: lebten diese im Wasser oder im Wasserdamps? Genügte ihnen ein fortwährender Niederschlag von Wasser, wie wir ihn sehr leicht uns denken können, da wir heute noch Gegenden auf unserer Erde haben, wo stets Regen fällt wie in anderen kein Regentropsen. Dieser Frage ist entgegen zu halten, dass auch zu der mikroskopischen Schöpfung Baustosse notwendig waren, welche nicht unter, sondern über den Geschöpfen gesucht werden müssen, denn nur auf wässerigen Lösungen konnte sich die mikroskopische Tierwelt

aufbauen.

Diese Tierwelt ist aber schon eine wenigstens zum Teil höher organisierte. Eine einzellige Pflanze, ein Zesenpilz may der Unfang eines Planeten gewesen sein: ein Crinos id konnte es aus inneren Gründen nicht sein, denn hier müssen wir einen längeren Zeitraum und daher auch eine größere Masse uns denken, durch welche diese Stuse der Entwicklung erreicht werden konnte.

Diese Tatsachen leiten uns in Verbindung mit der Wahrscheinlichkeit, dass Lisen der Kern des Chondrits Planeten gewesen sei, dahin: die Chondrit als Trümmer eines und desselben Weltkörpers anzusehen, Trümmer, welche nach der Zerstörung des Planeten kreisten, bis sie glücklicherweise in den Fallkreis unserer Erde kamen. Auch die Formen der Meteorit selbst sprechen endlich für Trümmer.

Wir haben also nur eine hypothetische Gewissheit: nämlich die Wahrscheinlichkeit der ursprünglichen Zusammengehörigkeit der zu uns gelangten Trümmer.

Sollten sie aber auch von unserer Erde gekommen, Teile derselben gewesen sein: ihre Jusammensetzung aus Organismen ist immerhin noch eine Tatsache, welche wich tig genug wäre für unsere Erdgeschichte. Stammen sie aber nicht von der Erde, so geben sie uns die Erklärung zweier Tatsachen: die Entstehung eines Planeten und die Wahrscheinlichkeit für die Art und Weise der Entstehung unserer Erde. Waren sie aber seder ein Planet für sich, so bezeugen sie eine Schöpfungskraft, welche wirklich unsere Begriffe von der Entstehung organischer Formen und deren Verlauf weit hinter sich ließe.

### 5.2 Die Erdbildung

Unschließend an die bisherigen Resultate ließen sich auch für die Erdbildung einige Schlüsse ziehen. Zöchst wahrscheinlich zeigt der Erddurchschnitt dieselbe Gesteinse Reihenfolge, wie die Meteorit, welche vom Eisen zum Pallasit (Olivin mit Eisen), von da zu Olivin, Enstatit, (Seldspat)-Gestein übergehen.

Auf der Erde folgt dem Olivin der Granit, ein Feldspatyestein: diese Reihenfolge entspricht auch dem spezisischen Gewicht der Minerale.

Es haben Zornblende 3-3,40, Olivin 3,35, Enstatit 3,10-3,29, Orthoklas 2,53-3,10, Quarz 2-2,80 spezisisches Gewicht. Das hohe spezisische Gewicht der Zornblende rührt offenbar noch von dem Lisengehalte her. Diese Auseinandersolge im Gewicht, wie in der Lagerung spricht ebenfalls entschieden für Bildung im Wasser, in wässeriger Lösung. Zier muss ich wiederholen, was ich schon in der Urzelle sagte: die Schöpfung, d. h. die organische Bildung kann nicht mit den Krebsen (Trilobiten) angesangen haben. Wir sinden sa überall in den späteren Schichten eine stete Entwicklungsreihe der Formen, warum sollte bloß im Ansang dieses Gesetz nicht gewaltet haben?

Schon dieses würde zu der Annahme des organischen Ursprungs der unmittelbaren Vorläuser des Silur, des Gneises und des Granits führen.

Mit dem Beweise der organischen Jusammensetzung der Chondrit ist das Zauptargument gefallen, welches bis daher im Wege stunde, den Granit für ein Wassergebilde anzusehen: beide Gesteine enthalten vorzugsweise Feldspat. — Was den Granit betrifft, so habe ich Kormen darin gefunden, welche denen der Chondrit ähnlich sind.

Ich will hier zum Zeweif def Ursprungs des Granits nicht nur auf Wasser, sondern aus Organismen, einige Punkte nachtragen. Feldspat und Quarz kristallisieren, ich möchte sagen, leidenschaftlich. Im Granit sinden sich aber beide Minerale regelmäßig nicht kristallisiert der Feldspat zeint bloß einen Blätterbruch. Linen solchen zeigt aber auch jede in Kalk verwandelte Versteinerung, 3. 3. ein Crinoidenstiel. Warum kommt der Feldspat im Granit nicht kristallisiert vor? Weil er durch eine stärkere formbildende Kraft nebunden war. Der feldspat des Granits (wo letzterer wirklich erhalten ist) zeigt ferner stets bestimmte, stets wiederkehrende Formen, nicht Konglomerat, oder Koll, auch, wie ich bemerkte, keine Kristall-Kormen. — Auch hier wächst immer eine Korm auf der andern herauf. Diese Kormen sind Schwammfor men. Der Quarz füllt die Zohlräume.

Auch auf die Gebirgsbildung möchte ich hinweisen. Dr. [Friedrich Moritz] Stapsf, welcher den Gebirgsbau im Gotthard-Tunnel gewiss zur Genüge beobachtet hat, erklärt (Neues Jahrbuch für Mineralogie 1869, S. 792), dass er keine Spur einer Massen-Zebung oder Zer-

trümmerung im Gotthard-Tunnel, dem größten Aufschluss des Erdinnern den man kennt, beobachtet habe. Dieses "Urgebirge" ist nach seiner Feststellung ein Sedimentgebirge. Ja! es ist sogar denkbar, dass es sich gebildet hat, als unsere Atmosphäre noch den größten Teil des Wassers in sich gefasst hielt, eine Atmosphäre, welche nicht durch Seuer im Erdinnern, wohl aber durch die chemische Wärme mehr erwärmt war als sie es heute ist. Ist dem aber so, so bleibt für die Entstehung der Urgesteine, wie Urgebirge kein Erklärungsgrund als das organische Leben.

Zeute noch können niedere Tiere und Pflanzen einen Zitzegrad ertragen, welcher für andere Wesen absolut töblich wirkt, somit steht auch der Unnahme organischen Lebens bei erhöhtem Wärmenrad nichts im Wene. Upatit und Graphit können ebenfalls als Zeugen organischer Tätinkeit nelten. Mit dem Niederschlan der Kieselerde (Kieselsäure) war das Erdnerippe fertin: es bestand auf den Knochen der abnestorbenen Tiere Ton, Kalk, Salz nebst Gasen und Wasser bildeten nun die Zaustoffe für die fernere Tätigkeit auf der Erd-Oberfläche. Weil diefer (nicht Erstarrungs, sondern Niederschlags) Prozess in der Zauptsache abneschlossen war, erhielt nun der Ornanismus Raum und Zeit zu einer höheren Entwicklung, welche bis dahin unmöglich war, denn sede neue Bildung begrub die kaum entstandene. Jetzt erst, nachdem eine schwer lösliche Verbindung als Mantel um die Erde gelegt war, konnte die Kormen-Entwicklung in ihre Rechte eintreten. Die Erdperioden wurden jetzt länger mit dem Vorrat an feineren Zaustoffen kam das Gesetz der Symmetrie in Geltung. Aber noch eine weitere Ursache trat hinzu: die niedersten Organismen sind Kinder der Nacht ein Vilz erstirbt im Licht der Sonne. Die nanze bisherige Schöpfung, bis zum Niederschlag der dichteren Baustoffe, war eine Machtschöpfung: die fortwährenden chemischen Verbindungen mussten eine Wärme erzeugen, welche dem Wasser nicht gestattete, in dem Grade zum Meere zu werden wie heute. Endlich waren die chemischen Verbindungen in der Zauptsache abgeschlossen und es war dadurch eine Oberfläche, eine Urt Schale geschaffen. Jetzt aber trat der Licht- und Wärmestrahl der Sonne in Wirkung, welchem bis dahin der Weg bis zur festeren Oberfläche durch eine hohe und dichte Atmosphäre verschlossen war. Es beginnt die Lichtschöpfung das Königreich der Sonne hat das Reich der Nacht auf unserem Erdball überwunden, hat die Macht in die Tiefen der Erde gebannt.

So, durch das Licht, erklärt sich nun auch das mit dem Silur plötzlich und mächtig hervortretende höhere Leben: es war der erste Auhepunkt der Schöpfung. Unter dem Linfluss des Lichtes sehen wir nun eine Lntwicklung beginnen, welche so weit von der früheren Abstand, als heute das Leben am Pol absteht von dem am äquator. So erklärt sich auch die plötzliche änderung. Zätte es sich bloß

um Abkühlung gehandelt, so müsste die Schöpfung einen viel langsameren Ubergang aufweisen. Was nach dem Niederschlan des Mannesium, Silicium, Kalium, Natrium noch im Wasser gelöst blieb, war verhältnismäßig wenig hier konnte nun das Licht anfangen zu wirken. Durch diese Unnahme erklärt sich allein, dass das Leben auf der nanzen Erde, dass auch auf ihrer nanzen Oberfläche Wasser war, sowie dass Wassertiere noch Gebirge aufbauen konnten, welche weit über den jetzigen Spiegel des Meeres reichen. Diese Gebirge sind nicht gehoben, auch nicht nach mechanischem Gesetze (durch Schwungkraft) hinaufgetrieben, ebensowenig durch Erkaltung der Oberfläche herausgepresst worden denn als Letztere erkaltete (richtiger "vertrocknete"), konnten höchstens Sprünge und Klüfte entstehen und unter der Oberfläche war kein Brei, sondern feste Masse. Was ist nun nach meinen setzigen Feststellungen Oberfläche, jetzt nachdem die Grenze des Urgebirgs und der folgenden Schichten aufgehoben ist? Was diese Schichte hinsichtlich ihrer Schöpfung von dem Urgebirge scheidet, ist nur die Wirkung des Lichts, welche um so stärker werden musste, je mehr sich die Wasserdämpfe verdichteten und das Wasser die Klüfte des Erdballs auffüllte.

Nun aber wären die Tage der Erde doch gezählt gewesen, wenn nicht eben durch das Licht gesorgt worden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Man hat bei der Zebungstheorie vergessen, dass eine Gewalt, welche nötig wäre, um Gebirge zu heben, diese zugleich zermalmt hätte: bei der Pressungstheorie ist man nicht im Stande zu sagen, wo denn eigentlich das Gebirge geblieben ist, durch welches "der Brei" gepresst worden wäre! Die ganze Obersläche kann doch nicht herausgepresst worden sein.

wäre, dass der Miederschlansprocess sich nicht rasch vollendet, dass die einzigen noch übrigen chemischen Verbindungen sich nicht rasch vollzogen hätten und damit das Leben der Erde und auf der Erde für ewig zum Stillstand nebracht newesen wäre. Die Schöpfungen des Lichts was ren neue, höhere Organismen. Diese Organismen bauten sich auf auf den noch nicht in organische Verbindungen getretenen Abfallstoffen der bisberigen Schöpfung und dadurch wurde dem Tode Zalt neboten. Dieser wäre eingetreten und die Erde wäre zur Wüste geworden, wenn nicht eben die durch das Licht geschaffenen Organismen mit ihrer Mahrung und durch ihre Linatmung Verbindungen eingingen und solche wieder lösten und so einen Kreiflauf, Leben genannt, bewirkten. Es ist also das Licht, welches unsere Erde vor dem Tode schützt, der auf ihrem Satelliten schon eingetreten zu sein scheint. Das Licht aber wirkt durch das Wasser. Das Wasser verbindet den Stein und den äther, und dies eröffnet uns den Blick in die Zukunft unseres Planeten.

#### 5.3 Die Zukunft Unseres Planeten

Der Fall von Planeten-Trümmern auf unsere Erde, (für diesen Ursprung der Meteorit sprechen die meisten Gründe) ließe ein mechanisches Enden, einen gewaltsamen Tod auch für unsere Erde fürchten. Geschah es senem oder senen Planeten, von welchen die Meteorit herrühren, dass sie zertrümmert wurden, und zwar wurden sie es wohl nicht durch eine Kraft von innen, sondern durch Unstoß von außen: so müssten wir darauf gesasst sein, dass auch unserer Erde einmal dieses Schicksal widerfahren werde, wenigstens drohte es uns. Ich muss es den Ustronomen überlassen, sich und ihre Zeitgenossen darüber zu trösten.

Aber auch auf das andere, oben schon angedeutete Aufbören des Lebens auf der Obersläche müssten wir gefasst sein, allerdings ein weniger blutiges, aber darum nicht tröstlicheres Ende, nämlich auf das Schicksal des allmählichen Absterbens, des Erlöschens der Lebenstraft durch die Verbindung der Zaustoffe zu unlöslichen Verbindungen: wür müssten fürchten, es werde unsere Atmosphäre in der Zildung unlöslicher Verbindungen auf den noch übrigen Zaustoffen sortsahren und es werde mit dem Verlust an verfügbarem Zaustoff der Kreislauf ein stets schwächerer und langsamerer werden und endlich — aufhören.

Vor diesem sonst fast vorausberechenbaren Verlause beswahrt uns einzig und allein — das Wasser das Wasser, welches unsere Erde in ihrer Bildung sich anzueignen und

festzuhalten vermochte.

Dadurch, dass die geschaffenen Wesen selbst die Verbindungen wieder lösen, welche sich in ihren Körpern bilden — dass also insbesondere die Pflanze das was sie aufsaugt, selbst wieder zerlegt, während das Thier diese Ausscheidungen in sich aufnimmt, um sie dann alsbald wieder außuscheiden und der Pflanze (nicht dem Boden) zurückzugeben: durch all diess ist ein Kreislauf geschaffen, dessen Ende nicht abzusehen ist.

Dieser Vorgang und nicht die Abkühlung der Erdrinde, von welcher so viel geredet worden ist, bildet die wahzer Geschichte unserer Erdobersläche. Allerdings scheinen wir an unserem Trabanten, dem Mond, ein schreckendes Beispiel zu haben: Dort, glaube ich, ist das Leben erlosschen. Nicht Meere sind dort, wie man glaubte und nicht Vulkane waren es, sondern der Mangel oder der Verlust des Wassers wird es gewesen sein, was diesem Planeten einen vorzeitigen Tod bereitete, was das Leben bald nach der Geburt wieder verlöschen ließ.<sup>2</sup>

Die Wärme auf unserer Erdoberfläche scheint mir mehr von der Erhaltung der die Kälte des Weltraums abwehrenden Utmosphäre abzuhängen. Die größere Zöhe der Erdatmosphäre am äquator in folge der Drehung der Erde und nicht der Ausfallswinkel der Sonnenstrahlen allein ist die Ursache der dort höheren und konstanten Wärme: sonst wäre unter dem äquator 500m über dem

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Micht die Abnahme der Erdwärme oder der von der Sonne ausgestrahlten Wärme wäre das nächst drohende Schreckzespenst, sondern das Verschwinden unserer Atmosphäre.

Meere nicht schon eine Abkühlung von mehreren Graden Durchschnittswärme sonst müsste die Schneemasse des Chimborasso sofort schmelzen.

May nun auch die Wärme in Folge der vom Waffer vermittelten chemischen Prozesse mit der Zeit abnehmen, soviel ist gewiss, dass unsere Erdobersläche ohne den schützenden Mantel der Atmosphäre, trotzdem sie tagstäglich neue Sonnenwärme aufnimmt, doch schon bei Nacht einer so niederen Temperatur versiele, dass sie das Leben nicht erhalten könnte, wie dies neuerer Zeit als Ursache des Erlöschens alles Lebens auf dem Monde behauptet wird.

Die Wärme strömt uns von der Sonne zu und wird durch die Utmosphäre zurückgehalten, so dass sie nicht sofort, wie sie da ist, wieder in den Weltraum ausströmen kann. So sind wir von einem doppelten, schützenden Mantel umgeben: der Erdrinde, welche die Wärme aussaugt, und der Luft, welche sie zurückhält, (sie ist das Kleid der Erde), und zwischen beiden leben wir, lebt die ganze Schöpfung im steten Austausch der Stosse. Zier lebt der Mensch, hier entstehen dieselben Wesen, welche einst den ersten Grundstein zum großen Zau der Erde gelegt haben. Und gerade diese niederen Wesen bezeugen heute noch durch ihre riesenhafte Vermehrung, durch ihre Erhaltung in einer Temperatur, in welcher höhere Wesen sofort sterben, dass sie fähig waren die ersten Zildner der Erde selbst zu sein.

Also nur, wenn die Quelle des Lichts und der Wärme selbst versiegte, müsste das Leben auf der Erde erstarren vom Erlöschen des fraglich seurigen Erderns haben wir nichts zu fürchten. Für die Erhaltung des Lebens sorgt der Stosswechsel unter dem Linfluss der licht, und wärmestrahlenden Sonne. Licht und Wärme sind also Vater und Mutter alles Lebendigen sie verhindern, dass das Organische vor der Zeit zum Unorganischen werde, indem sie letzteres stets wieder zu neuen Verbindungen sühren. Möchte aber auch noch so viel Licht und Wärme der Erde zuströmen, ohne die sortwährende Tätigkeit, ohne die Umbildung durch die organische Zelle wäre doch das Leben unseres Planeten nach Jahren zu zählen.

Der Unfang des Planeten war die Zelle, sie erhält ihn, so lange noch ein Lichtstrahl die Erde trifft.

Möglich ist ef dass mit der Zeit doch änderungen in der chemischen Zusammensetzung der Erdobersläche und der Atmosphäre durch Niederschläge und seste Verbindungen eintreten, wodurch Baustosse auf dem Kreislauf ausgeschieden werden. Sicher aber werden unter solchen veränderten Lebensbedingungen auch andere, ähnliche und (nach der bisherigen Erfahrung) höher organisierte Westen entstehen. Ja es lässt sich denken, dass hier auf der Erde eine Verseinerung der Organismen eintreten werde in demselben Verhältnis, wie sie nach der Olivin-Granitzeit eingetreten ist, dass Geschöpse entstehen, welchen zu ihrer Erhaltung in höherem Masse Wasser und Gase genügen,

was ja bei vielen Pflanzen setzt schon nahezu der Fall ist.

## 6 Erklärung der Tafeln

### 6.1 Vorbemerkung

Die Steine, von welchen ich meine Dünnschliffe nahm, sind durchauf beglaubigte.

Die Dünnschliffe selbst sind von mir unter der unermüdlichen Beihilfe meiner Schwägerin, Fräulein Pauline Schloz, hergestellt. So beläuft sich meine Sammlung auf 560 Nummern (worunter 360 Knyahinya), wohl die größte Sammlung, welche ef überhaupt gibt.

Bezüglich der Zerstellung der Dünnschliffe muss ich eis nes Umstands erwähnen, welcher auf die Darstellung von Einfluss war.

Jeder, welcher Versteinerungen geschliffen hat, weis, dass nur ganz wenige einen dünnen Schliff gestatten. Nicht allein wegen des häusig opaken oder gar undurchssichtigen Materials (Kalk, Ton), sondern deshalb, weil die Struktur mit einem Male verschwindet, wenn sie bis zur (vermuteten) Durchsichtigkeit geschliffen werden.

Es hängt das mit der Urt und Weise der sedem Versteinerungsprozess zu Grunde liegenden Umbildung zusammen.

So ist man vor die Wahl gestellt, entweder einen ziemlich dunklen Schliff vor sich zu haben, worin man wenig sieht, oder — von dem Wunsch nach schärferen Umrissen getrieben, wobei man stets vergeblich nach höheren Objektiven greift — einen Schliff zu bekommen, welcher nichts mehr zeigt.

Diese beiden Klippen konnten bei dem Meteoriten-Material (welches, beiläusig gesagt, wegen des Lisens dem Schliff ziemliche Schwierigkeiten entgegensetzt) nur dadurch vermieden werden, dass abwechslungsweise dünnere und dickere Schlisse gesertigt wurden.

Was die Auswahl der Formen betrifft, so werden künsetige Forscher mich wohl entschuldigen, wenn ich diese und sene Form übersah. Meine Absicht freilich war, sämtliche Formen, welche in meinem Material enthalten sind, abzubilden. Die Abbildungen sollten nicht nur Bilder, sondern auch ein Gesamtbild geben: gerade darauf lege ich sa in der Schlussfrage über die Natur des Gesteins das größte Gewicht.

Was die Unordnung der Taseln betrifft, so hängt diese mit der Unordnung des Stoffs zusammen. Da ich mir aber doch bewusst war, das ganze Material bei weitem noch nicht erschöpft zu haben: so gab ich mir auch nicht die Mühe, die einzelnen Formen zu bestimmen, oder Unsichten über den genetischen Zusammenhang derselben außzusprechen, zu begründen und hiernach die Unordnung zu treffen: es genügte wohl eine vorläusige Orientierung in dieser Aichtung. Zeute handelt es sich doch vorerst nur um den Beweis, dass das Gestein organisch und nicht darum, was alles darin ist.

Namen zu geben, vermied ich nicht auf Furcht damit

der Kritik in die Zände zu fallen, sondern weil ich zur Einsicht kam, dass durch Namensgebung vorerst nichts oder nicht viel gewonnen ist.

Lange stand ich vor der Wahl, ob ich wirklich den Weg der photographischen Darstellung einschlagen solle. Ich kam aber mehr auf äußeren Rücksichten zu dem betreffenden Entschlüsse.

Es ist bei der Kritik meiner Urzelle viel von Phantasie die Rede gewesen. Dass die Abbildungen nicht auf der Zöhe der Zeit stehen — wusste ich: dass sie aber doch richtig sind, das may z. Z. die photographische Abbildung der Obsekte meiner Urzelle Tafel 32. Sigur 5 verglichen mit Tafel 4. und 5. der Urzelle ergeben.

Ich möchte hiebe noch Zerrn Dr. Kuntze in Leipzig fragen, ob er solche künstliche Algen etwa beizubringen weis — zutreffendenfalls wäre ich sehr dankbar für Überlassung eines solchen Präparats um mich von einem Irrtum zu überzeugen. Meines Wissens sind die Dendriten und "künstlichen Algen", welche mir so ohne alle Prüfung und Kenntnis entgegengehalten wurden, bloß Streisen ohne Gliederung und Absonderung. Ihrer Entstehung entsprechend ist es eine meist gleichmäßig verteilte, zusammenhängende Farbstoffmasse, welche zwischen zwei Stein Platten liegt, also in einer vollkommenen fläche, und so Pflanzenschatten gleicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ühnlich ist Dr. Kuntze mit der Flora Columbiae von Dr. Z. Karsten verfahren. Ehe sich derselbe gegen die Anschuldigung, welche Dr. W. Joos auf diese Kritiken hin gegen ihn erhoben, reinigt, hat er kein Recht mehr, in der Wissenschaft gehört zu werden.

Ich gebe zu, dass "künstliche Algen" nach den Begrissen gewisser Forscher von Algen gemacht werden können. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass alle Gebilde, welche sadenoder bandartig sind, ohne viel Besinnens bisser für Algen erklärt wurden. Um zu wissen, dass man eisne Alge vor sich habe, gehört noch etwas mehr dazu. So sind Dinge sür Pslanzen erklärt worden, welche sicher nicht halb so viel sorm und Struktur zeigen, als meine Bilder in der Urzelle. Nicht alle Sadens oder Bündelsformen in Gesteinen oder anderen Massen würde ich, auf dieses Merkmal allein hin, für Algen erklären.

Meine Abbildungen in der Urzelle zeigen deutliche Zellenwände und Zellen wären diese Dinge künstliche Algen oder Dendriten, so könnten sie keine Querwände haben.

Siermit kehre ich zu meinem Gegenstand zurück.

Die Photographie hat große Nachteile für die wissenschaftliche Darstellung, das weis seder Forscher. Bei dem vorliegenden Gegenstand aber musste ich diesen Weg gesben, einfach weil mir sonst wieder von "Phantasie" hätte gesprochen werden können. Die Sonne und das Kollodium zusammen täuschen nicht und müssen seden derartigen Vorwurf von vornherein von mir abwenden. — Wohl aber enthält das photographische Bild weniger als der Gegenstand. Das wurde besonders bei meinen besten Obsielten fühlbar. Es konnte serner besonders bei höheren Vergrößerungen nur ein Teil des Schlisss zur Darstelslung gebracht werden, aber auch dieser nicht scharf, weil

das darübers und darunterliegende Gestein das eingestellte Bild verwischte. Zu hohe Vergrößerungen (das bemerke ich etwaigen Mitarbeitern an der Sache) taugen des halb durchaus nicht für Gesteinsdünnschliffe. Ein weiterer hindernder Umstand ist, dass die Gesteine aus stark lichtbreschenden und das Licht verschieden brechenden Mineralien bestehen dadurch entstehen Lichtreslere der unangenehmsten Urt, welche ein Ungeübter leicht für Formen anseschen kann. Um dies zu vermeiden, habe ich mich stets der schwächsten Vergrößerungen bedient und habe unvollkomsmene Strukturbilder zurückgelegt.

Die photographischen Bilder stehen also eher unter dem Obsekt. Allein, wie gesagt, ich musste wegen der Glaubwürdigkeit der Darstellung diesen Weg gehen.

Eine Ursache weiterer besonders empfindlicher Mängel der photographischen Darstellung besteht in der Wirkung der Farben auf das Bild. Unter den schlimmen ist Gelb die schlimmste.

Wo Gelb im Präparat ist, erscheint statt aller Struktur ein schwarzer Fleck. Mit keinem Mittel war diesem Übel abzuhelsen. Und gerade das Gelb des Olivins ist das senige, welches absolut keinen Lichtstrahl durchlässt. Das macht sich am meisten geltend bei der Koralle, Tasel I. Sigur 6: der schwarze King auf dem Bilde ist ein lichtes Gelb (Eisen). — Dem Gelb solgt Braun, welches ebenfalls sehr dunkelt. Blau hat den entgegengesetzten Sehler, es wird zu licht, doch zeint es noch Strukturen.

Dass der hohe Preis des Materials gewisse Sparsambeit in den Präparaten auferlegt, ist selbstredend. Es ist dadurch die Auswahl beschränkt. Gerade dieser Umstand ist der Grund, dass die Schlisse von dem Forscher selbst hergestellt werden müssen. Das ist eine Ausgabe. Aber es ist auch nur so ein gründliches, freilich durch großen Zeitauswand erschwertes Studium der Sache möglich.

Jur Vergrößerung und photographischen Darstellung habe ich mich des mittleren mikrophotographischen Upparats von Seibert Krafft in Wetzlar bedient und kann denselben nur rühmlich empsehlen. Die Bilder wurden unter meiner Leitung im photographischen Utelier der Zerren Otto Lauer Carl Bossler hier gesertigt. Da wir alle noch keine Übung in dieser Urt Aufnahmen hatten, so war die Beihilse des Zerrn Dr. Schreiner, Ussistenten am chemischen Laboratorium in Tübingen eine äußerst erwünschte. Weitere Zilse habe ich nicht zu verzeichnen, wohl aber glaube ich nicht unerwähnt lassen zu dürsen, die völlige Teilnahmslosigkeit aller dersenigen Gelehrten, welche die Sache am meisten berührt.

Bei der Unordnung des Stoffs habe ich die Schwämme vorangestellt, diesen die Korallen und dann die Crinoiden folgen lassen.

Entsprechend der Zäusigkeit des Vorkommens habe ich auch die einzelnen Gattungen in der Jahl sich vertreten lassen. Leider musste ich manches bessere Obsekt wegen der gelben Färbung zurücklegen. Wenn es sich bewährt,

was Gümbel in seiner trefflichen Abhandlung über die bayerischen Meteoriten sagt, dass es ihm gelungen sei, die gelbe Farbe durch Säuren zu entsernen, so wäre viel gewonnen.


Was die Vergrößerungen betrifft, oder richtiger das Format der Vergrößerungen, so kam in Betracht, dass eben die Einrichtung der Kamera die Einhaltung eines bestimmten Formats auferlegt. Das führt zu dem Missend, dass die Formen zuletzt alle gleich groß erscheinen.

Die Ungabe der Vergrößerung, d. h. das Verhältnis der wahren Größe zum Durchmesser des dargestellten Vilsdes ist also ein sehr wenig bezeichnendes.

Ich habe daher vorgezogen mit der Angabe des Durchmesser seer Form die wirkliche Größe des Obsekts unmittelbar zu bezeichnen.

## 6.2 Tafelverzeichniss


- I. Die Nummerierung der Abbildungen geschieht von links oben nach rechts unten.
- 2. Abkürzungen: V. heißt Vergrößerung, D. heißt wirklicher Durchmesser, mm heißt Millimeter.




I: Tafel I: Figur I — Enstatit (Bronzit) vom Kupferberg V.




2: Tafel I: Higher 2 — Enstatit von Texas V.




3: Tafel I: Figur 3 — Spherulite-Liparite from Lipari  $\mathfrak M.$ 




4: Tafel I: Figur 4 — ein Theil der Coralle Taf. 8, 9 und 10




5: Tafel I: Higur 5 — Kettenkoralle D. 0,90 mm.



6: Tafel I: Figur 6 — Crínoid D.  $I_120$  mm.



7: Tafel 2: Sigur I — auf Knyahinya. Dieselbe Tafel 5. Sig. I.




8: Tafel 3: Figur I — auf Knyahinya D. 0,60 mm.



9: Tafel 3: Figur 2 — auf Knyahínya D.  $I_r$ 30 mm. (man überfehe nícht die prachtvollen Crínoídenglieder línkf oben!)




10: Tafel 3: Figur 3 — auf Knyahinya D. I mm.



II: Tafel 3: Figur 4 — auf Knyahinya D. I mm.



12: Tafel 3: Figur 5 — auf Knyahinya D. I mm. (zu beachten die Schichtung oben)




13: Tafel 3: Figur 6 — auf Knyahinya D. I mm. (Schichtung wie 5, doch im Vilde nicht wiedergegeben, 5 und 6 auf einem Dünnschliff.)



14: Tafel 4: Figur I — auf Knyahinya D. 0,90 mm.



I5: Tafel 4: Figur 2 — auf Siena D. 3 mm. (der dunkle Strich rührt von gelber Färbung def Präparatf)




Is: Tafel 4: Figur 3 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.




I7: Tafel 4: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (Luftblase)



18: Tafel 4: Higur 5 — auf Knyahínya D. 1,60 mm.




19: Tafel 4: Figur 6 — auf Knyahinya D. I,00 mm. (Luftblase)




20: Tafel 5: Sigur I — auf Knyahinya D. I,40 mm. (siehe Tafel 2. Kings Crinoidenburchschnitte. Form unten links, vergl. Tafel I. Sig. 6 und Tafel 25. I, 2)



2I: Tafel 5: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,80 mm.




22: Tafel 5: Figur 3 — auf Knyahínya D. I,80 mm.




23: Tafel 5: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,30 mm. (undeutlichef Bild)



24: Tafel 5: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,40 mm. (Luftblase)



25: Tafel 5: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,60 mm. (mangelhaftef Bild. Der weiße King ist der Durchschnitt)




26: Tafel 6: Figur I — auf Siena D. 4,00 mm.




27: Tafel 6: Kinur 2 — auf Knyahinya D. 0,80 mm.




28: Tafel 6: Figur 3 — auf Siena D. 1,20 mm.




29: Tafel 6: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,70 mm. (in der Mitte zu stark beleuchtet)



30: Tafel 6: Figur 5 — auf Knyahinya D. 0,30 mm.



31: Tafel 6: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (Luftblase)




32: Tafel 7: Figur I — auf Knyahinya D. 2,30 mm.



33: Tafel 7: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,80 mm. (ein Aiff im Präparat. Die Nabeln)



34: Tafel 7: Figur 3 — auf Knyahinya D. 2,10 mm.




35: Tafel 7: Figur 4 — (Crinoid-Guerschnittz) aus Knyahinya D. 3,00 mm.




36: Tafel 7: Figur 5 — Schwamm: D. 1,00 mm.



37: Tafel 7: Figur 6 — Schwamm? D. 2,40 mm.




38: Tafel 8: Figur I — (Favosites) aus Bnyahinya (veryl. Tafel I: Figur 4)



39: Tafel 9: Figur I — Strukturbild aus links oben Tafel 8.




40: Tafel Io: Figur I — auf Knyahinya Querschnitt D. 0,40 mm.



41: Tafel IO: Figur 2 — Länysschnitt 0,50 mm.



42: Tafel IO: Higur 3 — auf Knyahinya D. I,80 mm.




43: Tafel IO: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,90 mm. (siehe Tafel 8. 9.)



44: Tafel IO: Figur 5 — auf Knyahinya D. 0,30 mm.




45: Tafel IO: Figur  $\delta$  — auf Knyahinya D. 0,80 mm.



46: Tafel II: Figur I — auf Knyahinya D. I,20 mm.




47: Tafel II: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,00 mm.




48: Tafel II: Figur 3 — auf Knyahinya D. I,80 mm.




49: Tafel II: Figur 4 — auf Knyahinya D. I,20 mm.




50: Tafel II: Figur 5 — auf Parnallee D. 0,80 mm.



51: Tafel II: Figur  $\delta$  — auf Moung County D. 0,60 mm.




52: Tafel I2: Figur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.



53: Tafel I2: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,20 mm.




54: Tafel 12: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,30 mm.




55: Tafel I2: Figur 4 — auf Knyahinya D.  $I_{\rm r}$ 40 mm.




56: Tafel I2: Higur 5 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.




57: Tafel I2: Figur 6 — auf Knyahinya D. 3,20 mm.




58: Tafel 13: Figur I — auf Parnallee D. 0,20 mm.



59: Tafel I3: Figur 2 — auf Knyahinya D. 0,80 mm.




60: Tafel 13: Figur 3 — auf Siena D. 0,20 mm.




61: Tafel 13: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.




62: Tafel 13: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,70 mm.




63: Tafel I3: Higur 6 — auf Cabarraf D. 0,30 mm.




64: Tafel I4: Figur I — Koralle D. 0,90 mm.




65: Tafel 15: Figur I — Koralle. Strukturbild von 14. Der linke obere Teil def Präparats, Vergrößerung 300, zeigt die Knospen-Kanäle.




66: Tafel I6: Figur I — auf Knyahinya D. 0,40 mm.




67: Tafel I7: Figur I — auf Knyahinya D. 2,00 mm.



68: Tafel I8: Figur I — auf Knyahinya, 4 Hauptarme durchschnitten, D. 2,20 mm.



69: Tafel 19: Figur I — Crinoid, veryl. Tafel 25. I und 2.




70: Tafel 20: Figur I — Crínois uns Koralle Surchschnitten auf Knyahinya D.  $I_1$ 20 mm.




71: Tafel 21: Figur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.




72: Tafel 21: Figur 2 — vergrößertef Bild von Figur I



73: Tafel 2I: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.



74: Tafel 21: Figur 4 — vergrößertef Bild von Figur 3




75: Tafel 2I: Jigur 5 — auf Knyahinya D. I,80 mm. (ich bemerke die ähnlichkeit mit Jigur I)




76: Tafel 2I: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,30 mm. (die Mundöffnung zwischen den Armen sichtbar)



77: Tafel 22: Figur I — auf Knyahinya D. 0,50 mm.




78: Tafel 22: Figur 2 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.




79: Tafel 22: Figur 3 — auf Knyahinya (Titelbild) D. 1,50 mm.




80: Tafel 22: Higur 4 — auf Knyahinya D. 0,70 mm.




81: Tafel 22: Figur 5 — auf Knyabinya D. 0,60 mm.




82: Tafel 22: Figur 6 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.



83: Tafel 23: Figur I — auf Knyahinya D. 0,90 mm.



84: Tafel 23: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,60 mm.




85: Tafel 23: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,00 mm.



86: Tafel 23: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.




87: Tafel 23: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,30 mm.




88: Tafel 23: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.




89: Tafel 24: Figur I — auf Siena D. 0,80 mm.




90: Tafel 24: Figur 2 — auf Knyahinya D. 2,80 mm.



9I: Tafel 24: Figur 3 — auf Knyahinya D. I,00 mm.




92: Tafel 24: Figur 4 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.




93: Tafel 24: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,50 mm.



94: Tafel 24: Figur 6 — auf Cabarraf D. 0,80 mm.




95: Tafel 25: Figur I — auf Knyahinya D. I,20 mm.




96: Tafel 25: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.




97: Tafel 25: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,80 mm.




98: Tafel 25: Figur 4 — auf Knyahinya D. 0,60 mm.




99: Tafel 25: Figur 5 — auf Siena D. 1,80 mm.




IOO: Tafel 25: Figur 6 — auf Knyahinya D. I,40 mm. (Zeide letztere Guerschnitte von Crinoiden)




III: Tafel 26: Figur I — auf Knyahinya D. 0,20 mm.



102: Tafel 26: Figur 2 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.




103: Tafel 26: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.



104: Tafel 26: Figur 4 — auf Knyahinya D. 1,20 mm. (bis hierher gewundene Crinoiden)




105: Tafel 26: Figur 5 — auf Knyahinya D. 2,00 mm.




106: Tafel 26: Figur 6 — auf Knyahinya D. 2,20 mm. (die dunkle Linie in 5 und 6 ist der Vahrungskanal)




IO7: Tafel 27: Figur I — auf Knyahinya D. 0,80 mm.



108: Tafel 27: Figur 2 — auf Knyahinya D. 1,50 mm.



109: Tafel 27: Figur 3 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.




IIO: Tafel 27: Figur 4 — auf Knyahinya D. I,40 mm.



III: Tafel 27: Figur 5 — auf Knyahinya D. 1,20 mm.



II2: Tafel 27: Figur  $\phi$  — auf Knyahinya D. I,00 mm.




II3: Tafel 28: Figur I — auf Knyahinya (Coralle?) D. 3,00 mm. auf demfelben Dünnschl. wie Tafel I8.




II4: Tafel 28: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,20 mm.



II5: Tafel 28: Figur 3 — auf Knyahinya D. 2,30 mm.




II6: Tafel 28: Figur 4 — auf Knyabinya D. 0,90 mm.




II7: Tafel 28: Figur 5 — auf Knyahinya D. I,50 mm.



II8: Tafel 28: Figur 6 — auf Knyahinya D. I,40 mm.




II9: Tafel 29: Figur I — auf Knyahinya D. 0,20 mm.




120: Tafel 29: Figur 2 — aus Knyahinya D. 0,90 mm.




121: Tafel 29: Figur 3 — auf Tabor D. 2,10 mm.



122: Tafel 29: Figur 4 — auf Knyahinya D. I, 10 mm.



123: Tafel 29: Figur 5 — auf Borkut D. 1,50 mm.




124: Tafel 29: Figur 6 — auf Knyahinya D. 1,30 mm. (zweifelhaft)



125: Tafel 30: Figur I — auf Knyahinya D. I, IO mm. (Koralle?)




I26: Tafel 30: Figur 2 — auf Knyahinya D. I,40 mm. (Koralle und Crinoid, veryl. Tafel 20.)




127: Tafel 30: Figur 3 — auf Knyahinya D. 0,30 mm. (die Arme nezförmig verschlungen)




I28: Tafel 30: Figur 4 — auf Knyahinya D. I,85 mm. (Anschnitt)




I29: Tafel 30: Figur 5 — auf Knyahinya D. 0,70 mm. (Anschnitt)




130: Tafel 30: Figur 6 — auf Knyahinya D. 0,40 mm. (Struktur dem def Schreibersitf im Meteoreisen gleich)




II: Tafel II: Figur I — auf Knyahinya D. I,20 mm. (nicht yanz vollständigef Bild)




132: Tafel 31: Figur 2 — auf Knyahinya D. 0,50 mm.



I33: Tafel 3I: Sigur 3 — auf Knyahinya D. I,20 mm. (Drei übereinstimmende Formen auf 3 Dünnschliffen, in I und 2 beidemale der horizontale Ausschnitt)




134: Tafel 31: Figur 4 — auf Knyahinya (ob Schwamm ober Koralle?) D. 0,90 mm.




I35: Tafel 3I: Figur 5 — auf Knyahinya D. I,50 mm.



136: Tafel 3I: Higur 6 — auf Knyahinya D. 1,40 mm.



137: Tafel 32: Figur I — auf Knyahinya (Æinschluss) D. 1,50 mm.



I38: Tafel 32: Figur 2 — Borkutkugel D. I,00 mm.



I39: Tafel 32: Figur 3 — Nummulit von Kempten. Die Kanäle sind (mit der Lupe) scharf zu erkennen



140: Tafel 32: Jigur 4 — Dünnschliff von Lias  $\gamma\delta$ . Dieser Dünnschliff ist der von mir zusammengestellten Sammlung von 30 Dünnschliffen von Sedimentgesteinen entnommen, gefertigt von Geognost Fildebrand in Ohmenhausen bei Reutlingen, welche ich zum Studium der mikroskopischen Beschaffenheit der Sedimentgesteine nebst Einschlüssen dringend empsehle.



141: Tafel 32: Figur 5 — Cozoön canadense, angebliches Kanalsystem des Cozoön.



142: Tafel 32: Figur 6 — besyl. Beibe Gesteine, benen die Schliffe entnommen sind, von mir in Little Nation gesammelt. Man vergleiche Kanalsystem des Nummuliten Sig. 3 mit diesem angeblichen Kanalsystem! Bild 3 und 5 sollen dasselbe Ding sein. Ju Sig. 5 vergleiche Urzelle Tafel 4. 5.

## Alphabetischer Inder

Crinoid, 8, II, 14, 49,	33, 209–228, 230,
51, 55, 57–59, 62,	232-245
67, 69, 70, 83,	L'Aligle, 33
88, 106, 114, 143,	Linn, 33
212, 234	Marion County, 33
E0300n, 249	Mezo-Madaraf, 33
	Monroe County, 33
foralle, 53	New Concord, 33
Lasaulr, 22	Olvinio, 33
	Orvinio, 22
Matowsty, 22	Parnallee, 33
Meteorit, 8, 9, 12, 13,	Pultust, 33
16, 17, 20, 22,	Siena, 33
23, 27, 28, 32,	Simbirsk, 33
84–86, 88, 90, 96	Tabor, 33
Blansto, 33	Tipperary, 33
Borkut, 33	Weston, 33
Bremervorde, 33	44
Cabarras, 33	Ovifat, 82
Château-Renard, 33	spherulite, III
eisen, 71	
Zeredia, 33	Urania, 39, 48, 50, 65,
Knyahinya, 13, 30,	69, 70