Die Urzelle

Nebst dem Beweis

dass

dass

Granit, Gneis, Serpentin, Talk, Gewisse
Sandsteine, auch Basalt, endlich

Meteorstein und Meteoreisen aus Pflanzen
Bestehen:

die Entwicklungslehre durch

Tatsachen neu Begründet

von Dr. Otto Hahn

mit 30 Lithographirten Zafeln

 1^{st} Edition, Tübingen 1879 S. Laupp'schen Buchhandlung

Internet Archive Online Edition Attribution RonCommercial ShareAlife 4.0 International

Inhaltsverzeichnis

1		7												
	1.1 Geschichte einer Entdeckung	7												
	1.2 Die Lagerung des Cophyllum-Ralks	10												
	1.3 Baf ist Cophyllum?	13												
	1.4 Daf Eozoon	16												
	1.5 Die Pflanze	20												
	1.6 Eophyllum canadense	22												
	1.7 Die Formen	24												
	1.8 Di Arten	25												
	1.9 Uberblid	29												
	1.10 Ergebniffe	33												
2	Das erste Tier	36												
3	Serpentin	40												
4	Bas ist der Laurentian-Gneis?													
5	Glimmer 4													
6	Daf "Urgebirge" 40													
7	Eine Gesteinslehre 53													
8	Carrararischer Marmor													
9	Nachtrag 60													
10	Bafalt e													
11	Feldspath													
12	Silur	64												
13	Rüchlich	66												
14	Die Ergebnisse dieser Entdeckungen 7													
15	Sandsteine	76												

16	Meteorstein	78
17	Meteoreisen	82
18	Die Urzelle — Crystall-Pflanze — das Tier	84
19	Der Krystall	88
20	Shluff	9

Abbildungsverzeichnis

1	$\mathfrak{T}\!$																98
2	Zafel 2 .																99
3	\mathfrak{T} afel 3 .																100
4	Zafel 4																101
5	Zafel 5 .																102
6	Zafel 6																103
7	\mathfrak{T} afel 7 .																104
8	Zafel 8																105
9	Zafel 9																106
10	Zafel 10																107
11	Zafel 11																108
12	Zafel 12																109
13	Zafel 13																110
14	Zafel 14																111
15	Zafel 15																112
16	Zafel 16																113
17	Zafel 17																114
18	Zafel 18																115
19	Zafel 19																116
20	Zafel 20																117
21	Zafel 21																118
22	Zafel 22																119
23	Zafel 23																120
24	Zafel 24																121
25	Zafel 25																122
26	Zafel 26																123
27	Zafel 27																124
28	Zafel 28																125
29	Zafel 29																126
30	Zafel 30																127

Vorrede

Es gibt wohl keine Wissenschaft, welche nicht und zwar gerade da, wo sie es am wenigsten wünscht, weiße Blätter in ihrem goldenen Buche aufzuweisen hätte.

In der Geologie war die Frage über die Entstehung und Vilbung unserer Erdoberfläche eine vielbesprochene und man redete sich manchmal ein, eine gelöste.

Aber man musste sich dann, wenn man ehrlich sein wollte, doch gestehen, dass eben exakte Beweise für den einen oder andern behaupteten Hergang fehlten.

Dies tras vorzugsweise beim Urgebirge zu — kehrte aber auch beim Flöze und am bedenklichsten bei den älteren "vulkanischen Gesteinen" wieder. Wohl mühten sich Männer der Wissenschaft ab, ihre Behauptungen über die "Entstehung" des Urgebirgs zur Geltung zu bringen. Beweise lagen vor, aber kein einziger, welcher durchschlug.

Einen solchen glaube ich jest geliefert zu haben.

Die "Entstehung" der ganzen heutigen Erdoberfläche mit Aufenahme der heute noch sich bildenden vulkanischen Gebirge und auch bei diesen hat das Wasser — zum mindesten einen mechanischen, ich glaube aber auch chemischen Anteil, — ich sage die "Entstehung des Urgebirgs" ohne alle Feuerwirfung ist durch die vorgelegten Tatsachen erwiesen, und zwar so voll als überhaupt etwas zu beweisen denkbar ist. Möglich ist es freilich, auch diesen Beweis eine Weile anzuzweiseln. Allein ich bin sicher, der Widerspruch wird bald verstummen, denn wo man etwas millionensach sehen kann, da

fann ein Zweifel nicht mehr bestehen. Ein gewöhnliches Mikroskop, eine gute Lupe genügt vollständig, sich zu überzeugen.

So kann ich denn meine Arbeit ruhig in die Welt senden. Ihr Erfolg, die Anerkennung der Tatsachen und ihrer Deutung, macht mir keine Sorge.

Allerdings werden die Botaniker nicht ungestraft in ihre Wissenschaft mich haben einbrechen lassen.

Mögen sie die Hauptsache ins Auge fassen.

Was die Bedeutung meiner Entdeckungen betrifft, so wird mir billig Niemand zumuten, sie nicht zu kennen und zu verstehen. Die bisherige Wissenschaft der Geologie ist mit Einem Schlage zum dritten Teile antiquiert. Ja ich darf es aussprechen, es ist nun erst ein Grund darin gelegt.

Durch meine Entdeckung der Pflanze im Meteorstein von Annahinna war mir ein Blick in die Sphären des Himmels gestattet. Was dem stolzen Fernrohr nicht, das war dem stillen, bescheidenen Mikroskop vergönnt.

Hier drängt ef mich den Dank gegen Gott außusprechen, der eine jahrelange Arbeit, für welche ich die Zeit neben meinem ansstrengenden Berufe als Rechtsanwalt nur in den Stunden der Erholung finden konnte, mit einem Erfolg gelohnt hat.

Alles hat seine Zeit, auch die Entdeckungen haben sie. Wer sie macht, ist zuletzt gleichgiltig.

Ferner habe ich hier noch öffentlich Dank zu sagen der hochgesehrten Naturwissenschaftlichen Fakultät in Tübingen, welche meine erste Arbeit über das Eozoon canadense mit der Doktor-Würde honoris causa belohnt hat. Sie hat mir durch diese Anerkennung

den Weg der Arbeit erleichtert und mich aufgefordert, der hohen Ehre mich würdig zu zeigen.

Es möge mir gestattet sein, meinen Genossen in der Wissenschaft und auf dem Wege der Forschung noch dringend ans Herz zu legen, jetz auf dem aufgeschlossenen Wege besonnen vorzugehen.

Ich muff die Arbeit in andere Hände legen, das weiß ich.

Wer sie aufnimmt, der setze sich vor, jahrelang zu beobachten und zu sammeln, ehe er die Welt mit einer Hypothese belästigt, welche doch meist nur eine Behauptung über das Mögliche ist. Eine Tatsache festgestellt, festgestellt wie es ist, ist mehr wert, als zehn Hypothesen, wie es gegangen sein könnte.

Die Zeichnungen sind alle von mir entworfen, teilweise aufgeführt und auf Stein gezeichnet.

Eine besondere Erklärung zu den Figuren hielt ich nicht für notwendig, da der Text sehr kurz ist.

Reutlingen, August 1879

Dr. Otto Hahn, Rechts-Anwalt.

1.1 Geschichte einer Entdeckung¹

Sir W. Logan in Montreal war ef, welcher zuerst die Aufmertsfamkeit auf einen im Laurentian-Gneis von Lanada eingelagerten Serpentin-Ralk lenkte, indem er dabei die Vermutung aussprach, ef enthalte dieser Ralk und zwar in eingebetteten "Knollen" die Reste der ersten organischen Schöpfung.

Dr. W. Dawson in Montreal, Kanzler des M'Gill College dort, nahm sich der Sache weiter an und bestimmte in Verbindung mit Dr. Hunt in Montreal und Dr. W. Carpenter in London, dem berühmtesten Mikroskopiker Englands, die Natur jener Knollen dahin, sie seien die versteinerten Reste einer Niesen-Foraminisere, die dem Genus Nummulina ähnlich sei. Dr. Dawson nannte dieselbe Eozoon canadense. Unter diesem Namen wurde sie dann auch zur großen Freude Aller auf das erste noch ganz weiß gelassene Blatt der Naturgeschichte eingetragen. Allerdings wurde der Einstrag angesochten. Alsbald erhoben sich bedeutende Stimmen gegen die organische Natur des Gesteins. Die Schriften über Eozoon schwollen dermaßen an, dass man sagen dars: das Eozoon hat seine eigene Literatur.

Ich selbst beteiligte mich spät erst an dem Rampse und glaubte in einem Aufsätze über Sozoon canadense in den Württembergischen naturwissenschaftlichen Jahresheften den Beweiß gegen die organische Natur geführt zu haben. Carl Möbius ergänzte denselben durch

¹Ich nenne das Rapitel "Geschichte einer Entbedung": muß aber auf IJ. verweisen als Fortsetzung dieses Rapitels. Spätere Entbedungen konnte ich nicht mehr bier aufführen.

Abbildungen, insbesondere von lebenden Foraminiseren.

Ich werde am Schluss dieser Abhandlung noch über die Frage, warum das Eozoon canadense kein Tier sein kann, mich verbreiten.

Bei diesem Streit war das Misslichste der Mangel an Material. Von Canada war so gut wie nichts zu bekommen, im Handel vollends nichts.

Die Stücke, welche gelehrte Freunde mir schenkten, waren dünn geschnittene Plättchen einer ganz bestimmten Form, nämlich der "lamellaren" des Gesteins.

Möbius allerdings war glüdlicher.

Ihm stellten Dr. Dawson und Carpenter neben Handstücken ihre besten Schlisse zur Verfügung.

Freilich schließt diese besondere Güte zugleich eine große Gefahr in sich, weil man nur das zu sehen bekommt, was der Gegner als Beweisstück verwerten will. —

So lag die Sache. Ich war von der unorganischen Natur des Eozoongesteins überzeugt, davon wenigstens, dass ef ein Tier nicht sei.

Einzig die feinen "Ranal-Systeme", wie sie Dr. Carpenter nannte, ließen mir keine Ruhe. Die Unruhe wurde wesentlich verschärft durch den Gedanken, welcher sich mir immer wieder aufdrängte:

"der Gnieff ist ein durch Wasser gebildetes also Sedimentgestein: seine Kalklager müssen die ersten organischen Einschlüsse enthalten, denn mit dem Silur kann das Leben nicht anfangen."

Letzteres war Hypothese, aber eine Hypothese wie viele, Gedansten, von welchen man sich nicht mehr losmachen kann: denn sie sind eben wahr.

Da fügte sich's, dass ich auf eine Einladung der Regierung von Canada eine Reise dorthin zu machen hatte. Dr. Dawson wurde besucht, mein nächster Gang war nach Côte St. Pierre (Petite Nation). Dort sah ich die Schichtenlagerung und setzte mich in den Besitz einer großen Anzahl von Eozoonkalts und Eozoonskücken.

Nach meiner Rückreise untersuchte ich das Material.

Das Ergebnis lege ich vor. Es besteht darin: dass der Kalk des Laurentian-Gneises von Canada, der ältesten Sedimentschichte unserer Erde, eine Pflanzenschöpfung enthält, angehörend der Familie der Algen.

Es sind bis jett wenige neue, von den lebenden verschiedene Arten sestgestellt. Dass es aber bei fortgesetzer Untersuchung in kurzer Zeit mehr werden, davon bin ich überzeugt.

Die Pflanzen sind alle in dem wirklichen "Eozoongestein", welches ich von nun an Cophyllumkalk nenne, eingeschlossen von mir gefunden worden.

Ich bemerke nämlich hier sofort, worauf auch mein verehrter Freund Dr. Dawson aufmerksam machte: Not all is Eozoon!

Anfangs allerdings wurde zwischen Cozoongestein und den Knolein nicht unterschieden.

Manches Wort wäre nicht geschrieben worden, wenn man über das Gestein selbst einig gewesen wäre.

1.2 Die Lagerung des Cophyllum-Ralks

Wir verdanken dem Geological Survey of Canada unter der Leitung (früher Sir Willam Logans nun) des Herrn Dr. Selvyn die geologische Beschreibung und eine sehr schöne geologische Karte von Canada, serner seit 10 Jahren sortlausende in englischer wie französischer Sprache erscheinende jährliche Berichte. Das Verdienst Sir Willams ist es auch, die Laurentian-Formation als solche auf dem Granit auflagernd sestgestellt zu haben. Diese Formation, also die älteste, soll nach Sir Logans Feststellung 30,000 Fuß mächtig sein.

Große Züge des Laurentian-Gneises erstrecken sich von Süden nach Norden streichend über ganz Canada.

Das einmal führt er Orthoklass das andermal Anorthit-Feldspat.

In letterem Gneis sind die Kalkschichten eingebettet, welche wies der die Cophyllumschichten enthalten.

Der Kalk wird in der "Geologie von Canada" Kristalline Limestone genannt.

Er mag bei Côte St. Pierre 100 M. mächtig sein.

Das den Kalk umhüllende Gestein ist Diorit und dieser ist in dem Gneis eingelagert, welcher hier vorzugsweise von Hornblende und Glimmer gebildet wird. Der Glimmer ist Biotit.

Ich füge hier bei, dass dieselben Kalkschichten eine Reihe von Mineralien und zwar in großer Menge Apatit, Glimmer und Augit enthalten.

Sodann kommen vor Datolit, Scapolit, Salit, Spinell, und sehr schöne Zirkon.

Im mächtigen Ralke liegen Schichten von Dolomit und Ausgit, über diesen eine Lage von edlem Serpentin (Ophit) mit Chrysotiladern und nun folgen wechsellagernd die Serpentins und Ralklamellen und Schichten, welche als "Eozoon" angesprochen werden.

Die erste Kalklamelle ist im Durchschnitt etwa 50 mm., die zweite etwa 30 mm.; ef folgen sich 5×6 immer kleiner und dann geht das Gestein in eine körnige (acervuline) Form über.

In diesen Serpentin-Ralkschichten, aber auch auf Gneis oder Dolomit aufgelagert, finden sich "Knollen", d. h. rundliche Gesteinstücke, welche eine gewisse Regelmäßigkeit der Form zeigen.

Es sind Serpentinlamellen, welche von einem Mittelpunkt aufsgehend sich dann verjüngend nach der Seite verbreiten.

Die beste Abbildung, die ich kenne, ist in Dawson's Life's Dawn on Earth, London 1875 zu S. 168 in Naturselbstdruck und daher unsehlbar treu.

Unbegreiflich ist, dass man beim Anblick dieser Form nicht sofort an eine Pflanze dachte.

Es erklärt sich nur daraus, dass man von Ansang an, da man solche Stücke nicht hatte, einmal in den Gedanken einer Foraminisere vertieft, davon nicht mehr loskam, während die Gegner (worunter auch ich) im Ramps gegen die Foraminisere auch an nichts weiter dachten, als daran: kein Tier, — also Mineral. Die Abbildungen des Eozoon-Gesteins sind nach Stücken gemacht, welche einsach in Platten geschnitten sind. So auch die Abbildungen von Prosessor Dr. Zittel in der Paläontologie: doch es soll hier nicht vorgegrissen werden.

Die Cophyllumschichte ist etwa 50 Lm. mächtig: Auf den körnigen Formen geht das Gestein wieder über in die geschichtete. Es folgen sich Serpentin und Dolomit und dann lagert sich wieder mächtiger Kalk auf.

Der Serpentin ist überall ein wirkliches Lagergestein. Er ist durchsichtig, grün, gelb, wo er der Luft ausgesetzt ist, wird er rötlich.

Die Schichten von Serpentin, wie die von Dolomit um den Cophyllum-Ralf und der Cophyllumfalf felbst sind je 30-50 Cm. mächtig. Die Cophyllumschichte hat nicht ein horizontales Lager und eine solche Decke, sondern beide sind uneben, rundlich, zuweilen in allen Curvenlinien ausgezackt. Das Cophyllum-Gestein — weggedacht aus seinem Lager, würde eine unregelmäßige Höhlung ähnlich unseren Tropfsteinhöhlen übrig bleiben.

Die Cophyllumschichte selbst schließt Brocken Dolomit ein, um welche sich das breite Serpentinband und dann erst der Cophyllumstalk wieder lagert.

1.3 Was ift Cophyllum?

Ich fand die Form, welche ich zuerst Cophyllum nannte, in einem "Eozoonstück" in dem ersten weißen Kalkbande, das auf der Serpentinschichte lagert, also zwischen zwei Serpentinbändern.

Erst jett kam mir der Gedanke: Sind denn nicht die ganzen "Cozoon-Knollen" auch Pflanzen?

Diese Frage musste ich bejahen, nachdem ich durch Behandlung des Ralks mit Salzsäure größere Lamellen, welche in Berbindung mit den Serpentinbändern stehen, bloßgelegt hatte. Die Formen sind so konstante, stets wiederkehrende, dass sie anders nicht erklärt werden können.

Damit war natürlich auch der beste Gegenbeweis gegen ein Tier gewonnen. Denn die entdeckten Algenarten sinden sich auch heute nie in Steinen oder Muschelschalen.

Die Pflanzen gehören alle der Familie der Algen an. Sie sind entweder unmittelbar auf Dolomit und Gneis aufgelagert oder in dem eigentlichen Cophyllumkalk d. h. der Schichte von Serpenstinkalk zwischen den großen Dolomits und Serpentinschichten.

Aber nicht bloß im Kalk dieser Schichten finden sie sich, sondern auch im Serpentin derselben.

Reine oder wenige Pflanzen finden sich in den großen Serpenstinschichten, welche den Cophyllumkalk umgeben, wenigstens nicht in der untersten.

Diese Serpentinlagen im Cophyllumkalk eignen sich vermöge ihrer Durchsichtigkeit vorzüglich zu Beobachtungen: die seinsten

Struktur-Verhältnisse lassen sich hier in Form der zartesten Linien wahrnehmen.

Allerdings gehört ein scharfes Auge dazu, um nicht die Linien, welche der Serpentin immer bildet, mit den Zellwänden zu verswechseln. Diese Eigenschaft des Serpentins war wohl die Ursache, warum es 19 Jahre anstand, bis die ältesten aber beste erhaltenen Pflanzenreste entdeckt wurden.

Im Serpentin finden sich Füllmassen zerstörter Zellen in Dolosmit verwandelt. Un der Hand derselben braucht man nur senkrecht nach dem Kalkband hinabzusteigen und man wird die feinste Zeichsnung einer Pflanze finden.

Die gefundenen Pflanzen sind teils mit bloßen Augen, teils nur mikroskopisch sichtbar und zwar bis zu den kleinsten denkbaren Größen. Sie sind in ein Silicat verwandelt, also durch Behand-lung des Kalks mit Säure bloßzulegen.

Da erscheinen die in Kalk eingelagerten Pflanzen als blendend weisse Stengel, Relche, Blätter. In Dünnschliff freilich sehen sie bei durchfallendem Licht gelbbraun aus, was Möbius veranlasste ihre Farbe als hellbraun zu beschreiben. Dies ist bloß Folge der Lichtberechnung in der opaken Masse. Welches Mineral die Füllmasse bildet, ist zweiselhaft. Mann nannte es Flocculit.

Die Füllmasse der Pflanzen im Serpentin ist wieder Serpentin, doch finden sich darin, wie oben gesagt, die Modelle von Pflanzen von Dolomit. Die Füllmasse der Pflanzen im Kalk ist meist ebenfalls ein Silicat.

Meine Aufgabe ist nun die Darstellung.

Diese kann nur durch Abbildungen erreicht werden.

In der Unterscheidung der Arten habe ich die Fortpflanzungssorgane, soweit erkennbar, zu Grunde gelegt.

Obgleich es nun möglich wäre, für die gefundenen Pflanzen analoge Bildungen unter den lebenden oder fossilen zu sinden, so musste ich, wenn ich meine Entdeckung schnell zum Gemeingut der Wissenschaft und zur Grundlage fernerer Forschung machen wollte, doch den andern Weg einschlagen, und ohne Rücksicht auf diese bestimmen.

Ein System läst sich mit dem vorhandenen Material doch nicht begründen. Ich bin überhaupt kein Freund von Systemen und halte die Zeit für Aufstellung solcher auch noch nicht für gekommen. Wir sind noch in der Zeit der Saat und nicht der Ernte in der Naturwissenschaft.

Ehe ich aber auf die Beschreibung der Pflanzen übergehe, will ich noch einmal einen Blick auf das Eozoon werfen.

1.4 Das Eozoon

Die Behauptung, dass die "Eozoon" Formen einer Foraminifere angehören, fällt in sich zusammen mit dem Beweis, dass die Formen Pflanzen sind. Foraminisere und Pflanze schließen sich aus.

Meine neuesten Untersuchungen aber haben, wenn sie auch einselne frühere Behauptungen modifizieren, die Beweissätze der Gegener für eine Foraminisere vollständig entkräftet.

Dazu gehört vor Allem der wahre Sachverhalt bezüglich der "Ranalspsteme". Auf diese hat man das größte Gewicht gelegt. Sie bildeten das Schlussglied in der Beweiskette.

Hier aber verhalten sich die Tatsachen jetzt vollkommen anders, und es ist unbegreislich, wie Dr. Carpenter diese Kanalspsteme in das Schema des Cozoon aufnehmen konnte.

Diese Kanalspsteme sind einmal, wie ich Taf. III. zeige, sehr verschieden. Wäre das Eozoon eine Foraminisere, so wäre es gar nicht denkbar, dass in — zugestandenermaßen ein und derselben Foraminisere ein Kanal becherförmig, ein anderer fadenförmig, ein dritter perlschnurartig gereiht wäre.

Sodann finden sich, wie Möbius dargestellt hat, bei der lebenden Foraminisere bloß sadenförmige Kanalsysteme.

Becher, Rugel und Perlichnur Formen kommen gar nicht vor. Die Fadenformen habe ich in etwa 20 Dünnschliffen bloß einmal (Taf. II. Fig. 3) gefunden, überall herrscht die Becher form vor. Aber auch, wo die Fadenform vorkommt, gehen die "Ranäle" von Zweigen aus, was verschwiegen wurde.

Was aber endlich den Ausschlag gibt, ist, dass diese Kanalspsteme bloß an ganz vereinzelten Stellen vorkommen, ohne dass man irgend einen Grund hätte, anzunehmen, dieses Fehlen habe seine Ursache in der Metamorphose des Gesteins oder in einer anderen solchen Ursache. Dies ist längst hervorgehoben worden.

All dies konnte nur solange angehen, als man nicht über Material genug verfügte. Dünnschlisse sind in vielen, sehr vielen Beziehunsgen unentbehrlich; aber sie ersetzen nicht die Gesamt-Anschauung. Und ferner ist notwendig eine Untersuchung der ganzen Lagerung, insbesondere des die Knollen umgebenden Gesteins.

Damit wäre ef jedem halbwegf Geübten leicht gewesen, sich sofort ein Urteil zu bilden und es wäre wohl nicht zu Gunsten der Foraminisere ausgefallen.

Dass die "Schale" größtenteils sehlt, kann ich auf meiner Anschauung versichern; dieser "proper wall" soweit er nicht auf optischer Täuschung beruht, sindet sich an seltenen Stellen bloß angesdeutet: ebenfalls ohne dass man für das Fehlen desselben die Schuld auf Zerstörung schieben könnte: denn die seinsten "Ranalsysteme" unmittelbar daneben sind ja erhalten.

Daff die Tubuli überall Chrysotil sind, bedarf keiner weiteren Aufführung mehr.

So bleiben von dem "Tier" bloß die Kammern übrig.

Diese aber sind wie aller Serpentin. Allerdings die reihenförmisge Lage der Körner wäre auffallend. Das Merkmal der Kammer nun wäre die einzige Beweiß-Tatsache: sie ist für sich allein nach dem Zugeständnis der Gegner selbst nicht hinreichend, um eine Fosaminisere festzustellen.

Ich gieng bei meiner Untersuchung von dem Bild Tafel IV. und V. aus.

Nachdem mir durch dieses Bild die Pflanze unwiderleglich seste gestellt und so ein Bild der Pflanze des Laurentiangneises gegeben war: konnte es nicht schwer sein, die Kanalsusteme der "Eozoone knollen" überhaupt zu deuten. Sie lösten sich alle in Pflanzen auf.

Sodann bildete dieselbe Form auch den Schlüssel zur Lösung des ganzen Gesteins.

Sobald die Form des Cophyllum einmal als Pflanze feststand, so wurde es wahrscheinlich, dass auch die großen Serpentin-Rammern nichts als die Füllmassen ehemaliger Pflanzenformen seien.

Der Beweis wurde ergänzt mit Durchschnitten größerer Stücke, wo eine Anzahl Pflanzen alle und immer in Einem Ausgangspunkt zusammenlaufen.

Man sehe doch einmal den Naturselbstdruck des Sozoon in Dawsson's "Life's Dawn on Sarth"! Man denke sich das Bild nach der anderen Seite ergänzt. Freilich in 4 eckig willkürlich herausgesägten kleinen Stücken war die Pflanzenform nicht leicht zu erkennen. Man nehme nun ferner ein 1/2 Meter großes Stück Lagergestein und man sieht dort von etwa 3 zu 3 Cmetern auf dem Serpentin die Formen der "Ranalsusteme", hier im Großen von Serpentin nachgebildet: man wird ferner die Wurzelansäße an der Gränze der Serpentin» und Dolomit-Schichte finden. Endlich sind nicht nur die Zellhäute erhalten, sondern die Prothallien dem Hundert nach im Kalk und im Serpentin!

Wenn man das Gestein genau untersucht, so findet man die Formen schon mit blozem Auge.

Blos eine Ergänzung dieses Beweises ist es, dass dieselben Pflanzenformen in den Dolomit- und Kalk-Lagern vorkommen, im Kalk in Serpentin, aber auch in Glimmer verwandelt sind. Diese Glimmerpflanzen sind das Schönste, was man sehen kann.

Nun muss ich aber noch auf einen Umstand aufmerksam machen, darauf nämlich, dass der Serpentin in den Stücken, welche Eozoon sein sollten, also in den Knollen, Füllmasse ist. Der Kalk ist das Lager.

Anders bei den Formen der Tafel J. 3., welche ich Coralloidea nenne. Hier sind die Algen in Dolomit verwandelt, der Serpentin ist das Lager. Hier also ist das Verhältnis umgekehrt.

Man sieht hieraus, wie oberflächlich, einseitig überhaupt die bisherigen Untersuchungen waren, wie sie vollständig durch die Knappheit des Materials beherrscht waren.

1.5 Die Pflanze

Ein größeres Rätsel freilich alf das "Eozoon" ist wohl schwerlich der Natursorschung aufgegeben worden.

Als ich die erste Ankündigung des Sophyllum dem "Ausland" übergab, dachte ich noch nicht daran, dass die großen Serpentin» bänder auch Pflanzen seien. Ich hatte diese Arbeit zur Hälfte nach dem ersten Plan fertig, als ich endlich ein schlechtes Sesteinserem» plar in die Hand bekam, bei welchem sich aber gerade deshalb die Serpentinteile eigentümlich deutlich abhoben.

Ich sah und sah und mit einem Male war mir klar, dass die "Sarcode-Rammer" nichts als Pflanzenzellen seien. So geht es den Mikroskopikern.

Was man mit bloßem Auge sehen kann, sehen sie nicht mehr.

Run war ef aber eine schwere Arbeit, die Sache zu prüfen.

Ich habe jest keinen Zweifel mehr.

Und nur so erklären sich alle Tatsachen.

Die Serpentinbänder, welche das, was man bisher Eozoon nannste, zusammenseten, gehören einer Alge mit breiten Blättern, wenn der Ausdruck erlaubt ist, an, welche von einem Punkte ausgehend sich in regelmäßigen Formen legt. Die Basalzelle sitt auf dem Serpentin oder Dolomit auf. Wurzeln fand ich nur in Einem Falle, jedoch nicht sicher.

Der Kalk ist die Einlagerung. Deutliche Brukellen sind darin sichtbar: denn im Dünnschliff stechen sie durch den Kalk noch durch.

Die Gegenprobe kann man durch Auflösung des Kalks mit Säure machen. Hier sind die Blätter völlig mit Bruzellen besetz:

die "Warzenansäte" Gümbel's.

Die Sache ist noch viel klarer, wo die Pflanze in Dolomit verwandelt ist. Hier kann man mit bloßem Auge die Bruzellen erkennen.

Wasserflare Becherzellen sieht man auf dem Dolomit herausgewittert lagern.

Am schönsten aber sind die Kalke, in welchen die Pflanzen teils in Serpentin teils in Glimmer verwandelt sind.

Dieselben Zellen sinden sich in einem Doppelspat in Kupfer und Malachit verwandelt mit bloßem Auge sichtbar!

Die Kanalspsteme des "Zwischen-Stelets" sind also mikrostopische Pflanzen, welche teils einfach von Kalk oder auf den großen Algen angewachsen oder dort tot abgelagert worden sind.

Wie ich im Eingang angedeutet, braucht man allerdings einen Schlüssel zu dieser neuen Schöpfung, — denn sie ist unserer Vorstellung vollkommen neu. Dieser Schlüssel liegt in den mikrosstopischen Formen.

Nun aber lässt sich von diesem sicheren Ausgangspunkte die Sache leicht verfolgen.

Nur muss ich auch hier vor der alleinigen Benüßung der Dünnschlisse warnen. Es ist Sache des Zufalls, ob man hier ein Bild bekommt. Hunderte lassen sich anfertigen, aber nur ein ganz geübtes Auge vermag sie zu enkissern.

1.6 Eophyllum canadense

Ich übertrage nun den ersten Namen:

Cophyllum auf die mit bloßem Auge sichtbare größte Pflanzenform.

Sie bildet die Algenwiesen im Laurentian, aber freilich nicht in gar riesiger Form, nur durch ihre Menge ist sie riesig. Sie ist enthalten in den Serpentin-Anollen des Laurentiankalks, welche man bisher Eozoon canadense nannte.

Aber hier ist sie nur in ihrer größten Entwicklung: die acervuline Form des Eozoon ist nichts, als kleines Eophyllum und vorzugsweise Bruzellen desselben.

Die Pflanze ist eine Alge: in ihrer eigentümlichen Form stimmt sie mit keiner lebenden vollskändig, jedenfalls gehört sie schon zu den höher entwickelten Fucusarten.

Die Basalzelle ist eine halbrunde becherförmige Zelle, welche im Dolomit aufsett, einige kleinere Zellen und dann die nächste in Becherform treibt, welche immer wieder neue Zellen ansett.

Die neuen Knospen, ich nenne sie Brukellen, siken überall auf dem Rande der Zelle auf, und geben dem Blatte dadurch das höckerige Ansehen.

Die Form ist in Tafel J. 1. dargestellt.

Das von Carpenter abgebildete Stück Eozoon, welches nachher in so viele Bücher überging, zeigt in dem Rugligen nur Brutzellen des Cophyllum, und ich bin überzeugt, dass sie sich an dem abgebildeten Stück noch mit bloßem Auge erkennen ließen.

Die Durchschnitte der Bruzellen sind leicht verständlich, sobald man sich diese Zellen auf dem Kalk herauslöst, indem man ihn in eine verdünnte Säure legt, oder auch, wenn man sie im Serpentin sucht, wo sie wie lebend gesehen werden können.

Ganze Pflanzen ziehen sich durch die Serpentinlager hindurch.

Ich habe die Basalzelle in Taf. J. s. 2. abgebildet, eine Bruzelle daselbst 4:5. zeigt eine solche im Serpentin.

Die regelmäßige Lage des Cophyllums rührt wahrscheinlich das her, dass sie sich schon bei Lebzeiten in Kalk eingebettet hat.

1.7 Die Formen

Man nehme nun Taf. IJ. zur Hilfe, um sich eine Vorstellung von dem Leben zu machen, welches sich hier entwickelt.

Alle diese Formen sind teils auf dem Kalk gelöst, teils nach den im Serpentin erhaltenen Pflanzen gezeichnet; meist bei 90-sacher Vergrößerung.

Ich wage es nicht, bei dem mir vorliegenden Material hier irgend schon Arten zu bestimmen. Dazu ist die Zeit noch nicht gekommen.

1, 2, 4, 6, 8, 17, 18, 22, 23, sind Prothallien, 3 a u. b. 10. Füllmassen (Steinkerne), 5. 23. zeigen eine Fadenzelle. — Fig. 9. ist wahrscheinlich eine Sporangie, Fig. 16. wasserhell eine Füllmasse, wahrscheinlich von einer gestreckten Zelle, wie sie bei den Algen häusig vorkommen.

1.8 Di Arten

Ich lasse nun di Arten folgen, welche durch vollskändige Exemplare festgestellt sind.

Allein auch hier kann ef sich bloß darum handeln, nach der Gesamtform Namen zu geben.

Alle folgende sind mikrostopisch im Ralk.

Ich gebe in Taf. III die 4 von mir unterschiedenen Arten von mikroskopischen Algen des Laurentian, welche als "Ranal-Systeme" bezeichnet wurden, 1. 3. 4. in 80-, 2. in 20- maliger Vergrößerung.

Sie leben in Gesellschaft. Einzelne Formen werden nach diesen aufgeführt.

Rampploflon.

Zaf. 333. 1. 1/80.

Rampyloklon: von der Biegung seines Stammes und der Zweisge. Die Basalzelle ist rund, abwärts gekehrt. An diese reiht sich eine gewundene Blatzelle, an diese eine Becherzelle an und diese treibt entweder wieder eine Blatz oder eine Becherzelle.

Wahrscheinlich dieser Art gehört an Taf. VII. 4. Leucophyllum.

Zaf. III. 2. 1/20.

Es sind dies die größten mikroskopischen Pflanzen im Kalk. Ihre Anordnung ist leicht verständlich. Im Ed des Bildes ist eine Zelle 80-mal vergrößert.

Die Blätter sind in ein mildweißes Silicat verwandelt. Pseudozoon. Zaf. 333. 3. (1/80).

Denn diese Kanäle wurden von Dr. Carpenter als die Kanalsusseteme von Nummuliten gekennzeichnet; aber freilich nicht vollskändig wurden sie gezeichnet, sondern bloß die oberen geraden (Faden») Zellen des Bildes. Wären die unteren dazu gezeichnet worden, so hätte wohl Niemand sich überreden lassen, dass es sich hier um Kanalsusteme einer Foraminisere handelte.

Kilocarpon.

Taf. III. 4. 1/80. und Taf. IX. 1/140 Taf. X. 1/750. 1/450.

Ebenfalls ein "System".

Diese Algen mussten eine Gallert um sich ansetzen, wie es die Rostocaceen tun. Nur so erklärt sich das lappenartige Aussehen bei regelmäßiger Lagerung des Ganzen.

Wahrscheinlich dieselbe Pflanze ist Tab. IX. und X.

Ich nenne sie Kilo-Karpon, denn die Zelle des deutlich sichtbaren Dogoniums (Tab. X. 2) zeigt eine sehr große Anzahl von Prothallien, welche sich sodann auch in dem Kalk und Serpentin finden.

Chairoferdos.

Der willkommene (erste) Fund einer Pflanze des Laurentians Gneises. Tafel JV. und V.

Wie in allen bisherigen Algen bildet je ein Stengel eine Pflanse.

Ein schwacher Wurzelansat in Form einer platt gewöldten oder becherförmigen Zelle, dann eine gewundene längere, weiter eine becherartige Zelle.

Nun beginnt die Teilung erst mit einer gewundenen Zelle, setzt dann fort in gestreckten, diesen folgen perlschnurartige Zellen, welche mit einer Sporenzelle endigen. Die Sporen liegen geordnet. Taf. V. Fig. 2.

Der nächste Stengel trägt eine leere Sporenzelle. (Taf. JV.)

V. 1. ist eine 300-malige Vergrößerung der dritten Pflanze von rechts, der auch die Sporenzelle angehört.

Die erste Pflanze (von rechts) hat Blätterform, gehört aber ohne Zweisel zu derselben Art.

Eine Zellmembran ist deutlich wahrzunehmen.

Tafel VJ. 4. 1/320 wahrscheinlich dieselbe Art. Voterion.

Tafel VJ. Fig. 1. Die Becheralge. Fig. 2. Basalzelle. Margarodes.

Eaf. \mathfrak{VJ} . 3. (1/650).

Perlschnuralge entwickelt sich auf einer Wurzelzelle, welche auf einem geraden Zweige (einer anderen Art) aufsitt.

Lichnon.

(Die Lampe) Taf. VII. 1. 2. (Fig. 4. die Wurzelzelle) (1/90).

Die Zelle 2. gehört derselben Art an, ist jedoch ohne Stengel im Dünnschliff. Ich habe auf dem Kalk eine Zellhaut vollkommen gleich mit Säure ausgewaschen.

Fig. 3. ist eine Becherzelle, welche nicht zu 1. gehört. Salping.

Trompeten-Alge (1/90).

Rilitodendron.

Becherbaum. Tafel BJJ. 6. (1/90).

Fig. 7. 8. Die Pflanze in ihrer ersten Entwicklung. Eine wundervolle Form bildet Pleurophyllum.

Pleurophyllum.

Ribben-Blatt. Taf. BJJ. Fig. 1. (1/750).

Die Relche sitzen unmittelbar im Ralf.

Phiala.

Die Schale. Zaf. VIII. 2. (1/90).

Schalenförmige Zellen. Die Stengel daneben zeigen Kopulastion.

Das Zierlichste aber ist Theochara.

Theodora.

Gotteslust. Saf. XJ. 1. 1/90.

in Dolomit verwandelt, glashell.

Linophyton.

Tafel XJ. 2. 3. 4.

Ich habe die Formen zusammengestellt, welche alle denselben Charafter an sich tragen.

Bei Fig. 2. ist zu beachten, dass der eine Zell-Knoten nach rechts, der andere nach links geht, was ich nur nach sorgfältiger Beobachtung zeichnen ließ.

In einem Bilde, welches leider nicht auf die Tafel kam, sitzt in dieser (wahrscheinlich Ropulations») Zelle in der Mitte ein Kelch.

Möglich also, dass an der Stelle Fig. 2. diese Kelch-Zelle abgebrochen ist.

Fig. 5. zeigt den Fadenansak einer ähnlichen Art.

1.9 Überblick

Der allgemeine Charafter dieser Pflanzenformen des Laurentians Ralks ist (ich wage den Ausdruck) ein höchst roher, einfacher, anfänglicher. Aber etwas haben sie, was sie den Pflanzen der Jekkeit mindestens gleichstellt: sie sind vermöge ihrer Anlage einer ungemessenen Vermehrung fähig.

Das Individuum selbst ist einfach, ist eine Zelle.

Eine Zelle sest sich an (nach unten), die nächste kehrt sich nach oben. Tafel VII. Fig. 7.

Ich habe Fälle beobachtet, wo mehrere Zellen nach unten sich über einander setzten.

Mir ist es wahrscheinlich, dass hier die Zelle von Kalk überlagert und so genötigt wurde, ihre Wurzelbildung forkuseken.

Eigentliche Wurzeln fand ich, jedoch nicht sicher, nur in einem Dünnschliffe.

Nun sett sich an diese Zelle, meist seitlich an ihrem Rand, oder an einem beliebigen Teile ihrer Oberfläche, eine Brut-Zelle (Knospe) in Form eines Blattes oder eines Bechers an. Es teilen sich die Zellen: so entsteht ein Stamm.

Die Vefruchtungsorgane scheinen erst nach einem größeren Wachstum sich zu bilden. Tafel V. und V.

Was die Form der Zellen betrifft, so ist dieselbe unerschöpflich verschieden.

Immer aber bewahrt sie den Charafter der Urpflanze. Merkwürdig ist die Erhaltung. Nicht bloß ganze Pflanzen, sondern Membrane sind erhalten. Sehr häufig finden sich die Modelle der Zellhöhlen. Diese sind gewöhnlich mit Dolomit ausgefüllt, wenigstens wo sie in Dolomit und Serpentin lagern.

So sind uns Modelle der Hohlräume der Pflanzen erhalten. Tafel II. Fig. 10.

Diese Form sindet sich tausendmal im Serpentin wie im Gneis, auch im Dolomit selbst. Der offene Zwischenraum zeigt überall die Linie der Zellscheidewände.

Ebenso häufig finden sich ganze Brukellen in Serpentin verswandelt.

Die einfache Behandlung mit Salzsäure liefert diese Zelle in großer Menge. Ja ich habe sogar Rieselskelette erhalten, wo der übrige Teil der Pflanze wahrscheinlich in Kalk verwandelt war.

Wenn man so die Form der Urpflanze gewonnen hat, so nehme man einen beliebigen Dünnschliss des "Eozoon" und man wird die Linien derselben in jedem Teile finden. Die einen Exemplare freilich sind bloß Abschnitte, andere Halbschnitte; am besten erkennt man deshalb die Pflanze an den seitlichen Einschlüssen.

Überall zeigt die in Kiesel (wahrscheinlich Glimmer) erhaltene Zellmembrane die Form der Pflanze.

Jett erst ist mir auch klar, warum die Chrysotilfasern überall parallel sich lagern (dieselben, die Dr. Carpenter für eine Haut mit Zubuli eines Nummuliten ansah).

Diese Chrysotilfasern haben sich um die Pflanze (den Serpentin) in der Art gelagert, dass sie Oberfläche der Zelle in

Parallel-Areisen umgeben: (in einer Foraminisereschale stünden sie senkrecht auf der Rammer!)

Wenn ich jest meine Dünnschliffe durchsehe und finde darin die deutlichsten Brusellen an der Pflanze, in der Tiefe des Kelches die runde Öffnung, welche ganz konstant (also hundertfältig) sich sindet, ferner ganz junge Zellen noch in den alten, endlich im Kalk daneben diese Zellen: so muss ich glauben, dass alle, welche am Eozoon arbeiteten (ich eingeschlossen), mit Blindheit geschlagen waren.

Vollends unbegreislich ist dies hinsichtlich der Pflanzen im Serpentin des Cophyllumkalks. Hier liegen sie sogar für das bloße Auge. Aber weil dieser Serpentin nicht Cozoon war, deshalb untersuchte ihn auch Niemand mehr. Jeder, der die Sache jetzt untersucht, wird sich an die Stirne schlagen und ausrusen: wie war das zu übersehen möglich!

Und vollends ist es unbegreislich bei Gelehrten, welche über jede Menge von Gesteinen verfügten, um es ohne Rücksicht auch vernichten zu können.

Insofern ist die Erfahrung mit dem Eozoon ein bedeutender Präzedenzfall.

Nur in Einem Punkt muss ich meine frühere Beweissührung berichtigen, indem ich sie erkläre.

Ich habe sehr großes Gewicht auf das ursprüngliche, unzersetzte Gestein in den Serpentin-Körnern gelegt und damit gegen die "Rammer" bewiesen.

Richtia ist, dass dies vorkommt.

Allein hier war die erste Frage: was ist Eozoon?

Dies war von Ansang an nicht so festgestellt.

Wenige konnten sich nur darüber vergewissern, was die Entdecker als "Eozoongestein" anerkennen. Ich gebe zu, dass in dem, was mir nachher Dr. Dawson als "Eozoon" vorlegte, wenig unzersetzte Gestein in den "Rammern" gefunden werden wird.

Der Serpentin ist allerdings in einem flüssigen Zustand gewesen, hat sogar ganze Lager gebildet: ein solches ist die Unterlage des ganzen Cophyllumgesteins, wie insbesondere das breite Serpenstinband, unter dem ersten breiteren Kalkband.

Da sind, allerdings selten, Mineralteile, welche polarisieren und daher in der Regel auf das erhaltene ursprüngliche Gestein zu deuten waren.

Dass ich den Serpentin erst im zweiten Stadium der Verwitterung begriffen ansah, der Irrtum rührt daher, dass ich die Zellwände als Gesteinsteile ansah und dass ich zuviel Werth auf die Teile des Gesteinst legte, wo diese noch wirkliche polarisierende Mineraleinschlüsse enthalten.

Diese Einschlüsse könnten allerdings auch Dolomit sein, welcher sich im Serpentin ausschied und so die Polarisationserscheinung beswirkte.

1.10 Ergebnisse

Die wichtigen Ergebnisse meiner Entdeckung sind:

- 1. die ersten organischen Formen sind die niedersten Pflanzen, woraus höchst wahrscheinlich
- 2. folgt, dass wirklich die Bildungen der Gegenwart die Erzeugsnisse der Fortentwicklung sind; es ist also eine bloß einmalige gleichzeitige "Schöpfung" nicht dagegen
- 3. ist eben vermöge des Gesetzes der Entwicklung anzunehmen, dass die niedersten Formen der Laurentianzeit heute längst in höhere sich verwandelt haben: die niedersten von heute also können nicht die Nachkommen von damals sein und hieraus schließe ich, dass heute noch derselbe Übergang von Unorganischem zum Organischen (Schöpfung) stattsindet.

Möge nun die Frucht langjähriger Arbeit zu neuen Forschungen anregen.

Ein Grund ist gelegt. Die Cophyllumkalke von Canada bieten dem Forscher eine unermessliche Fundgrube der Erkenntnis, denn keine Schichte der Erde hat wie diese erste ihre Toten so wunderbar schön erhalten.

Der flarste Kalksteinniederschlag, noch mehr aber die Serpentinsschichten, haben Häute von kaum messbarer Dicke uns aufbewahrt.

Das Bild der Urzelle, welches nun naturgeschichtlich sestigestellt ist, ist fast durch ein Wunder erhalten.

Freilich das Werden selbst sieht man doch nicht. Zum Werden kommt der Mensch immer zu spät: wenn er es sieht, ist schon ein Gewordenes da.

Was führt die einfachsten Stoffe der Erde in diese einfachsten Formen? Dieses Rätsel der Entwicklungslehre wird nie gelöst wers den. Auf den wissenschaftlich registrierten Stoffen allein lässt es sich nicht erklären. Diese Tatsache wird auch den Natursorscher und gerade den Natursorscher, als den Mann der Erfahrung, zuerst zur Erkenntnis eines Stoffes treiben, welcher selbst zwar mit den Sinnen nicht mehr wahrgenommen werden kann, dessen Wirkungen aber in die Sinne fallen und damit dem Verstande den Veweisseines Daseins aufnötigt. Nenne man diesen Stoff, wie man will, er ist da. Das ist zunächst die Hauptsache. Unsere Zeit streitet über die Frage, ob es denn außer der Materie auch einen Geist gebe? Die Zeit wird freilich auch noch kommen, wo man einsieht, dass es ebensowenig einen Geist, (Leben) ohne die Materie gäbe.

Das Entwicklungsgesets aber ist es gerade, welches den Menschen zu der Überzeugung leitet, dass die Schöpfung auch mit seinem Dasein, wie es jetzt ist, noch nicht abgeschlossen sein kann, dass es vielmehr noch höhere Daseinssormen für ihn geben muss, welche zu erreichen, Naturgeset für ihn ist.

So allein erklären sich hundert Tatsachen des geistigen und Seelenlebens, welche ohne dieses Gesetz unverständlich wären, kurz, so allein erklärt sich der Mensch selbst.

Es ist daher die Entwicklungslehre, auf den Menschen übertragen, das Gesetz des Fortschritts ja der Unsterblichkeit. Nicht im Kampf um das niedere Dasein, sondern im Kampf um das höchste Dasein

geht der Mensch seinen Lauf nach dem Gesetz der Linie, die sich nur im Unendlichen mit einer andern schneidet.

Ich konnte mir nicht versagen, diese Schlussbemerkungen zu machen. Ich glaube in meiner Arbeit gezeigt zu haben, dass ich die erakte Wissenschaft liebe. Aber es gibt eine erakte Wissenschaft auch des Geistigen und nicht bloß des Körperlichen. Zu einer wie der andern gehört, dass man sehen will. Will man sehen, die Tatsachen sind da.

Auf diesem Wege möchte ich nicht bloß die Naturwissenschaft, sondern auch die Wissenschaft des Menschen, die höchste welche es geben kann, durch meine Arbeit um einen Schritt weiter geführt sehen.

2 Das erste Tier

Ich hatte meine Arbeit schon geschlossen, als ich in dem (mit Salzsäure aufgelöstem) Cophyllumkalk noch das erste Tier finden sollte, welches wir kennen.

Ich besitze es in 1 vollskändigen Exemplar (in Kanadabalsam) und in Bruchstücken, wovon einige nahezu vollskändig.

Vergebens sah ich mich nach einem Nachbild unter den lebenden, wie unter den ausgestorbenen um. Es gleicht einigermaßen Serpula oder Vermetus.

Ich nenne es Titanus Vismarki Taf. XII. unserm Neichskanzler zu Ehren.

Ein Wurm mit einem Rieselpanzer: denn derselbe hat der Salzsäure widerstanden.

Der Panzer muss durch Häute verbunden gewesen sein. Dafür spricht Taf. XIII. Kiq. 1.

Ein Exemplar ist 0,59 mm. lang, 0,06 mm. durchschnittlich breit.

Der Panzer besteht auf zahllosen kontraktilen Ringen; der Tistanus vermag jede Stellung anzunehmen.

Ein Stück (vorausgesetzt, dass es derselben Art angehört) zeigt, dass eine partienweise Zusammenziehung der Glieder stattfand, denn der Leib innerhalb des Rieselpanzers ist in gleichmäßig von einander abstehenden Segmenten zusammengezogen, und daher bildet der Panzer scharfe Kanten.

In dem Panzer stedt ein Leib, welcher ebenfalls der Säure widerstanden hat.

Der Panzer ist egelartig geformt, nicht rund, sondern im Durchschnitt flachelinsenförmig, wie der Durchschnitt eines Blutegels. Er nimmt von oben nach unten an Dicke ab. Das dickere Ende ist herzförmig, die scharfe Spike nach oben gekehrt.

Es bildet eine Art Wohnkammer: der betreffende Teil des Pansers ist deutlich glasig.

Mundöffnung 0,12 mm. breit,

Schwanz 0,05 mm. breit.

Durch den Panzer hindurch sieht man einen Körper mit einer Höhlung in der Mitte.

Durchmesser desselben 0,03 mm.

Auf der Mundöffnung ragt eine Wulft hervor, der eigentliche Mund.

Wenn man bei Taf. XI. Fig. 3. das Mikroskop hoch einsstellt, so sieht man nur die herzförmige Öffnung: wird der Tubusgesenkt, so erblickt man durch die Schale und hinter derselben die Mundöffnung. Leider lassen sich solche zarte Dinge in der Zeichnung nicht vollskändig wiedergeben.

Figur 3 hat einen übrigens undeutlichen Lappen, der über die Mundöffnung hervorragt.

Ein gebrochenes Stück Taf. XIII. 2 zeigt eine deutliche Nöhre.

Das andere Ende des Körpers (der Schwanz) ist zweilappig, wie eine Klappe. Tas. XII. Fig. 1. Tas. XII. Fig. 5. ist ein abgebrochenes Stück, welches vollskändig mit Tas. XII. Fig. 1. skimmt.

Dass die Form eine organische ist, lässt sich wohl in keiner Weise bezweiseln. Dass es ein Tier und keine Pflanze ist, dafür spricht die Bewegung, welche auf den verschiedenen Stellungen des Geschöpfs geschlossen werden kann.

Die Form ist Serpula ähnlich.

Freilich suchte man bis jetzt wohl schwerlich ein Tier, das den Anneliden gleicht, in der untersten Schichte, Tieren, welche ihre Stellung im Tierreich fast schon über dem ersten Vierteil desselben einnehmen.

Es wäre aber auch möglich, dass wir hier nur die äußere Gestalt eines höheren Tieres vor uns haben, denn die innere Organisation lässt sich nicht mehr feststellen.

Titanus unterscheidet sich von allem, was im Cophyllumkalk vorkommt, sofort durch die Textur.

Die Streifen (Glieder) des Panzers sind wie mit dem Grabstischel gezeichnet, die Beweglichkeit muß deshalb auch eine vollkommene gewesen sein.

Man könnte im Titanus hienach den Vorgänger der Trilobiten sehen.

Die Bruchstücke Taf. XIII. zeigen alle gleiche Textur.

Gewisse hyaline Ansätze auf Pflanzen von derselben Art, wie die Mundössnungen, könnten vermuten lassen, dass man es hier mit jungen Tieren zu tun hat, die sich auf anderen Gegenständen ansaugen.

Doch die Sache muss erst in weiteren Exemplaren untersucht werden, wie denn dies Alles mehr eine Ankündigung und Auf-

forderung zu weiterer Forschung sein soll, als ein wissenschaftlicher Abschluss.

Es sind nur einmal neue organische Formen und damit ist eine neue Schöpfungsperiode festgestellt.

3 Serpentin

Als ich die Arbeit bis hierher vollendet hatte, siel mein Blick auf einen Briefbeschwerer von Serpentin, der auf meinem Arbeitstisch lag. Ich sah hier bläuliche Flecken und sofort erkannte ich die vom Laurentian-Serpentin beschriebenen Formen in dem Serpentin von Sachsen wieder.

Bei genauer Untersuchung fand ich die schönsten Linien und Forsmen von solcher Reinheit und Vollendung, als sie der Paläontologe nur wünschen kann.

Sofort nahm ich alle meine Serpentine, sowohl Dünnschliffe als Handstücke vor. Wie erstaunte ich aber, als ich in dem größten Teil derselben Pflanzen-Formen von 1-2 cm. fand!

Ich fand daneben eine solche Masse kleinerer Formen, dass ich die Ansicht ausspreche:

ein großer Teil der Serpentine, insbesondere der böhmischen und sächsischen, ist nichts als ein großes Algen-Lager, ähnlich den fossilen Diatomeen-Lagern.

Es lagert die verkieselte Pflanze in der ursprünglich flüssigen Serventinmasse.

Ich zeichne nun sofort die Form auf 3 Briefbeschwerern cf. Tafel XIV. und begnüge mich vorerst damit, die Wissenschaft auf die Tatsache aufmerksam gemacht zu haben.

Tafel XIV. 4. ist eine Form von 1.1/2 cm., welche ich so bestimmt gesehen, als es nur sein kann.

Ich nenne sie meinem verehrten Freunde R. Hofrath Dr. F.

v. Hochstetter in Wien zu Ehren und wegen ihrer knospenartigen Form

Opthalmia Hochstetteri.

Wir haben also ungeheure Schichten eines bis dahin für azoisch gehaltenen Gesteins als reines organisches Lager.

Die Relche sind mit Granat gefüllt. Offenbar steht diese Vildung in Verbindung mit der Tätigkeit der Pflanze.

Wie war es möglich, diese Formen zu übersehen?

Aber freilich, ehe man den Schlüssel zur Form auf dem kanadischen Laurentian-Gestein hatte, war ef nicht so leicht, nur daran zu denken und deshalb sah man ef auch nicht.

Tede Apotheker-Reibschale, seder Briefbeschwerer zeigt uns in einem Rubikzentimeter eine größere und vielleicht 1000 kleinere Pflanzen-Zellen.

Ich zeichne auf dem Cophyllum-Ralk noch 2 Tafeln Zellenformen, um die Grundform derselben zur Anschauung zu bringen.

Der Gedanke an das Erlebte beschäftigte mich den ganzen Tag.

Wie ganz anders erschien mir mit Einem Male das bisher so rätselhafte Gestein!

Ich war schon im Begriff, mich zur Ruhe zu begeben, als mir einfiel, dass ich noch eine Kiste Gesteine von Canada verpackt im Hausgang stehen habe.

Ich wollte insbesondere noch ein Stück wasserhellen Kalkspats wegen der kupfergefärbten Pflanze darin suchen und damit meine ganze Arbeit schließen.

Ich ließ die Kiste öffnen.

Da fielen mir die Laurentian-Gneis in die Hand.

4 Was ist der Laurentian-Gneis?

Diese Frage stellte ich an mich.

Ich besah das Gestein, während ich es ins Zimmer trug, und erkannte sofort,

dass auch der Laurentian-Gneif nur ein großes Pflanzen-Lager sei.

Sofort wurden noch Dünnschliffe gefertigt und durch das Mistrossop vollkommen bestätigt, was das bloke Auge gesehen hatte.

Ich untersuchte in der Folge alle meine Handstücke, etwa 30 Stücke und fand eines wie das andere größtenteils aus Pflanzen (Algen) bestehend.

Die meisten sind schon mit bloßem Auge zu erkennen.

Mit schwacher Vergrößerung löst sich die ganze Masse des Gneises in Pflanzen auf.

Also eine Formation, welche in ihrer Mächtigkeit auf 30,000 Fuß geschätzt ist, ein Pflanzenlager!

Meine Laurentiangneif-Handstücke sind auf der Gegend von Ottawa und vom Lake Simcoe bis zum Nipissing-See gesammelt, lettere also von einer Fläche von 130 engl. Meilen und alle sind Eine große Pflanze!

Ich fertige nun Tafeln, um eine Vorstellung zu geben.

Das Handstück J. ist von Templeton bei Ottawa (der Hauptstadt Canadas). Glimmerschiefer.

Es ist auf einer Apatitgrube. Es hat fleischroten Kalkspat, graus grüne Apatitkristalle mit 6 seitigen Tafeln von schwarzem Glimmer.

Seine Textur ist fein-blättrig. Auf der Bruchfläche erkennt man deutlich strahlenförmige Parthien. Sofort fallen auch weiße rundliche Stellen in die Augen. Es sind die Relch-Zellen, welche gegen den Beschauer gekehrt sind.

Bei genauer Besichtigung findet man die Zellkelche in den größeren Glimmer-Partien, sodann die Zellen, welche den Stamm bilden.

Schwarze Glimmer-Tafeln umhüllen die schönsten Kelche. Die feinste Textur ist noch sichtbar.

Eine Pflanze kann schon mit bloßem Auge auf 1 cm. Raum verfolgt werden.

Schon mit bloßem Auge sieht man ferner die Verwandlung der Pflanze in Apatit und Glimmer.

Die Pflanzen nehmen etwa 2/3 der Gesteinsmasse ein.²

Die Apatit-Rristalle sind wahrscheinlich das Produkt des kleinen organischen Lebens.

Eine Mischung von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk wird von der Pflanze zersett.

Es trennen sich phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk und so lagern die Apatit-Kristalle im kohlensauren Kalke.

Die Pflanze dieses Gesteins habe ich auf Tafel XVII. 10. abgebildet.

Ich nenne sie Dufferinia zu Ehren des Lords Dufferin, des Generalgouverneurs von Canada, als ich dort war.

Einzelzeichnungen Fig. 11. 12. 13.

²Vergleiche unten.

Um einen Dünnschliff darauf zu fertigen, war das Gestein J. zu weich und zu wenig homogen. Der Glimmer blätterte ab, wie die Pflanzen darin lagen.

Fig. 14. eine Pflanze auf einem Apatit-Rristall.

Handstück 2. vom Mustoka-See. Sehr feldspatreich.

Taf. XVII. 4. Auf demselben Stücke Fig. 5. 6. 7. 8. 9.

Ich konnte nur eine Pflanzen-Art feststellen.

Taf. XVII. Figur 10-13 sind schwache Vergrößerungen 1/5.

Ich nenne die Pflanze Fig. 4.

Victoria

zu Ehren der Königin Victoria.

Diese Pflanze scheint eine der ältesten und ursprünglichsten zu sein.

Das zweite Handstück zeigt ferner die Form

Tafel XIX. Figur 3.

Ich nenne sie zu Ehren des Vorstandes des Geological Surveys of Canada Mr. Selvyn

Selvynia.

5 Glimmer

In einem kanadischen Glimmer auf dem Laurentian bilde ich Taf. XVII. Fig. 1. 2. 3. ab.

Die Zelle Fig. 3. ist in Hämatit verwandelt, ist durchsichtig und zeigt so den Kanal, der durch die Zelle bis zur Wurzel hinabgeht, aufs deutlichste. Fig. 2. ist wahrscheinlich ein Durchschnitt des Kelchrandes.

6 Das "Urgebirge"

Wieder war die Arbeit geschlossen.

War der Laurentian-Gneis von einer Masse Zellen-Pflanzen durchzogen, warum sollte ef unser Gneis nicht auch sein?

Und wenn der Gneis es ist, wie verhält sich Granit und Porphyr?

Es ist oft unbegreislich, wie nahe die Tatsache liegt, ohne dass man im Stand ist, sie zu sehen. Trot des Mikroskops — man sieht eben nichts.

Ich muff die Form meiner Abhandlung hier entschuldigen.

Meine Arbeit galt dem Eozoon. Darauf wurde das Cophyllum. Sie galt dem Cophyllum. Daran schloss sich die Entdeckung der Pflanzenwelt des Serpentins. Sie sollte mit dem Serpentin geschlossen werden. Da fand ich, dass der Laurentian-Gneis ein Pflanzenlager enthält, nichts als Pflanze ist.

Auff äußerste ermüdet, war ich froh, endlich Feder und Zeischenstift niederlegen zu können; da drängt es mich wieder in die Forschung hinein: ich kann noch nicht ruhen.

Ich bemerke hier, dass die Entdeckung des Serpentins— da ich dieset schreibe — erst 2 Tage alt, und das was ich heute schreibe, die Arbeit von 12 Stunden ist. Gestern hatte ich das Manuskript für den Druck schon geschlossen, als der Gedanke sich aufs Neue meldete und mich festhielt. Der Gedanke war es, welchen ich oben ausgesprochen.

Es war die Arbeit einer Nacht, die Dünnschliffe des Urgebirges zu durchgeben und nun steht es mir fest: Der Granit ist nichts als Pflanzen, keine Gesteinsmasse daneben, alles Pflanze!

Glimmer und Hornblende sind die Relchzellen. Der Feldspat ist Füllmasse der Pflanze, Baustosf der Pflanzenzellenhäute. Der Duarz bildet meist Bruzellen.

Der Gneis enthält schon die vorgeschrittenen Formen der Pflansen.

Insbesondere beim Knotengneis sind die Knoten nichts als größere Relchzellen.

Auch der Porphyr enthält lebende Pflanzen. Derfelbe ist der Schlamm def ersten Urgebirgef. (Felsit ebenso.)

Erst nach dem Suchen durch das Mikrostop sehe ich die Form mit bloßem Auge — Pflanzen von der vollen Länge der Handstücke.

Ich gebe diese Arbeiten, wie sie entstanden sind. Es sind Entdeschungen von solcher Bedeutung, dass es wohl nicht als Anmaßung erscheinen kann, wenn ich zugleich einen Blick in meine Werkstätte tun lasse, nebenbei ist es der individuelle Grund, dass ich zu ermüdet bin, um Alles umzuarbeiten.

Bei der nunmehrigen Beweissührung muss ich die Form der Urpflanze als bekannt annehmen.

Die Formen sind in Laurentian-Ralf unumstößlich festgestellt, und zwar schon in verhältnismäßig großer Verschiedenheit. Dort bestehen, wie ich vermute, hunderte von Arten.

Im Ralk sind schon die mikroskopischen Arten enthalten, vielleicht sind sie dort erst entskanden. Im Gneif sind es Pflanzen, welche mit bloßem Auge zu erkennen, dabei schon sehr entwickelt in der Form sind.

Das Prototyp all dieser Pflanzen ist zumeist ein einfacher Tricheter.

Die untere Spite verzweigt sich zur Wurzelzelle.

Der Trichterhalf teilt sich und streckt sich, Zelle reiht sich an Zelle durch Teilung.

Dadurch entsteht der Stamm.

Run setzen sich sowohl am Rande des Trichters, als auch an der Zellkante neue Trichter an.

Aber auch in Form von Mycelium-Fäden strecken sich Zellen aus, welche wieder Trichter treiben. Diese Fadenzellen suchen Verseinigung und verzweigen sich.

Ich bemerke aber hier, dass auch in den Trichtern wirkliche Mineral» (Kristall»?) Einlagerungen vorkommen. Diese erscheinen mir als Produkte des organischen Vorgangs.

Ich bilde die Entwicklung der Urzelle ab Taf. XVII. 1-7. jedoch nur, soweit ich das Bild im Serpentin gewann. Im Granit herrschen die Stammzellen vor, jedoch in der uranfänglichen Form, welche sich denken lässt — der Kristallform.

Mit diesen Vorbegriffen und Vorstellungen, welche ich durch meine Beobachtungen als festgestellt annehmen darf, wollen wir an die Arbeit gehen.

Um die Kontrolle wenigstens zu erleichtern, nehme ich die "Sammlung typischer Gesteine" von N. Fuess in Berlin, Serie II., und beginne mit

Nr. 1. dem Granit von Brigen.

Ich werde, was ich im Schlisse finde, beschreiben und das Wesentliche abbilden, damit der Leser sich selbst orientieren kann. Zum Verskändnis dieses Schlisses muss man schon das Vild aus dem Laurentian-Gneis Tas. XVII. 4. XIX. 3 zu Hilse nehmen.

Auf den ersten Blick erscheint Alles als ein Gemisch von Feldspat und Quarz-Rörner mit Glimmer und etwas Hornblende. Sind es Sprünge, welche den Schliss durchziehen? Sind es Kristallslächen? Es sind keine Sprünge da, keine Kristalle.

Die Linien zeigen beim ersten Anblick eine gewisse Regel, aber sie ist unverständlich.

Plöblich springt das Gesets in die Augen!

Das ganze Gestein löst sich in Pflanzenzellen auf und diese selbst stehen in organischem Zusammenhang.

Taf. XVII. Fig. 8. folg. mag als Anhaltspunkt für die Auflösung eines Granits dienen.

Merkwürdigeres noch bietet

Nr. 2. Granit von Altendamm.

Brukellen siehe XVII. Fig. 16. 17. 18.

Eine Hornblende-Pflanze Taf. XVII. 15.

Richt minder löst sich

3. Gneisgranit vom St. Gotthardt.

Ein Pflanzenbild darauf XX. Fig. 1.

4. Cordieritaneis von Mittweida

zeigt Taf. 20. Fig. 2. und 3.

5. Granulit von Hardtmannsdorf.

Eaf. XIX. Fig. 14. 15. 16.

Granulit (und Granat).

Ich habe schon die Vermutung ausgesprochen, dass auch der Granulit Pflanzen enthalte.

Das bestätigt sich nun vollständig.

Allerdings sind die größeren mit bloßem Auge nicht sofort erstennbar.

Allein wie oft, so muss auch hier die kleinere Form den Schlüssel zur Erkenntnis der großen liefern.

Die kleinen mit bloßem Auge kaum unterscheidbaren rötlichen Punkte im Granulit werden allgemein für "eingesprengte" Granaten angesehen.

Sie sind die Ausfüllung der mikroskopischen das Gestein horisontal durchwuchernden Pflanze, bezw. ihrer Relche.

Taf. XIX. Fig. 14. 15. 16.

Ich zeichne einige solcher Pflanzen und bemerke nur, dass diesels ben nach allen Seiten fortsetzen, Relche haben, vorzugsweise aber in horizontaler Richtung liegen.

Die großen Kristalle sind Ausfüllmassen der größeren Pflanzensart. Ich nenne die kleinere Art zu Ehren des Herrn Prof. Oswald Heer

Granatina Heeri.

Auch hier muff man sich freilich durch das Prototyp der Urpflanze leiten lassen, dann bleibt kein Zweifel.

Dasselbe Verhältnis findet hinsichtlich des Granats im böhmischen und sächsischen Serpentin statt.

Auch hier sind die Granaten Füllmassen der größten Pflanzenkelche.

Die weißen Granaten von Auerbach sind nichts anders.

Sie tragen noch deutlich den Steinkern ihrer Kelchvertiefungen an sich.

Im umgebenden Gestein ist eine Menge mitrostopischer Pflanzen.

Ich habe vor mir einen Kalkgranat.

Granatoeder von 2 cm., voll von deutlich sichtbaren Pflanzen-Formen. Der Kern rundlich, leicht als Stein-Kern eines Pflanzen-Kelchs zu erkennen. Die Schichten in demselben tragen einzelne Pflanzen (in der hexagonalen Stellung des Dodekaeders).

Als ob die Algen Arnstalle zu Früchten gehabt hätten. —

6. Quarzporphyr von Schwärz bei Halle.

Eine schlammige Grundmasse mit unzähligen Zellmembranen aber auch lebenden Pflanzen.

Taf. XX. Fig. 4. folg.

Run füge ich noch bei

Darstellungen

eines Laurentian-Gneises von Canada

Taf. XIX. Fig. 1-8.,

eines Hornblendegesteins von Montreal

Taf. XIX. Fig. 9.,

eines Protogyns vom Montblanc

Taf. XIX. Fig. 17. 18. 19. 20.,

eines Gneises vom Montblanc

Taf. XX. Fig. 1.

7. Protogyn.

Es war seiner Zeit ein großer Lärm, als man das älteste Gestein der Erde gefunden zu haben glaubte. Man nannte es deshalb Protogyn.

Ich habe eine Zeichnung vom Protogyn des Montblanc gegeben.

Er ist wie der Granit eine Pflanze.

Da sind langgestreckte Pflanzen, ich nenne sie Protogynia.

Zelle an Zelle. Bruzellen nach oben und unten.

Die gelbe Färbung ist von Eisen. Daneben sind wasserhelle Zellen, Hornblende. Es sind die seinen Nadeln des Chlorits und Talks, wahrscheinlich auch zersetzte Hornblende.

Die wasserhellen Zellen bestehen aus Quarz: sie nehmen den größten Teil des Gesteins ein. Sie lassen sich aber leicht in die Form der Urpflanze auflösen.

Ich bilde eine Pflanze, mehrere Endzellen und Brukellen ab. Sbenfo die Burzel-Zelle. Taf. XIX. Fig. 17-20.

7 Eine Gesteinslehre

Ich versuche es nach diesen Ergebnissen, eine Gesteinslehre aufs
zustellen.

Die Gesteinsarten sind

entweder ursprüngliche oder abgeleitete Zersetzungs-Produkte, Schlamm und Laven.

Ursprünglich sind bloß 1. die Pflanzenlager, 2. das Gestein auf der Masse des Erdinnern; welches dies ist, ist zweiselhaft.

Die meisten unserer "Urgesteine" sind Pflanzenlager und dars aus abgeleitete Gesteine. Ich habe aber gar keine Gesteine ohne tote Pflanzen wenigstens gefunden, letztere in den Laven und Schlammsgesteinen.

Die Gesteinsart ist also bedingt durch die Pflanzen, auf welchen das Gestein besteht:

- A Die Urgesteine sind die Pflanzen-Lager: sie lassen sich auf die Pflanzen-Formen zurückführen, welche darin leben und sich so zusammensetzen.
- B Es gibt Mittelstusen: Detritus von Pflanzen-Lagern mit einsgelagerten lebenden Pflanzen.
- Ef gibt Gesteinsschlamm bloß mit eingelagerten toten Pflanzen.
- D Laven.

Das ursprüngliche Mineral, auf welchem die Ur-Gesteine zussammengesetzt sind, ist ein Gemisch von Quarz, Feldspat und Hornsblende (Glimmer).

Diese scheidet die Pflanze.

Die gebildete Pflanze scheidet die übrigen Minerale auf, insbesondere Granat, Leuzit u. s. w.

Die ersten Pflanzenzellen sind Kristall-Formen.

Feldspat zweis und eingliederig, Quarz sechsgliedrig bildet die Hauptform. Die Hornblende bildet die Kelchzellen.

Doch ist das Verhältnis der Zellen zu ihrem Inhalt noch näher festzustellen.

Man sehe durch den Polarisations-Apparat und man wird jede Pflanzenzelle im Granit leicht unterscheiden und jedes Individuum leicht heraussinden. Die Streisen für Oligoklas angesehen, sind horizontale Anwachsungsstreisen der Zelle.

Schriftgranit ist Feldspatmasse mit wundervoll schönen Quarzpflanzen.

Der Granit ist das erste Gestein. Von Anfang an ist Hornblende in ihm, welcher sich in Glimmer verwandelt. Später übernimmt Hornblende die Vauarbeit.

Der Basalt enthält ganze (ich nenne sie lebende) Pflanzen. Was Zirkel Rephelinbasalt nennt, sind Stammzellen einer Pflanze, welche ich Mycelium Zirkeli nenne. Die "Fluidalstruktur" also Algenzellen.

Die Olivine im Basalt sind Pflanzen-Zellen (sei ef ursprünglische, sei es, dass der Olivin-Arnstall nachher die Pflanze umschreibt.

Die meisten Basalte sind daher Wasser-Produkte.

Ebenso enthält Gabbro, Talk-Pflanzen.

Man betrachte die Gestalt der Ur-Pflanze und man wird sie überall wieder finden.

Man präge sich die Form derselben Tafel XVII. ein, nehme ein Stück grobkörnigen Granit und man wird die Form so scharf gezeichnet sehen, als die eines Ammoniten im Jura.

Im Hypersthen ist die ursprünglichste Form der Pflanzenzelle (nach einer rein geometrischen Linie) und so findet man auch die Zelle teilweise im Granit.

Naher Zusammenhang der Kristallform mit der Form der Pflanzenzelle! Ursprünglich dasselbe.

Leucit bildet Relchzell-Auffüllungen mit Anwachsungs-Streifen. Die Punkte in den kleinen Kristallen sind wohl Sporen. Hieraus erklären sich die Polarisations-Erscheinungen.

Die Schiefersteine sind teils ursprüngliche, teils abgeleitete. Im ersteren Falle bilden sie sich auf einer Masse von Zellpflanzen, im letzteren Fall sind sie ein Magma mit einer Unzahl toter und weniger lebender Zellen.

Der Pechstein ist ein Pflanzengestein und nicht vulkanisch.

In den meisten Gesteinen lassen sich die Pflanzen mit bloßem Auge leicht erkennen, wenn man die Grundform weiß.

Ich habe 2 Basalte von Biberich mit 21/2 cm. langer Pflanze, das Gesteinstück ist 3 cm. lang.

Unbegreiflich, dass man dies Alles bis jett übersah.

Man hatte eben den Schlüssel, das Bild der Urpflanze, nicht.

Ich machte den zweiten Dünnschliff auf dem Laurentian-Gneis und sah erst beim Bedecken mit dem Glas die Pflanze mit bloßem Auge.

Die künftige Gesteinslehre ist Pflanzen-Versteinerungslehre.

Sismondi fand ein Equisetum (wie ich erst heute aus Mohr sehe), im Gneis eingelagert.

Daff der ganze Gneif Pflanze sei, sah er nicht.

Die nähere Darstellung auf Grund genauer Untersuchung der einzelnen Gesteine wird folgen.

Die vorstehenden Thesen sollten nur die ersten Beobachtungen geben. In der Hauptsache wird die Sache aber so bleiben.

Insbesondere mögen die Mineralogen auf die Pflanze zurücksgehen. Es ist wunderbar, in welch engem Zusammenhang Pflanze und Kristall stehen.

Es gibt sehr viele Pseudo-Arnstalle durch bloßen Druck, Guss-Formen auf Relchzellen, welche mathematische Form haben.

Man hätte schon stutig darüber werden sollen, dass der Granit keine Kristalle enthält. Die Linien im Dünnschliss des Granits sind Pflanzen-Zell-Membranen.

Man nehme den Polarisationsapparat. Auch der Blätterbruch wird oft nur die Anwachstelle in der Zelle sein.

Die Tschermat'sche Theorie mag chemisch richtig sein. Wichtiger aber ist die mechanische Erklärungsweise.

Der Orthoflas ist in Anwachsungsschichten abgesetzt, daher die verschiedenen Polarisationsstreisen. Die Zellwände spielen mit. Dies ist im Labrador leicht erkennbar, welcher Pflanzenstämme von Zollburchmesser enthält. Feinste Zelllagerung, daher die Lichtbrechung. Sehe es eben an einer Pflanze von 1 cm. Durchmesser.

Nun haben wir für die Zukunft eine einfache Gesteinslehre. Alles ist Sedimentgesteinslehre. Im Urgebirge ist die Pflanze, vom Übergangesgebirge mag das Tier Leitfossil sein.

Ich habe den Vorteil sofort genossen.

Es ist zu untersuchen, inwiesern manche Gesteine nicht Umwandlungssprodukte des Stosses (nicht der Granitpflanzen) enthalten. Diese bleiben.

In jedem Gestein finden sich Zellen und Steinkerne von Pflanzen.

Man sett allen Pechstein zu den Vulkan-Gesteinen: der eine ist ein Lager von lebenden, der andere von toten Pflanzen.

Der erste Kalk stellt sich wirklich als Ausscheidungsmasse dar, so der Kalk des Laurentian-Gneises.

Nachher wird er erst Baustosf für Pflanzen-Arten. Vor mir liegt ein Serpentin von Zodtmoof mit einem Pflanzen-Relch von Ltm. Länge im Durchschnitt, so sein gezeichnet, als irgend ein Beichner es vermag. Wundervoll wie im Basalt der Olivin-Rristall Pflanze, die Pflanze Kristall ist.

Der Olivin ist Pflanzenzelle, die Feldspate, der Nephelin ebenso.

Die großen Kristall-Kelche stechen in die Augen. Die Wurzelselle, welche dazu gehört, ist ein kleiner Kristall, häufig ist auch die Bruzelle auf dem Kelche ein Kristall. Zuweilen ist die ganze Zelle von dem Kristalle umschrieben. Wie eine mathematische Aufgabe.

Trachyt ist ein Gemisch von lebenden und toten Zellen, ebenso Klingstein.

Ich wäre heute schon im Stande gewesen, die Leitpflanzen für etwa 30 Gesteine zu zeichnen. Wollte es aber lieber Anderen überlassen, welche mehr Zeit haben.

Die beliebten Metamorphosen müssen nach meiner Ansicht stark zusammenschrumpfen.

Mechanische Zerreibung, Lösung, Ablagerung — dies sind aber nicht die eigentlichen Metamorphosen.

Die Träume von Verwandlung eines Gesteins ins andere lösen sich auf.

Denn wenn des Gesteins-Art und Struktur von der Pflanze abhängt, auf deren Körper das Gestein wurde, so kann ein ursprüngliches Gestein nicht — ein anderes werden. Ist so wenig möglich als eine Eiche in eine Palme, und eine Palme in eine Eiche sich verwandelt.

8 Carrararischer Marmor

Ich bezog eine weiße Platte mit grauen Flecken zu einem Buffet welches mir als Kasten für meine Steinschliffe dient.

Ich verschüttete etwas Fuchsin und musste die Platte reinigen.

Ich rieb sie.

— Plöslich was sah ich!

Kelche von 1 Meter Länge. Taf. XXJ.

Ich nenne sie

Marmora darwini.

Mein Schreibtisch hat dieselbe Platte, aber nur mit etwas wesniger deutlichen Pflanzen.

Ich schrieb also eine ganze Abhandlung über die Urzelle auf der Urzelle, denn der ganze Marmor ist nichts als Pflanze. Wirklich — nicht bloß Fronie des Schickals.

9 Nachtrag

Ich habe den Ophicalit von Krummau in Böhmen, ferner den von Passau untersucht: dieselben, welche Gümbel und v. Hochstetter als Eozoon erklärten. Beide enthalten Pflanzen, jedoch nicht so viele, als das canadische Gestein. Der "Warzenansäze" Gümbels habe ich schon gedacht.

10 Basalt

Ich wollte den Basalt blos gelegentlich besprechen. Ich konnte mir aber doch nicht versagen, dieses von den Bulkanisten am eifrigsten umworbene Gestein einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.

Ich habe 2 Basalte von Biberich.

Beide haben 3 cm. lange Pflanzen (ohne alle Unterbrechung) Zelle an Zelle gefügt.

Der Dünnschliff zeigt ein vollständiges zusammenhängendes Pflanzen-Netz. Es kann sich daher bei beiden nicht darum handeln, dass sie etwa blos eingelagerte Pflanzen (Leichen) enthalten. Die Pflanzen sind durchaus erhalten, also, wie ich sie nenne, lebende. Dasselbe Verhältniss ist bei den Alb-(Nephelin) Vasalten. Einzelzeichnungen Tas. XXVIII. 1-7.

In jedem Basaltstück, besonders den leicht angewitterten, lassen sich die Pflanzen erkennen. Die Frage ist jetzt nur noch: was ist Basalt, was ist Lava?

Der Basalt ist ein Eruptivgestein: er rührt aber von Schlamsmausbrüchen, ebenso der Basalttuff.

Es wäre von grossem Interesse (es ist meines Wissens noch nicht geschehen), dass man die neueren Schlammausbrücke in der Tiese, wo sie rein erhalten sind, untersucht.

11 Feldspath

Auch über dieses Mineral muss ich noch einige besondere Bemerstungen machen.

Am schönsten ist der Labrador.

Es sind Niesenpflanzen. Die blaue Färbung folgt, wie ich mich jett an einem großen Stück der Tübinger Sammlung überzeugt habe, vollständig der Structur der Pflanze, ähnlich der von mir im Silur von Quebec gefundenen Oldhamia antiqua. Die Streisfungen und die microscopischen Einlagerungen sind auf Nechnung der Pflanze und des PflanzensWachsthums zu schreiben.

Die gemeinen Feldspäthe sind von Pflanzen ganz durchzogen. Mir scheint die 2- und 1 gliedrige Form an die Form der Pflanze und Pflanzenzelle sich anzuschließen. Die Grundsorm der Stammzelle im Granit ist 2- und 1 gliedrig.

Es liegt mir ein Feldspath-Arnstall aus der Tübinger Sammlung mit einem Relch vor, dessen Spiken ich gerade auf Fläche M einschrieb.

Der Crystall ist aufgewachsen.

Das Muttergestein ist Schriftgranit, in welchem die Algen in Quarz verwandelt sind.

Man sieht nun, dass es eine Pflanze ist, ein grosser Kelch, welcher die Crystalle bildet.

In einem Hornblende-Gestein von Montreal sind völlig entwischelte Pflanzenkelche von einem Hornblende-Arnstall umschrieben.

Es wird Aufgabe der Zukunft, das Verhältniss von Crystall-Form zur Grundform der Pflanze und umgekehrt zu untersuchen. Perthit von Granville Canada sind die schönsten macroscopischen Pflanzen. Ebenso gut hätte es ein Schriftgranit werden können.

Ein Bild eines Haunngesteins bietet Tafel XXII. Hornblende schräg, Haunn horizontal schraffirt, das schwarze ist Magnetit, das übrige Gestein (Feldspat)-Pflanze. Man sieht an dem Relche links den Relchstil als Crystall: einen Relch in einen Hornblendecrystall verwandelt, zwei Brukellen in Haunn: ebenso an der Wurzelzelle und in diese Crystalle eingefügt das Bild der Pflanze!

12 Silur

Die Algen des Urgebirgs setzen im Silur fort. In Quebec und Montreal habe ich eine ansehnliche Sammlung von Handstücken zusammengebracht. Pflanzenbilder daraus Taf. XXII. XXIII.

Von Quebec die Kalk- und Thonschichten, in Montreal Kalk und Hornblendegesteine.

Im Silur-Ralf von Quebec sind überall die Algen noch die Gesteinsbildner, dann folgen die Lagen von Detritus alias Thonschiefer.

Der Mont real bei Montreal ist ein Hügel von Hornblende.

Ich gebe einige Pflanzenbilder auf demselben in Tafel XXIV. Aber auch hier sind nicht die Pflanzen im Gestein, sondern das Gestein ist noch die Pflanze.

In einer Relchzelle, aber auch nur dort, fand ich die Bilder Tafel XXIV. Figur 5. 6. 7.

Ich hielt sie für eine Diatomacee und nenne sie

Diatoma Montreali

der Stadt Montreal zu Ehren, deren Gastfreundschaft ich genoss.

Die Pflanzen-Form Taf. XXIV. Fig. 2. nenne ich

Parthenon Munderlohi

(deutscher Consul in Montreal), der mich auf der Excursion begleitete.

Merkwürdig sind Rieselknollen, die im Silur bei Montreal gestunden werden, amöbenartige Formen bis zur Grösse eines Ropfes,

mit welchem die Anlagen des M'Gill-Colleges garnirt sind. Sie sind nichts als Stammzellen von Riesenalgen.

Ich nenne sie Herrn Dawson zu Ehren, der dort wohnt, Photophoba Dawsoni.

Mögen wir uns über diese Photophoba hinüber die Hand der Versöhnung reichen.

Im Silur, schon in dem Hornblendegestein, sind riesige Formmen. Eine Relchzelle von 3 cm. Breite! und zwar dieselbe Form, aus welcher das Labrodorgestein gebildet ist.

Taf. XXIII. Fig. 7.

Ich nenne sie Benrichia zu Ehren des Herrn Prof. Benrich. Eine Art Oldbamia.

Im Silurfalk Relche von 5-6 cm. Man sieht die Wirkung des jett ausgeschiedenen Kalkes als Pflanzenbildners.

In den Anlagen von Montreal sind sog. "Fancy" Steine, Ralk mit Protuberanzen von 30-40 cm. Durchmesser. Es sind riesige Algen-Zellen. Ich habe am Lagerplat einen abgeschlagen, der die deutlichste Structur zeigt.

Aber auch kleinere Formen gibt ef, ja microscopische — das Silur ist noch vorzugsweise Pflanze.

Hier beginnt erst das grosse Tierleben.

13 Rücklick

Im Silur findet die gröffte Entwicklung der Individuen statt, dagegen nehmen sie in der Zahl ab.

Durch den Kalkniederschlag schliesst sich die Urpflanze von ihrem Lebenselement, der Rieselerde, ab und nun beginnt die Aera des Thons, des Kalkes. Die Formen werden vielfältiger, seiner.

Beweif für die Entwicklung neuer Arten bei veränderter Lesbensbedingung!

In der Tat finde ich in dem chemischen Vorgang den Schlüssel zum morphologischen.

Jeder Niederschlag ist eine Aenderung der Mischung: das Zurückbleibende ist immer ein Teil, wie das Ausgeschiedene. Mit dem Laurentiankalk war der Ansang zur Entkalkung der Erdobers fläche gemacht und damit zugleich der Auslösung der Rieselerde durch das Wasser ein mechanischer Abschluss gegeben. Die alten Pflanzen, welche durch ihre Bezüge, wie ihre Ausscheidungen die Obersläche der Erde geändert hatten, welche zulest in mechanischen Decken auf ihrem Lebenselemente lagern, sinden ihr Gedeihen nicht mehr wie früher. Rur einzelne Individuen überdauern die Ratasstrophe, entwickeln sich im Laurentian (Labrador und Hornblende), zulezt in der Rohlenperiode zu Riesen, um dann einer jüngeren Generation zu weichen.

Im Silur finden sich noch die alten Arten von Algen. Ich glaubte mein Werk nicht besser schliessen zu können, als mit Abbildungen einer Anzahl Pflanzen auf dem Silur. Allerdings nicht derer, welche man dort gewöhnlich aufgeführt findet. Die bekanneten Algen auf dem Silur sind ganz andere, als die Urpflanze, welche ich nachwies; hätte man sie im Silur erkannt, so hätte sie auch im Granit und Gneis nicht übersehen werden können.

Der Granit und Gneis ist die eigentliche Pflanzenzeit unserer Erde. Im Silur schwindet die Masse der Pflanzen. Die Formen sind noch da, aber der Schlamm herrscht schon vor, welcher die Pflanze die Rieselerde zu lösen verhindert.

(Jedes Geschöpf gräbt sich selbst sein Grab!)

Nachdem auch der Kalk niedergeschlagen ist, wird die Luft das Lebenselement der Pflanze, vorher war es das Wasser.

Damit brach die Kohlenzeit an.

Die Urpflanze verkriecht sich auf die Tiefe des Meeres und verschwindet auf der Erde, setzt aber ihr Leben unter der erhärteten Oberfläche fort.

Zwar habe ich noch in einem lithographischen Kalk, auf welchen ich meine Abbildungen zeichnete, einzelne wenige Sporen eingesbettet gesehen. Was soll das gegen früher?

Eine wichtige Frage bleibt übrig.

Ich habe oben festgestellt, dass der Basalt Pflanze ist. Aber viele Basalte gehören der Tertiärzeit unserer Erde an.

Ich habe mir die Untersuchung auf spätere Zeiten aufsparen wollen, nehme sie aber doch lieber sogleich vor.

Ich untersuche

Basalt von Biberich.

Basalt von Neuhausen, Urach,

Basalt von Kirchheim,

ersterer Feldspat, beide lettere Nephelin-Basalte.

Anfangs glaubte ich, letztere enthalten todte Pflanzen oder Pflanzen-Reste, bald überzeugte ich mich vom Gegenteil — auch der sog. Nephelin-Basalt ist ein Pflanzen-Gestein mit lebenden Pflanzen (wenig todte Reste.) —

Dies fordert zu neuen Gedanken auf.

Die Pflanze zur Tertiärzeit musste einen langen Weg machen und kam lebend zur Oberfläche!

Die Urpflanze lebte also in der Nacht, sie lebt heute noch dort und bedarf zu ihrem Wachsthum nur des Wassers.

Dies fliest ihr von der Oberfläche zu.

Wir leben auf einer groffen Sargaffo-Decke.

Dass dies so ist, beweisen die wellenförmigen Erdbeben, beweisen die Vulkane.

Die Bulkane kommen mit ihrem Meere, gehen mit ihrem Meesre.

Alle unsere tätigen Vulkane liegen nicht zu entfernt vom Meere. Beweis, dass sie dem Wasser ihre Entstehung verdanken.

Die Tätigkeit des Erdinnern muss eine organische sein, eine unsorganische wäre nicht denkbar. Denn alle möglichen blos chemischen Verbindungen hätten längst vollzogen sein müssen. Dhne Hinzustreten eines neuen Stoffes wäre eine Tätigkeit nicht möglich. Dieser Stoff kann kein anderer sein, als Luft oder Wasser. Die Luft ist es nicht, wenigstens blos an offenen Stellen, an schon entstandenen Vulcanen wird sie von geringer Vedeutung.

Auch die früheren wirklichen Revolutionen der Erde hatten ihren Grund in der organischen Tätigkeit der Urpflanze.

Heute noch wuchert sie unter der festen Erdoberfläche, bildet Gase, und so entstehen die Erdbeben, die Vulcane.

Die Vulcane sind nicht Feuerbrände im Innern der Erde. Vielmehr sind es blos Gase, welche beim Austritt aus der Erde sich rückwärts enzünden, mechanisch wirken und dabei das anstehende Gestein schmelzen. Lava.

Daher die periodische Tätigkeit, der Anfang derselben blosse Gasausströmungen. Erdbeben.

Es können sich leichtbrennliche Gase bilden, welche wie die schlasgenden Wetter sich enzünden und dann bei fortwährendem Zuströmen fortbrennen.

Eben diese Art der Tätigkeit in Verbindung mit Erdschwankunsgen spricht dafür, dass die von der Pflanze ausgeschiedenen Gase dem Ventile zuströmen und dort verbrennen, bis der Vorrath erschöpft ist.

Alles dies ist blos mittelst des Wassers möglich.

Der Basalt ist einer der letten Schlammausbrüche. Ausbruch der damals wenigstens sicher noch lebenden Urpflanze.

Die Steinkohlen kommen nicht von den Equiseten der damaligen Zeit, sondern verdanken ihr Dasein den Rohlen-Gasen auf den unermesslichen Lagern der Urpflanze. Daher auch das Fehlen der Rohle im Granit: Einschlüsse von Rohlensäure, Anthracit- und Graphitlager sind noch davon übrig.

Jedes Meer der Erdzeiten hatte seine eigene Bulcane; sie sind aber erloschen, sobald das Wasser seinen Ort wechselte.

Jüngerer Granit? älterer Granit? Geburtstag — Zeugungsstag. Verwandtschaft des Granits mit dem Trachyt.

Gibt ef Crystalle ohne Pflanzen?

Der Diamant (dafür spricht seine Form) ist Fällmasse von Pflanzenkelchen.

Die Erdwärme rührt nicht von unterirdischem Feuer her, sons dern von chemischen Processen; daher keine Angst vor der Erkaltung der Erde, solange Luft und Wasser sie umgiebt.

Ich untersuche einige »Vulkan-Gesteine« und finde

Noca Pichincha von Quito — lebende Pflanzen.

Haupngestein von Tomlada-Lazio — lebende Pflanzen.

Abbildung Tafel XXII.

Schräg schraffirt Hornblende, gerade schraffirt Haunn, dunkel Eisen. Hell gezeichnet weisse Glas oder Feldspatmasse.

Wunderbare Zusammenfügung von Pflanze und Crystall!

Ich nenne diese Pflanze zu Ehren Sr. R. Hoheit des Kronsprinzen Rudolph von Destreich, des eifrigen Naturforschers,

Stygia Rudolphi.

Die Laven sind wirklich todte Gesteine, sie enthalten blos Leichen von Pflanzen.

Abgerissene Stücke.

Sphaerulit hat macroscopische Pflanzen, todte eingebettet.

Perlit von Antisana — lebende Pflanzen. Phonolit lebende Pflanzen.

14 Die Ergebnisse dieser Entdeckungen

Perlit von Antisana — lebende Pflanzen. Phonolit lebende Pflanzen.

Die Ergebnisse dieser Entdeckungen sind bedeutend.

Wir dürfen uns nun die Erdoberfläche beim Beginn des organischen Lebens jedenfalls nicht mehr als von einem heisen oder gar seuerflüssigen Granit oder Gneisbrei bedeckt denken. Denn dieser Brei, welcher so lange die Phantasie der Geologen beschäftigte, bezüglich dessen sie sich nur darüber stritten, ob derselbe seuerflüssig oder wasserslüssig gewesen sei, (was man denn auch in die ganz unrichtige Fragesorm fasste: ob durch Wasser oder Feuer entstanden?) — dieser Brei muss jetzt einer anderen Vorstellung weichen.

Da war von den ersten Atmosphäreniederschlägen Eine grosse See über die ganze Erde, in dieser wuchsen Pflanzen in undenkbarer Menge, und zwar die niedersten Arten einer einzelligen Alge oder Flechte.

Diese Pflanzen, die Erzeugnisse der Verbindung des ersten Wassers mit der Erde, bauten sich in Rieselzellen auf, setzen neue Zellen an, starben ab, und das wurde die erste Erdschichte!

Leider haben sie die Erde selbst dem Geologen auf ewig bestedt. Damit, dass der Basalt als Pflanze nachgewiesen ist, ist jede Hossnung verloren, jemals das Erdinnere kennen zu lernen.

Diese Pflanzen des Granits müssen ein grosses Volum einges nommen haben, sie bildeten schon im Anfang ihres erstaunlichen Wachsthums Verge und Hügel in der See und diese Verge und Hügel wurden zu unseren heutigen Granit- und Gneis-Gebirgen. Daher die Fächer-, die Ruppel-Formen.

Die Gneisbildung war einzig und allein die Folge davon, dass die Schründe, Risse und Tiefen der ursprünglichen Erdoberfläche durch Tange, Schlamm ausgefüllt waren. Nun erst konnte sich ein eigentliches regelmässiges Sediment bilden.

Es war möglich, wenn eine ebene Grundlage geschaffen war.

Indessen bildeten sich die Pflanzen in der Form weiter.

Wo die Ablagerung eine ursprüngliche, das Wachsthum der Pflanze ein ungehindertes war, finden wir Gneis in seinen verschies denen Formen.

Aber ef gab auch Stellen, wo Detritus sich ablagerte. Hier entstand aus den Leichen und dem Schlamm des Granits und Gneissmeeres der Porphyr.

Allerdings nicht ohne eigenes Leben. Aber das Leben darin ist viel kleiner. Die Formen sind meist microscopische, eine Masse abgerissener Leichen (ohne Zusammenhang mit dem Pflanzenstock) finden sich. Dagegen haben sich auch Ernstalle außuscheiden angefangen.

Man hat sich gewiss schon oft im Stillen wenigstens darüber gewundert, warum im Granit und Gneis der Quarz nicht crystalelistet, sondern blos in (wie man glaubte) ganz willkürlicher Form vorkommt.

Der Grund ist, weil der Quarz und Feldspat des Granits und Gneises in einen Pflanzenleib gebannt ist. (Hier sind blos die Anfänge einer Arnstallisation.) Er ist Produkt der ersten organischen Tätigkeit der Erde. Im Porphyr war er frei und so sehen wir auf der Pflanzenthätigkeit den Stoff der künftigen Crystalle hervorgehen (wie den Apatit, Kalk auf den Gneifspflanzen).

Es wäre sehr wichtig, jetzt die Entstehung bedeutender Mineralien (einschliesslich der Erze) in diesem Zusammenhang zu erforschen.

Die meisten Minerale sind wol Produkte organischer Tätigsteit, sofern durch letztere der chemische Process wenigstens eingeleitet wurde, der zur Entstehung der Minerale führte.

Diese Tatsachen erklären auch die "Einschlüsse im Quarz und Feldspat" einzig genügend, besonders was die Regelmässigkeit der Lagerung betrisst, zerstören aber sofort die Hypothese vom unsgeheuren Druck, welcher die Kohlensäure darin zusammengepresst hätte.

Wenn ich also jett sage: Granit, Gneis, Porphyr sind kein Urgebirge, so heisst dies richtiger gesagt:

Die Bestandteile dieser Gebebirge Quarz, Feldspat, Glimmer sind in ihrer jezigen Form in Folge der organischen Arbeit der Erde ausgeschieden und wieder zusammengelagert. Das führt auf die Frage: was war vorher da? Da sind wir allerdings durch meine Entdeckungen nur in soserne besser daran, als wir jekt wissen, dass Etwas, nemlich das Urgebirge, "im Ansang" nicht da war, also auch entstand wie das übrige Sedimentgebirge. War es meteorsteinartige Masse?

Wir müssen also unsere Zuflucht wieder zur Beobachtung nehmen.

Was die Erde heute noch auswirft, Augit, Feldspat in der Lava ist der Kern der Erde, allerdings ist es aber auch zweiselhaft, ob ganz in dieser Form, ob die Masse nicht auf ihrem Wege zum Lichte selbst schon Beimischungen erhalten hat, ob nicht die Metalle, insbesondere das Eisen (nach dem Gesetz der Schwere) wenigstens teilweise davon zurückgeblieben sind.

Meine Entdeckungen nöthigen nun zu einer besseren Erforschung und Erklärung der Tatsachen bezüglich des Erdinnern.

Ein Wunsch, den ich daran anknüpfen möchte, ist der: nicht ohne Erforschung, ohne ganz gründliche Versuche Hypothesen auf Hypothesen zu häusen. Ich gestehe, ich schlich mich jedesmal auf der Gesellschaft fort, wenn die Rede auf die Vorgänge in der Granikeit kam und von diesen natürlich fürchterlichen Revolutionen mit einer Sicherheit gesprochen ward wie von einem Theaterstück, das man von der 1. Gallerie aus mit ansah. Es gibt in der Tat nichts wohlseileres als solch wichtige Vesprechungen, aber auch keinen endloseren Streit als diesen.

Uberhaupt möchte ich dringend rathen, den Weg der Beobachstung, des Versuchs noch lange nicht zu verlassen.

Seit der Aufstellung der Darwin'schen Säße, welche aber durch tausend Beobachtungen, also Tatsachen, begründet waren, glaubt Jeder Säße aufstellen zu dürfen — ohne Beobachtung. Damit ist die Wissenschaft selbst und zwar nicht unverschuldet in starken Misseredit gekommen, sie hörte eben auf, die exacte zu sein und fiel damit in einen Fehler, welchen sie an einer andern Wissenschaft rügte.

Freilich, man braucht auf das Denken nicht zu verzichten. Man kann auch im Kämmerlein sich seine Hypothesen machen. Aber man hüte sich, auf 2, 3 Tatsachen das Weltganze erklären zu wollen.

Auch die Freude an dem grossen Naturleben (am Ganzen) will

ich nicht verderben. Im Gegenteil, ich möchte sie erst erweitern. Diesel ist nur möglich nach redlicher Arbeit am Ganzen. Dies ist die Beschäftigung mit dem Einzelnen, eine Beschäftigung, die nie ermattet und die grosse Schuld der Zeiten sandkornweise tilgt, diese Arbeit gibt uns allein einen wahren wissenschaftlichen Einblick ins Ganze.

15 Sandsteine

Die Huronian-Formation ist, wie ich vermuthe, ebenfalls eine Pflanzenschichte, wie die meisten Sandsteine.

Sicher, dass es Pflanzenschichten sind, weiss ich vom Buntensandstein, Lettenkohlens und Reuper-Sandstein.

Als ich nemlich in Tübingen zur Druckerei ging, fand ich ein Stück Stubensandstein, etwa 6 cm. Durchmesser mit den deutlichsten Relchen. Die Stassel des Hauses von Kneuper-Sandstein zeigte Pflanzen von 1/2 Mtr. Länge.

Die Rampe des Bahnhoff von Lettenkohlen-Sandstein ist durchaus Pflanze, wie auch daneben das Pflaster von Bonebed-Sandstein.

Wie hundertmal bin ich schon über diese Platten und Andere sind noch öfter darüber gegangen.

Zu Hause untersuchte ich Dünnschliffe von Buntemsandstein und Reuper. In ersterem fand ich Relch an Relch (von länglicher Form), in letzterem ebenso kleine rundliche Relche, beide microscopisch. Die Relchzellen im Bunten-Sandstein von Glimmer! Prachtboll.

Hier ist also die Pflanze überall mit Quarz ausgefüllt. Daher Sandstein!

Wie einfach nun Alles.

Statt Strömen von Meeren ruhige Pflanzen-Seen.

So wird noch auf mancher haarsträubend geschilderten, ja sogar abgebildeten Revolution auf der Erde, wie sie unsere Geologen mit Vorliebe vorführen, ein stagnirendes Wasser.

Wo Platten und regelmässige Schichten-Ablagerungen sind, muss immer an Pflanzen gedacht werden. Die Pflanze ist ein zerbrechlicher Stoss, daher der schieferige Abgang.

16 Meteorstein

Meteorstein von Annahinna vom 6. Juni 1858.

Wieder war meine Arbeit geschlossen, als ich nochmals meine Schlisse vornahm, um einzelne Gesteine wie Gabbro zu untersuschen.

Ich war mit der Durchsicht am Schluss und hatte mich schon berzlich gefreut, auch in dem Gabbro-Gestein dieselben Pflanzen gefunden zu haben, wie im Granit, — da waren noch 4 Meteorssteine übrig.

Der Zweck, der mich beschäftigte, war, organische Einschlüsse zu finden. Sollte ich die Meteorsteine ansehen? Ich fürchtete mich fast, so töricht zu sein und in der Tat vor einigen Tagen hatte ich die Schlisse für jest als werthlos zurückgelegt.

Endlich entschloss ich mich doch.

Der erste Schliff von einem Stein der Tübinger Sammlung (ganz klein) mit vielen Olivinen zeigte bedenkliche Formen.

Der zweite ebenfalls mit ziemlich viel Olivin zeigte Pflanzen und zwar Pflanzen mit solcher Sicherheit, dass nicht der kleinste Zweisel blieb.

Der Stein ist von Annahinna 6. Juli 1858.

Die Schnittfläche ist etwa 70 mm.

Das Aussehen grau-grünlich, man sieht kleine metallische Punkte, ferner zwei durchsichtige Stellen: im Microscop zeigt er gelb und grauliche Färbung mit schwarzen Einlagerungen.

Die Formen, welche ich feststelle, sind folgende:

Urania guilielmi

zu Ehren unseres Kaisers. Taf. XVII.

Die Pflanze steht zwischen Alge und Farn.

Ein freisrundes gewölbtes Blatt.

Von dem Stammzelle-Ansatz gehen 12 Samenzellen aus, welche am Rande des Blattes mit einer runden Deffnung endigen.

Am oberen linken Teile steht eine neue Zelle an.

Der Stamm wächst auf einem runden Relche und endigt dann mit einer Wurzelzelle. An demselben Stamm sind mehrere junge Zellen ausgewachsen.

Die Farbe des Gesteins ist ein Smalte-Grau.

Das Bild ist bei 90 facher Vergrösserung gezeichnet.

Auf beiden Seiten unten sind Vergrösserungen der Zellen bei 250 und 750. Die Zellen sind von unmessbaren schwarzen Punkten eingefasst.

In der Nähe der Pflanzen ist ein Prothallium von derselben Farbe wie das Blatt, offenbar Urania angehörend.

Aber der ganze Schliff ist nichts als Pflanze.

Urania ist in 8 sehr schönen Exemplaren darin.

Am schönsten aber ist ein Durchschnitt der ganzen Pflanze in der Mitte des Schliffs.

Nun die Frage, wie verhält sich die Form der Urania zu denen der Erde?

Dieselbe Pflanze sindet sich nicht. Aber die ganze Structur unserer lebenden Algen oder Farne ist da.

Der Dünnschliff enthält hunderte von Pflanzen.

Ich nehme nun meine Dünnschliffe vor.

Zunächst untersuche ich einen Olivin vom Allenthal (von Neusmann in Freiberg). Dieselbe ist durchzogen von schlingpflanzartigen Algen mit einigen deutlichen Fruchtorganen.

Merkwürdigerweise zeigt Nr. 2. Meteor Dünnschliff Tübinger Sammlung (Fundort unbestimmt) ähnliche Pflanzen.

Doch halt —

Der ganze Schliff ist eine Kelchzelle (das übrige Material ging beim Schleifen zu Grunde). Taf. XXVI. Fig. 2. in natürlicher Grösse. Fig. 4. (Lupe).

Dieser Dünnschliff ist völlig durchzogen mit einer schlingpflanzsartigen Alge (wie ich sie in den Algen des Laurentian-Serpentinsbeobachtet habe).

Die Masse ist Olivin.

Am Rande des Kelches sitzen graue Kelche. Taf. XXVI. Fig. 5. 6. 7. 8.

Die Schlingalge ist dunkler Olivin, metallisches (gediegenes?) Eisen ist überall ausgeschieden und bildet nun die Prothallien.

Vielfache Copulation.

Die Erhaltung ist ausgezeichnet.

Ich nenne sie

Heliola Caroli

unserem Rönig zur Ehre.

Ein weiterer Schliff (Fundort unbekannt) Taf. XXVI. Fig.

9. natürliche Gröffe. Fig. 1. u. 3. Teile 1/90.

Meteorstein von Pultust

Taf. XXVII. 3. 1/2. Der ganze Schliff.

Desgl. 1. u. 2. 1/90.

Vergleiche Taf. XXVIII. Fig. 1. Bafalt.

Dhurmfala 1/90. Taf. XXVII. Fig. 7.

Hainhold. Eaf. XXVII. 9. $\mathfrak u$. 10. 1/2.

Diese Pflanze nenne ich dem mit Unrecht vergessenen schwedischen Naturforscher Imanuel von Swedenborg zu Ehren:

Sphaerothallium Swedenborgi.

Enfisheim. Taf. XXVII. 4. 1/2.

Schliff auf der Tübinger Sammlung.

17 Meteoreisen

Nachdem der Meteorstein von Knyahinya und andere untersucht waren, nahm ich Meteoreisen vor.

Als sicherstes Rennzeichen des ächten Meteor-Eisens gelten die Widmannstättischen Figuren.

Thre wahre Gestalt geht aus Tafel XXIX. Fig. 1-9. (Mesteoreisen von Toluca) hervor. Es sind Pflanzen und nichts als Pflanzen. Pallaseisen.

Besonders merkwürdig!

Die Olivine sind die Relchzellen.

Das Schwefeleisen die Füllmasse (Mark), das dunkte Eisen das Holz (wenn der Ausdruck erlaubt ist), dass weisse Eisen die Zell-Membrane der Meteoreisen-Pflanze.

Die Crystallform ist ganz sicher hier zugleich Pflanzen-Form. (Siehe v. Rokscharow, Materialien zur Mineralogie Russlands Taf. 75. 76.

Es stimmt das specifische Gewicht der Erde mit dem Gestein, oder vielmehr Metall der Meteoriten.

Die Pflanzen gleichen wenigstens den tellurischen: insbesondere der "acervulinen Form" des Eozoon.

Ob diese Meteoreisen und Steine nicht Teile der Erde sind, welche in frühester Zeit losgelöst und ihren eigenen Weg eine Zeit lang genommen, später aber sich wieder mit der Erde vereinigt haben?

Wie aber können Pflanzen Eisen werden?

Können sie Eisen, Olivin sein?

Die Erhaltung der Formen, wie sie im Leben sind, eine solche Erhaltung der Organe ist wirklich wunderbar, und könnte zu letzterer Meinung führen.

Im Hornblende-Gestein von Montreal sind Teile der Pflanze metallisches Eisen.

Ich nenne die Pflanze des Meteoreisens von Toluca

Astrosideron Quenstedti

zu Ehren meines Lehrers, die des Pallasits zu Ehren des Kaisers von Russland:

Alexandrea.

Gibt ef nicht Protisten von Mineral und Pflanzen, wie von Pflanze und Tier?

Es ist die Übereinstimmung der siderischen und tellurischen Pflanzen zu untersuchen.

Run ist ein sicheres Erkennungseichen für Meteoreisen gegeben.

Das Eisen aus dem Basalt von Grönland ist nichts als Pflanze, ist also Meteoreisen.

18 Die Urzelle — Crystall-Pflanze — das Tier

Bis jest hatte man keine Kenntniss von der wirklichen Form der Urzelle. Erst im Laufe meiner Untersuchung wurde sie mir klar und klar, dass sie auch die Grundform des thierischen Körpers sei. Dies geschah aber erst, nachdem ich Alles Bisherige gesehen und geschrieben hatte.

Man wusste nur, dass die Zelle eigentlich die Einheit des thierischen Körpers sei, dieser aus jener zusammengesett wird.

Man kannte eine Unzahl Formen dieser Zelle, man kannte Verbindungen dieser Zellen zu Gefässen und Organen. Aber ein Ding, welches Urzelle und Urbild auch des menschlichen Körperssein könnte, davon hatte man keine Ahnung.

Dieses Urbild glaube ich in der Urzelle entdeckt zu haben, deren Wachsthum ich auf Tafel XVIII. dargestellt habe. Die Weitersentwicklung derselben ist die Figur Taf. I. und Taf. XVIII.

8. XIX. 3. Die nähere Begründung später.

Die Entstehung der Urzelle, das bemerke ich hier, rauss mit dem Stoff im Zusammenhang stehen. Sie entstand aus dem Stoff der Erdobersläche in Verbindung mit dem der Atmosphäre, des Aethers. Die Stoffe sind verbraucht, sind in andere teilweise unslösliche Formen übergeführt und so ist eine Zwischenwand zwischen Atmosphäre und dem Erdinnern geschaffen, eine Absperrung, welsche eine fortdauernde Erzeugung derselben im früheren Maase unmöglich macht.

Die Bau-Stoffe sind durch das Festwerden der Erde andere geworden und das Wachsen in der Menge ist abgeschnitten, andere Arten entstanden auf anderen Stoffen.

Die Urzelle hatte (solange ihr der Baustoff zu Gebot stand) die Fähigkeit, sich ins Unglaubliche zu vermehren, aber auch die Fähigkeit sich zu entwickeln.

Doch vor Allem ihre Grundform.

Was ich als Ansang gefunden, ist eine halbkugelige Schaale, deren Baustoff nichts anders sein kann, als ein Silicat.

Ich möchte übrigens die Frage hier offen lassen, ob die erste Form nicht blos ein Plättchen ist, das sich zur Halbkugel erst entwickelt. Da diese ganz einsache Form ihrer Natur nach sehr schwer nachzuweisen ist, so möchte ich diese Frage der Zukunft überlassen. Soviel ist aber gewiss, die erste Zelle tritt bald als eine Halbkugel auf.

Ist sie nach oben, oder nach unten gerichtet?

Ich habe auf Tafel XVIII. die Entwicklung der Zelle in ihrem ersten Stadium abgebildet.

Ich möchte auch die Frage offen lassen, ob das, was ich als den Ansang bezeichnet habe, wirklich das erste Stadium der Entwicklung ist: ob also nicht die erste Zelle nach abwärts gerichtet ist? und dann erst der zweite Abschnitt der Zell-Bildung, nach oben, eintritt.

Ich habe einige Tatsachen beobachtet, welche dafür sprechen.

Im Ralk stehen die Zellen, so lange die Pflanze im Ralk wächst, nach unten: erst wenn sie aus dem Ralk hervortreten, entstehen die Zellen, welche sich nach oben richten. Das lässt sich bei grösseren Arten beobachten, welche den Serpentin durchsezen, also in die Lust- oder Wasserschichte eingetreten sind.

Ob die Zellen im Licht oder Wasser gelebt haben? Im Laurenstian waren es Wasserpflanzen.

Nun wir haben als Form eine Halbkugel.

An dieser bildet sich ein Ansak, Wurzelzelle. Die Zelle wird zum Trichter. Der Trichter schnürt sich ab: dadurch entstehen Stamm-Zellen: die letzte ist die Relchzelle, welche der eigentlichen Fortpflanzung dient. Das hindert aber nicht, dass sich überall an der Zelle Ansäze zu neuen Zellen und neue Zellen bilden.

Die Quer-Durchschnitts-Form der Zelle ist die runde.

Ob ein Gesetz ihre Länge beherrscht, ist zweiselhaft, eine Grenze hat das Wachsthum, aber nach welchem Gesetz ist nicht sicher.

(Anwendung auf die Säule im Crystall).

Ich glaube annehmen zu dürfen, dass ein solches Gesetz besteht. Das Pflanzen-Individuum hat im Relch seinen Abschluss gefunden.

Ich muss solche Fragen offen lassen.

Es schnüren sich aber auch weitere Zellen innerhalb der Zelle ab. Es erfolgt eine Teilung in zwei Reihen und sofort.

Die Teilungfelle ist ebenso gut Relch als Stammzelle.

Wir haben also die Wurzel-, Stamm- und Kelch-(End-)Zellen der Urpflanze.

Die einzelnen Zellen sind zugleich Crystalle und bleiben es nach dem Tode; dadurch geht die Pflanze in das Mineral über.

Die eigentliche Pflanze ist da, sobald eine Zelle ein selbständiges Ganze auf der Baustoffmasse sich abscheidet.

Auf dieser entsteht dann, indem sie sich vom Boden loslöst und ihre Nahrung nicht durch die Wurzel vom Boden oder durch den

Relch auf der Luft, dem Wasser zieht, was nach oben oder aussen offene Nahrungsorgane voraussett — das Tier. Die Bewegung ist eine Folge davon.

Titanus Bismarki Tafel XII. XIII. ist ein Schlauch, der sich festsetzen, aber auch frei bewegen kann, der seine Nahrung nicht mehr aus dem Stein, der Erde, zieht, sondern frei wählt, sich nach der Nahrung bewegt.

Damit glaube ich auch den Begriff des Tiers einigermassen festgestellt zu haben.

Die Urzelle besteht auf Wurzel, Stamm- und Relch-Zelle.

Es sind die 3 Hohlräume des organischen Körpers, welche auf dem Weg der Abschnürung entstehen.

Was freilich diese Abschnürungen, diese Entwicklung bewirkt, wissen wir nicht.

Der Crystall ist die mit dem Entstehen stillstehende, abgeschlossene Zelle: die Pflanze — wächst — bleibt aber mit der Erde in Verbindung, das Tier wird, wächst und löst sich zu selbständiger freier Vewegung los.

Auch dies sind blos Entwürfe, Grundlinien. Möge die Zukunft sie bestätigen und verbessern.

19 Der Krystall

Ich habe schon oben zur Untersuchung darüber aufgefordert, ob der Crystall wenigstens mit der Ur-Pflanzen-Zelle nicht in einem gewissen Zusammenhang stehe.

Unsere Abbildungen Tab. XXII. XXVII. Fig. 5. 6. 8. legen die Frage nahe, ob der Crystall aus der Pflanze, oder die Pflanze aus dem Crystall entstanden sei.

Soviel aber ist mir sofort klar: wir müssen unsere Ernstalle einer neuen Prüfung unterwerfen, nemlich in der Richtung, ob wir es wirklich mit Ernstallen zu thun haben.

Ich habe gezeigt, dass gewisse Crystalle (Granit, Leuzit etc.) Füllmassen von Pflanzen-Zellen sind. Daher also auch wohl das Geset der Symmetrie. Dieses ist nicht ein Geset der Molecüle, sondern der Pflanzen-Symmetrie, der Pflanzenzelle.

Vor Allem den Augenschein.

Ich nehme eine Reihe Crystalle vor.

Das Ergebniss ist:

Die Crystallform ist eine Umschreibung der Pflanzenform in der Art, dass sich überall eine Pflanze in dem Crystall eingezeichnet findet, oder der Crystall um die Pflanze liegt.

Quarz. Tafel XXX. 9. 10.

Ich finde in zwei dünnen Quarzen die Figuren der Urpflanzensform eins, aber auch auf der Seite aufgezeichnet. Die Einschlüsse und gewisse dunkle und helle Stellen bezeichnen die Gestalt der eingelagerten Pflanze.

Die matten Flächen des Quarzes auf dem Diheraeder, welche als Zwillingsbildung gedeutet wurden, sind Pflanzenformen. Fig. 14. Die gewundenen Quarze verdanken ihre Gestalt der spiraligen Zellstellung der Pflanzen.

Aragonit, Herrengrund. Zwillinge, Drillinge. Tafel XXX.

Auf der geraden Endfläche sind soviele Pflanzen als Crystalle. Das Merkwürdigste ist die Säule.

Der Mittelpunkt der Säulenfläche fällt mit dem Kelchmittels punkt der Pflanze (gegen den Beschauer gekehrt) zusammen. Fig. 3.

Ein Pflanzen-Individuum und zwar das erste, streckt die Relchspitze in den Relchhalf des zweiten und so fort. Dieser Pflanzenkelch
liegt also wie ein Kranz in der Mitte des Crystalls horizontal und
berührt dessen Peripherie.

Ein Wunder, aber wahr.

Corund. Saphir. Fig. 11. 12.

Der Corund ist die Auffüllung eines Pflanzenkelchs. Ein Saphir auf der Tübinger Sammlung zeigt dies deutlich.

Er ist in der Mitte horizontal gebrochen. Die Bruchfläche zeigt den Pflanzenkelchdurchschnitt. Die Eden legen sich in die Spiken des Kelches.

Die Kelchblätter selbst sind in Glimmer verwandelt.

Pinit. Taf. XXX. Fig. 15. 16.

Soviel Pflanzen, soviel Säulen. (Wahrscheinlich dasselbe Gesetz beim Turmalin, überhaupt bei der Säulenform.)

Auf der unteren Endfläche der Säule ein Zäpfchen (Wurzelselle), auf der oberen Endfläche ebenso.

Auf jeder Säulenfläche eine Pflanze.

Smaragd, Beryll. Ebenso. Tafel XXX. Fig. 13.

Rupferglanz. Fig. 2.

Mehrere Crystalle an einander gewachsen nach dem Gesetz der Zellbildung.

Die oberste grösste ein Kelch mit eingeschriebenen Linien.

Die "dendritische" Form der Metalle wahrscheinlich Pflanzen» Grundform.

In einem Meteorstein eine Pflanze in Rickel verwandelt.

Diamant.

Relchauffüllung: schliest Brugellen ein.

20 Schluff

Ich glaube, man kann drei Zeitalter der Erde annehmen, das Alter des Siliciums (der Rieselerde), das des Aluminiums (des Thons), das des Calciums (des Ralks).

Solange der grösste Teil des Lebens unter Wasser war, mussten natürlich die Lebensvorgänge auch andere sein, als heute, wo die meisten Pflanzen-Arten wenigstens Luftpflanzen sind, und auf einer Erde sich nähren, welche in keiner Weise ebenso gedacht werden kann, wie die Erdobersläche vor der ersten Pflanzenentwicklung.

In den Granitpflanzen scheint die Umwandlung die gewesen zu sein, dass auf der todten Pflanze die Stosse ausschieden, welche in Gas, oder in Wasser-Lösung sich überführen liessen und dass dann (vielleicht erst zur Gneißeit) das Wasser seine in Lösung befindlichen Silicate etc. in den Zellen absetze.

Mit Rücksicht hierauf habe ich auch die schwarze Farbe der darauf folgenden Thonschiefer, welcher meist von Rohlen herrührt, ferner die mächtigen Graphit- und Anthrazitlager im Granit und Gneif und die Steinkohlenschichten selbst erklärt.

Nach F. v. Hochstetter hat der Urfalf von Böhmen bituminösen Geruch!

Es wäre in der Tat merkwürdig, dass von den Tangen, welche nach anderer Meinung 50 M. mächtige Rohlenschichten hinterlassen konnten, nicht Eine Pflanze erhalten ist.

Sind die Tange im Silur erhalten, so müssen sie noch viel mehr im Rohlengebirge sich ausfinden lassen, vorausgesetzt, dass sie da sind.

Man findet aber dort eben keine Tange mehr, sondern blos den geschichteten Rohlenstoff.

Wenn man genau untersucht, ist der Rohlensandstein ebenfalls ein Pflanzen-Lager, das aber nicht hinreicht, um die Rohlenslöze zu erklären und desshalb erkläre ich letztere auf dem von der Granitpflanze ausgeschiedenen Rohlenstoff. Diese Pflanzen sind richtige Tange. Rommen ja solche Rohlenslöze nach Mohr schon im Porphyr vor, der nach meiner Deutung nichts ist, als der erste wahre Schlamm dieser Erde mit eingebetteten lebenden Pflanzen.

Wenn Meteorsteine als Pflanzen, oder wenigstens die Pflanzen im Meteorstein nachgewiesen sind, so könnte das erste Leben unserer Erde auch von einem anderen Planeten auf die Erde übertragen worden sein.

Schöner als im Graphit von Piemont (die Etikette hat in Klamsmer Passau?) habe ich die Pflanzen-Zellen nicht gesehen. Sie sind wahrscheinlich in Feldspat erhalten. Der Graphit selbst aber ist auch eine Pflanze, und nicht etwa Magma, in welchem die FeldspatsPflanze liegt.

Ist dies vielleicht nicht der Anfang von Pflanzen der heutigen chemischen Zusammensetzung?

Diese Frage soll eine offene sein.

Man lese F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, J. Band, über Graphit Seite 352, über Anthracit Seite 355 und vergleiche das dort Gesagte mit dem Ergebniss meiner Untersuchung, so wird sich das Geheimniss der Anthracitslöze im Granit und Gneis lösen. Zirkel ist, wie ich, der Ansicht, dass sich die Färbung der jüngeren Gesteine durch Anthracit erkläre.

Woher sollen diese Anthracit-Lager kommen, wenn der Granit nicht Pflanzen enthält, oder Pflanze war?

Ich halte wenigstens dafür, dass es keine einfachere Erklärung für ihr Entstehen giebt.

Ich must noch einmal auf die Verschiedenheit der Gesteine, welsche man Serpentin nennt, hier zurücktommen. In dem canadischen Gneisserpentin ist das ursprüngliche Mineral wahrscheinlich Olivin oder Augit. Die Lager von Serpentin sind sicher Auslaugunsgen, Niederschläge aus wässeriger Lösung. Pikrolith etc. sind ebenso unzweiselhaft wässerige Niederschläge, während in dem Serpentin von Snarum noch die Gestalt des Olivins sich erhalten hat, was Quenstedt so überzeugend nachwies. Freilich mag jener Olivin schon Pflanzen eingeschlossen haben und daher die eigenthümliche Textur.

Der Umstand, dass unkundige Leute alle grünen durchsichtigen talkerde» und kieselerdehaltigen Minerale Serpentin nannten, kann natürlich zu nichts weiterem führen, als dass man die Serpentine nunmehr genauer untersucht und unterscheidet. Vergl. über Ser» pentin v. Draschke in Tschermak Mineralogische Mitteilungen J. 1871. S. 1. Rennt man die Form der Urpflanze, so wird es leicht sein, die ursprünglichen Serpentine und die abgeleiteten zu unterscheiden.

Man hat den Pflanzen überhaupt noch sehr wenig Aufmertsamkeit geschenkt. Noch in den 50 ger Jahren sprach man kaum von Pflanzen (Algen) in dem obern Übergangsgebirge. Erst im Rohlengebirge waren sie wirklich anerkannt.

Wer sich mit dem Gegenstand, welchen ich vorgelegt habe, beschäftigen. will, muss zuerst das Silur genauer ansehen und sich hier

davon überzeugen, dass die Form, welche ich schon im Laurentian nachgewiesen habe, im Silur millionenfach vorkommt. Der Riesensorm im Marmor von Carrara habe ich schon erwähnt. Man muss mit Einem Wort sich mit dem Gegenstand erst vertraut machen. Oldhamia antiqua ist schon ein gutes Object für die Studien.

Hat man aber die Form dieser Urpflanze einmal festgestellt, so wird es ein Leichtes sein, sie in den früheren Formationen zu erkennen.

Ich möchte die Forscher dort hauptsächlich auf die besser erhaltenen Bruzellen und darauf aufmerksam machen, dass die Zellsscheidewände stets durch schwarze Punkte, nämlich zurückgebliebene Rohlen, manchmal sogar durch Rohlensäure-Einschlüsse angedeutet sind. Nimmt man den Polarisationsapparat zu Silfe, so wird jede Zelle, welche so abgegränzt ist, auch verschieden polarisiren, weil die Lage des Gesteins in jeder Zelle eine verschiedene ist.

Freilich das gebe ich zu, dass ein Teil des Pflanzen-Gesteins in Folge späterer Vorgänge auch unkenntlich wird. Ein zersetzter Granit kann nie als Untersuchungs-Material verwendet werden.

Der gelbbraune "Alabaster", welcher von den Italienern in Vasen, Statuetten in den Handel gebracht wird, ist eine Pflanze. Unser Reuper, Muschelkalkapps ist es.

Ich erstaunte, als ich den Einwurf hören musste: "Wie aus den Bestandteilen einer Pflanze: Rohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, in den Relchen Rieselerde, Thonerde, Ralk, Vittererde, Eisenornd entstehe?" Als ob dies die Frage wäre.

Einmal sind die Bestandteile keiner Pflanze blos Rohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff: das Knochengerüste von Riesel, Ralk, die Aschenbestandteile sind vergessen, vergessen sind die Riesels Stelette der Diatomaceen, die Rieselzellen der Equiseten etc. Hier wird sicher nicht aus Rohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff Rieselserde, sondern die Rieselerde ist durch die Pflanze hindurchgegangen, von der Pflanze abgelagert.

Man vergleiche Rägeli und Schwendener, das Microscop (1877) S. 488.

Nun glaube ich aber eben mit der Serpentinpflanze nachgeswiesen zu haben, dass sogar an die Stelle der Urpflanze, mag sie bestanden haben, aus was sie will, ein BittererdesSilicat tresten kann. Dass aber Pflanzen aus der Granikeit anders organisist waren, als die der Jekkeit, versteht sich von selbst und waren sie anders, so waren natürlich auch ihre Ausscheidungen anders als heute.

Übrigens scheiden viele Pflanzen heute noch vorzugsweise Rieselserde in den Fruchtschalen, Samenhülsen auf.

Was die "Ausscheidungen" betrifft, so erinnere ich an die verschiedensten Minerale in den Ammonitenkammern, welche dort und nur dort vorkommen. Sind sie von den Ammoniten ausgeschieden? Gewiss nicht. Es ist also das Wort "Ausscheidung" cum grano salis zu verstehen. Das Mineral liegt da: Welches der Zusammenhang mit der Pflanze ist, ist noch nicht — aber dass ein Zusammenhang besteht, ist seitgestellt. Reinenfalls kann die Tatsache, dass Granat an der Stelle von Pflanzenkelchen vorkommt, als Gegenbeweis das gegen dienen, dass kein Pflanzenkelch da ist. Ist die Pflanze einmal sestzgestellt, so sehe die Wissenschaft eben, wie sie die Tatsache erklären kann.

Freilich bei unf fängt man nicht mit dem Auge an, sondern mit der Rechnung. Statt zu sehen, zu betrachten, zu versuchen, macht man sich auf seinem beschränkten Wissen die Rechnung fertig. Wenn es nun aber doch so ist? Wenn eine unbefangene nur halbwegs sorgfältige Beobachtung die Tatsache bestätigt, was dann?

Der scharffinnige Arago (und ef sind nicht einmal alle Leute, welche absprechende Behauptungen aufstellen, scharfsinnig) bewies vor den Augen und Ohren von ganz Frankreich, dass eine Eissenbahn unmöglich seie. Es hat Jahrhunderte angestanden, bis gesgen die Behauptungen aller Fachgelehrten die Versteinerungen als Tier-Reste anerkannt wurden.

Die feinen Linien im Granit mit schwarzen Punkten gezogen, kann man unmöglich auf blossen Crystallen erklären, sie können also nicht blos die Peripherie eines Minerals andeuten. Aber auch zufällige Linien sind sie nicht. Es herrscht ein Geset darin und dieses Geset ist die Form der Pflanze: nur die einzelnen Zellen haben die Form des Crystalls, sind aber keine vollkommenen Crystalle.

Erst am Schlusse der Arbeit, gestattete ich mir einen Blick auf die Pflanzenarten zu thun.

Ich fasse die äussere Structur des Gesteins ins Auge, welche durch die Pflanze, aus welcher es sich zusammensetzt, bedingt ist.

Insbesondere zwei geschlissene Granite von Kullgren Uddevalla in Schweden ("Granit of flera sorter", wie er im Handel heisst) machen mich darauf aufmerksam, dass die Pflanzensorm des Granits auch die von Flechten sein könnte. Es sind kurze Kelchzellen, welche senkrecht oder neben einander stehend, das Gestein bilden (Cladonia?).

Erst im Gneif findet sich horizontale Lagerung des Gesteins bestingt durch lange Pflanzen, welche nun mehr den See-Algen ähnlich sind.


Ich ziehe auf der Gesteins-Structur der Granit-Pflanze den Schluss, dass die Erdoberfläche zur Granikeit nicht unter Wasser, sondern erst von Dampf umgeben war. Die Pflanzen des Granits wären dann Landpflanzen. Im Wasser würden die Pflanzen-Schichten sofort in horizontalen Lagern sich angesett haben.


Die Flechten scheinen mir überhaupt die erste Pflanzenform zu sein, welche unmittelbar auf Mineralsubstanz entstehen.

Erst im Gneis-Alter der Erde finden sich die ächten Wasserpflanzen, in Wasser abgelagerte Pflanzen.


Mit der Structur der Pflanzen hängt die Form der heutigen Gebirge (Pflanzenberge) zusammen.

Man sieht, wie schwer es ist, von angewöhnten hergebrachten Vorstellungen sich loßumachen und mit unparteiischen Augen zu sehen.







3: **E**afel 3




4: **Eafel** 4





5: **E**afel 5








7: **Eafel** 7














12: **E**afel 12




13: **E**afel 13



14: **E**afel 14





16: **Eafel** 16





17: **E**afel 17





19: **E**afel 19







21: **E**afel 21



22: **E**afel 22







25: **E**afel 25

