Die Urzelle

Nebst dem Zeweif
dass
dass
Granit, Gneis, Serpentin, Talk, Gewisse
Sandsteine, auch Zasalt, endlich
Meteorstein und Meteoreisen aus Pflanzen
Zestehen:
die Entwicklungslehre durch
Tatsachen neu Zegründet

von Dr. Otto Zahn

mit 30 Lithographirten Tafeln

Ist Kbition, Tübingen 1879 3. Laupp'schen Buchhandlung

Internet Archive Online Edition Attribution NonCommercial Share Alike 4.0 International

Inhaltsverzeichnis

| Ţ | | | 7 |
|----|---------------|----------------------------------|------|
| | 1.1 | Geschichte einer Entdeckung | . 7 |
| | 1.2 | Die Lagerung des Cophyllum-Kalks | . II |
| | 1.3 | Waf ist Cophyllum? | . 14 |
| | 1.4 | Das Cozoon | . J7 |
| | 1.5 | Die Pflanze | . 22 |
| | 1.6 | Eophyllum canadense | . 25 |
| | 1.7 | Die Formen | . 27 |
| | 1.8 | Dí Urten | . 28 |
| | 1.9 | Überblick | . 33 |
| | 1.10 | Ergebnisse | . 37 |
| 2 | Das e | erste Cier | 40 |
| 3 | Serp | entín | 44 |
| 4 | Was | ist der Laurentian Gneis: | 47 |
| 5 | Glím | mer | 50 |
| 6 | Daf . | "Urgebirge" | 51 |
| 7 | Line | Gesteinslehre | 59 |
| 8 | Carro | ararifder Marmor | 66 |
| 9 | Mach | trag | 67 |
| 10 | B afal | lt | 68 |
| IJ | Felds | path | 69 |
| 12 | Sílu | r | 7J |
| 13 | Rückl | blict | 74 |
| 14 | Die 1 | Ergebnisse dieser Entdeckungen | 80 |
| 15 | Sans | offeine | 85 |

| 16 | Meteorstein | 87 |
|------------|---|-----|
| J 7 | Meteoreisen | 9, |
| 18 | Die Urzelle — Crystall-Pflanze — das Tier | 93 |
| 19 | Der Krystall | 98 |
| 20 | Schluff | JO. |

Abbildungsverzeichnis

| 1 | Tafel I. | | | • | • | | | | | | • | • | | | • | | • | • | • | • | | | • | | | | 109 |
|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|
| 2 | Tafel 2 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 |
| 3 | Tafel 3 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 |
| 4 | Tafel 4 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 |
| 5 | Tafel 5 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 |
| 6 | Tafel 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 |
| 7 | Tafel 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 |
| 8 | Tafel 8 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 |
| 9 | Tafel 9 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 |
| 10 | Tafel 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 |
| 11 | Tafel II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 |
| 12 | Tafel 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 13 | Tafel 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 |
| 14 | Tafel 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 |
| 15 | Tafel 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 |
| 16 | Tafel 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 |
| 17 | Tafel 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 |
| 18 | Tafel 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 |
| 19 | Tafel 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 |
| 20 | Tafel 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 |
| 21 | Tafel 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 |
| 22 | Tafel 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| 23 | Tafel 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 |
| 24 | Tafel 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 |
| 25 | Tafel 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 |
| 26 | Tafel 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 |
| 27 | Tafel 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| 28 | Tafel 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 |
| 29 | Tafel 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| 30 | Tafel 30 | - | • | | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | - | • | | - | • | - | • | • | - | • | | | 138 |

Vorrede

Es gibt wohl keine Wissenschaft, welche nicht und zwar gerade da, wo sie es am wenigsten wünscht, weiße Blätter in ihrem goldenen Buche aufzuweisen hätte.

In der Geologie war die Frage über die Entstehung und Bildung unserer Erdoberfläche eine vielbesprochene und man redete sich manchmal ein, eine gelöste.

Aber man musste sich dann, wenn man ehrlich sein wollte, doch gestehen, dass eben erakte Beweise für den einen oder andern behaupteten Zergang sehlten.

Dies tras vorzunsweise beim Urgebirge zu — kehrte aber auch beim flöz und am bedenklichsten bei den älteren "vulkanischen Gesteinen" wieder. Wohl mühten sich Männer der Wissenschaft ab, ihre Zehauptungen über die "Entstehung" des Urgebirgs zur Geltung zu bringen. Zeweise lagen vor, aber kein einziger, welcher durchsschlug.

Einen solchen glaube ich jetzt geliefert zu haben.

Die "Entstehung" der ganzen heutigen Erdoberfläche mit Aufnahme der heute noch sich bildenden vulkanischen Gebirge und auch bei diesen hat das Wasser — zum mindesten einen mechanischen, ich glaube aber auch chemischen Anteil, — ich sage die "Entstehung des Urgebirgs" ohne alle Feuerwirkung ist durch die vorgelegten Tatsachen erwiesen, und zwar so voll als überhaupt etwas zu beweissen denkbar ist. Möglich ist es freilich, auch diesen Beweis

eine Weile anzuzweifeln. Allein ich bin sicher, der Widerspruch wird bald verstummen, denn wo man etwas millionenfach sehen kann, da kann ein Zweisel nicht mehr bestehen. Ein gewöhnliches Mikroskop, eine gute Lupe genügt vollständig, sich zu überzeugen.

So kann ich denn meine Arbeit ruhig in die Welt senden. Ihr Erfoly, die Anerkennung der Tatsachen und ihrer Deutung, macht mir keine Sorge.

Allerdings werden die Botaniker nicht ungestraft in ihre Wissenschaft mich haben einbrechen lassen.

Mögen sie die Zauptsache ins Auge fassen.

Was die Zedeutung meiner Entdeckungen betrifft, so wird mir billig Niemand zumuten, sie nicht zu kennen und zu verstehen. Die bisherige Wissenschaft der Geologie ist mit Einem Schlage zum dritten Teile antiquiert. Ja ich darf es aussprechen, es ist nun erst ein Grund darin gelegt.

Durch meine Entdeckung der Pflanze im Meteorstein von Knyahinya war mir ein Blick in die Sphären def Zimmelf gestattet. Was dem stolzen Fernrohr nicht, das war dem stillen, bescheidenen Mikroskop vergönnt.

Zier drängt es mich den Dank gegen Gott außuspreschen, der eine sahrelange Arbeit, für welche ich die Zeit neben meinem anstrengenden Berufe als Rechtsanwalt nur in den Stunden der Erholung sinden konnte, mit einem Erfolg gelohnt hat.

Ulles hat seine Zeit, auch die Entdeckungen haben sie. Wer sie macht, ist zuletzt gleichgiltig.

Ferner habe ich hier noch öffentlich Dank zu sagen der hochgeehrten Naturwissenschaftlichen Fakultät in Tübingen, welche meine erste Arbeit über das Cozoon canadense mit der Doktor-Würde honoris causa belohnt hat. Sie hat mir durch diese Anerkennung den Weg der Arbeit erleichtert und mich aufgefordert, der hohen Ehre mich würdig zu zeigen.

Es möge mir gestattet sein, meinen Genossen in der Wissenschaft und auf dem Wege der Forschung noch dringend auf Zerz zu legen, setzt auf dem aufgeschlossenen Wege besonnen vorzugehen.

Ich muss die Arbeit in andere Zände legen, das weiß ich.

Wer sie aufnimmt, der setze sich vor, sahrelang zu beobachten und zu sammeln, ehe er die Welt mit einer Zypothese belästigt, welche doch meist nur eine Zehauptung über das Mögliche ist. Line Tatsache sestgestellt, sestgestellt wie es ist, ist mehr wert, als zehn Zypothesen, wie es gegangen sein könnte.

Die Zeichnungen sind alle von mir entworfen, teilweise ausgeführt und auf Stein gezeichnet.

Eine besondere Erklärung zu den Siguren hielt ich nicht für notwendig, da der Text sehr kurz ist.

Reutlingen, August 1879

Dr. Otto Jahn, Rechtsunwalt.

1.1 Geschichte einer Entdeckung¹

Sir W. Logan in Montreal war ef, welcher zuerst die Aufmerksamkeit auf einen im Laurentian-Gneis von Canada eingelagerten Serpentin-Kalk lenkte, indem er dabei die Vermutung aussprach, ef enthalte dieser Kalk und zwar in eingebetteten "Knollen" die Reste der ersten organischen Schöpfung.

Dr. W. Dawson in Montreal, Kanzler des M'Gill College dort, nahm sich der Sache weiter an und bestimmte in Verbindung mit Dr. Zunt in Montreal und Dr. W. Carpenter in London, dem berühmtesten Mistrostopiker Englands, die Natur sener Knollen dahin, sie seien die versteinerten Reste einer Riesen-Joraminisere, die dem Genus Nummulina ähnlich sei. Dr. Dawson nannte dieselbe Eozoon canadense. Unter diesem Namen wurde sie dann auch zur großen Freude Aller auf das erste noch ganz weiß gelassene Blatt der Naturgeschichte eingetragen. Allerdings wurde der Lintrag angesochten. Alsbald erhoben sich bedeutende Stimmen gegen die organische Natur des Gesteins. Die Schriften über Eozoon schwollen dermaßen an, dass man sagen dars: das Lozoon bat seine eigene Literatur.

Ich selbst beteiligte mich spät erst an dem Kampfe und

¹Ich nenne das Kapitel "Geschichte einer Entdeckung": muss aber auf II. verweisen als Fortsetzung dieses Kapitels. Spätere Entdeckungen konnte ich nicht mehr hier aufführen.

plaubte in einem Auffätze über Lozoon canadense in den Württembergischen naturwissenschaftlichen Jahresbesten den Beweis gegen die organische Natur geführt zu haben. Carl Möbius ergänzte denselben durch Abbildungen, insbesondere von lebenden Foraminiseren.

Ich werde am Schluss dieser Abhandlung noch über die Frage, warum das Eozoon canadense kein Tier sein kann, mich verbreiten.

Bei diesem Streit war das Misslichste der Manyel an Material. Von Canada war so gut wie nichts zu bekommen, im Zandel vollends nichts.

Die Stücke, welche gelehrte Freunde mir schenkten, waren dünn geschnittene Plättchen einer ganz bestimmten form, nämlich der "lamellaren" des Gesteins.

Möbius allerdings war glücklicher.

Ihm stellten Dr. Dawson und Carpenter neben Zandstücken ihre besten Schliffe zur Verfügung.

freilich schließt diese besondere Güte zugleich eine große Gefahr in sich, weil man nur das zu sehen bekommt, was der Gegner als Beweisstück verwerten will. —

So lay die Sache. Ich war von der unorganischen Natur des Cozoongesteins überzeugt, davon wenigstens, dass ef ein Tier nicht sei.

Einzig die feinen "Kanal-Systeme", wie sie Dr. Carpenter nannte, ließen mir keine Ruhe. Die Unruhe wurde wesentlich verschärft durch den Gedanken, welcher sich mir immer wieder aufdrängte: "der Gniess ist ein durch Wasser gebildetes also Sedimentgestein: seine Kalklager müssen die ersten organischen Einschlüsse enthalten, denn mit dem Silur kann das Leben nicht anfangen."

Letzteres war Zypothese, aber eine Zypothese wie viele, Gedanken, von welchen man sich nicht mehr losmachen kann: denn sie sind eben wahr.

Da fügte sich's, dass ich auf eine Linkadung der Resgierung von Canada eine Reise dorthin zu machen hatte. Dr. Dawson wurde besucht, mein nächster Gang war nach Côte St. Pierre (Petite Nation). Dort sah ich die Schichtenkagerung und setzte mich in den Besitz einer großen Anzahl von Lozoonkalks und Lozoonstücken.

Mach meiner Kückreise untersuchte ich das Material.

Das Ergebnis lege ich vor. Es besteht darin: dass der Kalk des Laurentian-Gneises von Canada, der ältesten Sedimentschichte unserer Erde, eine Pflanzenschöpfung enthält, angehörend der Familie der Algen.

Es sind bis setzt wenige neue, von den lebenden verschiedene Urten sestgestellt. Dass es aber bei sortgesetzter Untersuchung in kurzer Zeit mehr werden, davon bin ich überzeugt.

Die Pflanzen sind alle in dem wirklichen "Cozoongestein", welches ich von nun an Cophyllumkalk nenne, eingeschlossen von mir gefunden worden.

Ich bemerke nämlich hier sofort, worauf auch mein verehrter Freund Dr. Dawson aufmerksam machte: Not

all if Cozoon!

Unfangs allerdings wurde zwischen Gozoongestein und den Knollen nicht unterschieden.

Manches Wort wäre nicht geschrieben worden, wenn man über das Gestein selbst einig gewesen wäre.

1.2 Die Lagerung des Cophyllum-Kalks

Wir verdanken dem Geological Survey of Canada unter der Leitung (früher Sir Willam Logans nun) des Zerrn Dr. Selvyn die geologische Beschreibung und eine sehr schöne geologische Karte von Canada, serner seit 10 Jahren sortlausende in englischer wie französischer Sprache erscheinende jährliche Berichte. Das Verdienst Sir Willams ist es auch, die Laurentian-Sormation als solche auf dem Granit auflagernd sestgestellt zu haben. Diese Sormation, also die älteste, soll nach Sir Logans Seststellung 30,000 Suß mächtig sein.

Große Züge des Laurentian-Gneises erstrecken sich von Süden nach Norden streichend über nanz Canada.

Das einmal führt er Orthoklas das andermal Unorthits Feldspat.

In letzterem Gneis sind die Kalkschichten eingebettet, welche wieder die Lophyllumschichten enthalten.

Der Kalk wird in der "Geologie von Canada" Krisstalline Limestone genannt.

Er may bei Côte St. Pierre 100 M. mächtig sein.

Das den Kalk umhüllende Gestein ist Diorit und dies ser ist in dem Gneis eingelagert, welcher hier vorzugsweise von Zornblende und Glimmer gebildet wird. Der Glims mer ist Biotit.

Ich füge hier bei, dass dieselben Kalkschichten eine Reibe von Mineralien und zwar in großer Menge Apatit, Glimmer und Augit enthalten.

Sodann kommen vor Datolit, Scapolit, Salit, Spinell, und sehr schöne Zirkon.

Im mächtigen Kalke liegen Schichten von Dolomit und Augit, über diesen eine Lage von edlem Serpentin (Ophit) mit Chrysotiladern und nun folgen wechsellagernd die Serpentin- und Kalklamellen und Schichten, welche als "Kozoon" angesprochen werden.

Die erste Kalklamelle ist im Durchschnitt etwa 50 mm., die zweite etwa 30 mm. ef folgen sich 5-6 immer kleiner und dann geht das Gestein in eine körnige (acervuline) Form über.

In diesen Serpentin-Kalkschichten, aber auch auf Gneis oder Dolomit aufgelagert, sinden sich "Knollen", d. h. rundliche Gesteinsstücke, welche eine gewisse Regelmäßigkeit der Korm zeigen.

Es sind Serpentinlamellen, welche von einem Mittelpunkt ausgehend sich dann verjüngend nach der Seite verbreiten.

Die beste Abbildung, die ich kenne, ist in Dawson's Lise's Dawn on Earth, London 1875 zu S. 168 in Maturselbstdruck und daher unsehlbar treu.

Unbegreiflich ist, dass man beim Anblick dieser Form nicht sofort an eine Pflanze dachte.

Es erklärt sich nur daraus, dass man von Ansany an, da man solche Stücke nicht hatte, einmal in den Gedanken einer Foraminisere vertieft, davon nicht mehr loskam, während die Gegner (worunter auch ich) im Kampf gesen die Foraminisere auch an nichts weiter dachten, als daran: kein Tier, — also Mineral. Die Abbildungen des Cozoon-Gesteins sind nach Stücken gemacht, welche einfach in Platten geschnitten sind. So auch die Abbildungen von Prosessor Dr. Zittel in der Paläontologie: doch es soll hier nicht vorgegriffen werden.

Die Cophyllumschichte ist etwa 50 Cm. mächtig: Auf den körnigen Formen geht das Gestein wieder über in die geschichtete. Es folgen sich Serpentin und Dolomit und dann lagert sich wieder mächtiger Kalk auf.

Der Serpentin ist überall ein wirkliches Lagergestein. Er ist durchsichtig, grün, gelb, wo er der Luft ausgesetzt ist, wird er rötlich.

Die Schichten von Serpentin, wie die von Dolomit um den Cophyllum-Kalk und der Cophyllumkalk selbst sind je 30-50 Cm. mächtig. Die Cophyllumschichte hat nicht ein horizontales Lager und eine solche Decke, sondern beide sind uneben, rundlich, zuweilen in allen Curvenlinien ausgezacht. Das Cophyllum-Gestein — weggedacht aus seinem Lager, würde eine unregelmäßige Söhlung ähnlich unseren Tropssteinhöhlen übrig bleiben.

Die Cophyllumschichte selbst schließt Brocken Dolomit ein, um welche sich das breite Serpentinband und dann erst der Cophyllumkalk wieder layert.

1.3 Was ift Cophyllum?

Ich fand die Korm, welche ich zuerst Cophyllum nannte, in einem "Cozoonstück" in dem ersten weißen Kalkbande, das auf der Serpentinschichte lagert, also zwischen zwei Serpentinbändern.

Erst setzt kam mir der Gedanke: Sind denn nicht die ganzen "Cozoon-Knollen" auch Pflanzen?

Diese Frage musste ich besahen, nachdem ich durch Behandlung des Kalks mit Salzsäure größere Lamellen, welche in Verbindung mit den Serpentinbändern stehen, bloßgelegt hatte. Die Formen sind so konstante, stets wiederkehrende, dass sie anders nicht erklärt werden können.

Damit war natürlich auch der beste Gegenbeweis gegen ein Tier gewonnen. Denn die entdeckten Algenarten sinden sich auch heute nie in Steinen oder Muschelschalen.

Die Pflanzen gehören alle der Familie der Algen an. Sie sind entweder unmittelbar auf Dolomit und Gneis aufgelagert oder in dem eigentlichen Kophyllumkalk d. h. der Schichte von Serpentinkalk zwischen den großen Dolomit und Serpentinschichten.

Aber nicht bloß im Kalk dieser Schichten sinden sie sich, sondern auch im Serpentin derselben.

Keine oder wenige Pflanzen finden sich in den großen Serpentinschichten, welche den Lophyllumkalk umgeben, wenigstens nicht in der untersten.

Diese Serpentinlagen im Lophyllumkalk eignen sich vermöge ihrer Durchsichtigkeit vorzüglich zu Beobachtungen: die seinsten Struktur-Verhältnisse lassen sich hier in Korm der zartesten Linien wahrnehmen.

Allerdings gehört ein scharfes Auge dazu, um nicht die Linien, welche der Serpentin immer bildet, mit den Zellwänden zu verwechseln. Diese Eigenschaft des Serpentins war wohl die Ursache, warum es 19 Jahre anstand, bis die ältesten aber beste erhaltenen Pflanzenreste entdeckt wurden.

Im Serpentin sinden sich füllmassen zerstörter Zellen in Dolomit verwandelt. Un der Zand derselben braucht man nur senkrecht nach dem Kalkband hinabzusteigen und man wird die seichnung einer Pflanze sinden.

Die gefundenen Pflanzen sind teils mit bloßen Ausgen, teils nur mikroskopisch sichtbar und zwar bis zu den kleinsten denkbaren Größen. Sie sind in ein Silicat verswandelt, also durch Behandlung des Kalks mit Säure bloßzulegen.

Da erscheinen die in Kalk eingelagerten Pflanzen als blendend weisse Stengel, Kelche, Blätter. In Dünnschliff freilich sehen sie bei durchfallendem Licht gelbbraun aus, was Möbius veranlasste ihre Farbe als hellbraun zu beschreiben. Dies ist bloß Folge der Lichtberechnung in der opaken Masse. Welches Mineral die Füllmasse bildet, ist zweiselhaft. Mann nannte es Flocculit.

Die füllmasse der Pflanzen im Serpentin ist wieder

Serpentin, doch finden sich darin, wie oben gesagt, die Modelle von Pflanzen von Dolomit. Die Füllmasse der Pflanzen im Kalk ist meist ebenfalls ein Silicat.

Meine Aufgabe ist nun die Darstellung.

Diese kann nur durch Abbildungen erreicht werden.

In der Unterscheidung der Arten habe ich die Fortspflanzungsorgane, soweit erkennbar, zu Grunde gelegt.

Obyleich es nun möglich wäre, für die gefundenen Pflanzen analoge Bildungen unter den lebenden oder sossillen zu sinden, so musste ich, wenn ich meine Entdeckung schnell zum Gemeingut der Wissenschaft und zur Grundlage fernerer Forschung machen wollte, doch den andern Weg einschlagen, und ohne Rücksicht auf diese bestimmen.

Ein System lässt sich mit dem vorhandenen Material doch nicht begründen. Ich bin überhaupt kein Freund von Systemen und halte die Zeit für Ausstellung solcher auch noch nicht für gekommen. Wir sind noch in der Zeit der Saat und nicht der Ernte in der Naturwissenschaft.

Ehe ich aber auf die Beschreibung der Pflanzen übergehe, will ich noch einmal einen Blick auf das Cozoon werfen.

1.4 Das Cozoon

Die Behauptung, dass die "Cozoon"-Kormen einer Koraminisere angehören, fällt in sich zusammen mit dem Beweis, dass die Kormen Pflanzen sind. Koraminisere und Pflanze schließen sich aus.

Meine neuesten Untersuchungen aber haben, wenn sie auch einzelne frühere Behauptungen modisizieren, die Beweissätze der Gegner für eine Foraminisere vollständig entkräftet.

Dazu gehört vor Allem der wahre Sachverhalt bezüglich der "Kanalspsteme". Auf diese hat man das größte Gewicht gelegt. Sie bildeten das Schlussglied in der Beweiskette.

Zier aber verhalten sich die Tatsachen setzt vollkommen anders, und es ist unbegreislich, wie Dr. Carpenter diese Kanalsysteme in das Schema des Cozoon aufnehmen konnte.

Diese Kanalspsteme sind einmal, wie ich Taf. III. zeige, sehr verschieden. Wäre das Gozoon eine Foraminisere, so wäre es gar nicht denkbar, dass in — zugestandenermaßen ein und derselben Foraminisere ein Kanal becherförmig, ein anderer sadensörmig, ein dritter perlschnurartig gereiht wäre.

Sodann sinden sich, wie Möbius dargestellt hat, bei der lebenden Foraminisere bloß sadensörmige Kanalsystesme.

Becher, Kugel und Perlschnur formen kommen gar nicht vor. Die Fadenformen habe ich in etwa 20 Dünnschliffen bloß einmal (Taf. III. Sig. 3) gefunden, überall herrscht die Becher- form vor. Aber auch, wo die Fadenform vorkommt, gehen die "Kanäle" von Zweigen auf, was verschwiegen wurde.

Waf aber endlich den Ausschlan gibt, ist, dass diese Kanalspsteme bloß an ganz vereinzelten Stellen vorkommen, ohne dass man irgend einen Grund hätte, anzunehmen, dieses Fehlen habe seine Ursache in der Metamorphose des Gesteins oder in einer anderen solchen Ursache. Dies ist längst hervorgehoben worden.

All dies konnte nur solange angehen, als man nicht über Material genug verfügte. Dünnschlisse sind in vielen, sehr vielen Beziehungen unentbehrlich aber sie ersetzen nicht die Gesamt-Anschauung. Und ferner ist notwendig eine Untersuchung der ganzen Lagerung, insbesondere des die Knollen umgebenden Gesteins.

Damit wäre es sedem halbwegs Geübten leicht gewesen, sich sosort ein Urteil zu bilden und es wäre wohl nicht zu Gunsten der Foraminisere ausgefallen.

Dass die "Schale" größtenteils sehlt, kann ich aus meisner Unschauung versichern dieser "proper wall" soweit er nicht auf optischer Täuschung beruht, sindet sich an seltenen Stellen bloß angedeutet: ebenfalls ohne dass man für das Fehlen desselben die Schuld auf Zerstörung schiesben könnte: denn die seinsten "Kanalsysteme" unmittelbar

daneben sind ja erhalten.

Dass die Tubuli überall Chrysotil sind, bedarf keiner weiteren Aussührung mehr.

So bleiben von dem "Tier" bloß die Kammern übrig.

Diese aber sind wie aller Serpentin. Allerdings die reihenförmige Lage der Körner wäre auffallend. Das Merkmal der Kammer nun wäre die einzige Beweis-Tatsache: sie ist für sich allein nach dem Jugeständnis der Gegner selbst nicht hinreichend, um eine Foraminisere sestzustellen.

Ich gieng bei meiner Untersuchung von dem Bild Tafel IV. und V. aus.

Nachdem mir durch dieses Bild die Pflanze unwiderleglich sestgestellt und so ein Bild der Pflanze des Laurentiangneises gegeben war: konnte es nicht schwer sein, die Kanalsysteme der "Kozoonknollen" überhaupt zu deuten. Sie lösten sich alle in Pflanzen auf.

Sodann bildete dieselbe Form auch den Schlüssel zur Lösung des ganzen Gesteins.

Sobald die Form des Cophyllum einmal als Pflanze feststand, so wurde es wahrscheinlich, dass auch die großen Serpentin-Kammern nichts als die Füllmassen ehemaliger Pflanzensormen seien.

Der Beweis wurde ergänzt mit Durchschnitten größester Stücke, wo eine Anzahl Pflanzen alle und immer in Einem Ausgangspunkt zusammenlausen.

Man sehe doch einmal den Naturselbstdruck des Cozoson in Dawson's "Lise's Dawn on Earth"! Man denke

sich das Bild nach der anderen Seite ergänzt. Freilich in 4 eckin willkürlich herausgesänten kleinen Stücken war die Pflanzensorm nicht leicht zu erkennen. Man nehme nun ferner ein I/2 Meter großes Stück Lagergestein und man sieht dort von etwa 3 zu 3 Cmetern auf dem Serpentin die Formen der "Kanalsysteme", hier im Großen von Serpentin nachgebildet: man wird ferner die Wurzelansätze an der Gränze der Serpentin und Dolomitzschichte sinden. Endlich sind nicht nur die Zellhäute erzhalten, sondern die Prothallien dem Zundert nach im Kalk und im Serpentin!

Wenn man das Gestein genau untersucht, so sindet man die Formen schon mit blokem Auge.

Blos eine Eryänzung dieses Beweises ist es, dass dieselben Pflanzenformen in den Dolomit und Kalk-Layern vorkommen, im Kalk in Serpentin, aber auch in Glimmer verwandelt sind. Diese Glimmerpflanzen sind das Schönste, was man sehen kann.

Aun muss ich aber noch auf einen Umstand aufmerksam machen, darauf nämlich, dass der Serpentin in den Stücken, welche Gozoon sein sollten, also in den Knollen, Süllmasse ist. Der Kalk ist das Layer.

Unders bei den Kormen der Tasel I. 3., welche ich Coralloidea nenne. Zier sind die Algen in Dolomit verswandelt, der Serpentin ist das Lager. Zier also ist das Verhältnis umgekehrt.

Man sieht hieraus, wie oberflächlich, einseitig über-

haupt die bisherigen Untersuchungen waren, wie sie vollständig durch die Knappheit des Materials beherrscht waren.

1.5 Die Pflanze

Lin größeres Aätsel freilich als das "Lozoon" ist wohl schwerlich der Naturforschung aufgegeben worden.

Als ich die erste Ankündigung des Cophyllum dem "Ausland" übergab, dachte ich noch nicht daran, dass die großen Serpentinbänder auch Pflanzen seien. Ich hatte diese Arbeit zur Zälfte nach dem ersten Plan sertig, als ich endlich ein schlechtes Gesteinseremplar in die Zand bekam, bei welchem sich aber gerade deshalb die Serpentinteile eigentümlich deutlich abhoben.

Ich sah und sah und mit einem Male war mir klar, dass die "Sarcode-Kammer" nichts als Pflanzenzellen seien. So geht es den Mikroskopikern.

Was man mit bloßem Auge sehen kann, sehen sie nicht mehr.

Nun war ef aber eine schwere Urbeit, die Sache zu prüfen.

Ich habe jetzt keinen zweifel mehr.

Und nur so erklären sich alle Tatsachen.

Die Serpentinbänder, welche das, was man bisher Cozoon nannte, zusammensetzen, gehören einer Alge mit breiten Blättern, wenn der Ausdruck erlaubt ist, an, welche von einem Punkte ausgehend sich in regelmäßizen Formen legt. Die Basalzelle sitzt auf dem Serpentin oder Dolomit auf. Wurzeln fand ich nur in Einem Falle, sedoch nicht sicher.

Der Kalk ist die Linlagerung. Deutliche Brutzellen sind darin sichtbar: denn im Dünnschliff stechen sie durch den Kalk noch durch.

Die Gegenprobe kann man durch Auflösung des Kalks mit Säure machen. Zier sind die Blätter völlig mit Brutzellen besetzt: die "Warzenansätze" Gümbel's.

Die Sache ist noch viel klarer, wo die Pflanze in Dolomit verwandelt ist. Zier kann man mit bloßem Auge die Brutzellen erkennen.

Wasserklare Becherzellen sieht man auf dem Dolomit berausgewittert lagern.

Um schönsten aber sind die Kalke, in welchen die Pflanzen teils in Serpentin teils in Glimmer verwandelt sind.

Dieselben Zellen sinden sich in einem Doppelspat in Kupfer und Malachit verwandelt mit bloßem Auge sichtbar!

Die Kanalspsteme des "Zwischen-Stelets" sind also mistrostopische Pflanzen, welche teils einfach von Kalt oder auf den großen Algen angewachsen oder dort tot abgeslagert worden sind.

Wie ich im Eingang angedeutet, braucht man allerdings einen Schlüssel zu dieser neuen Schöpfung, denn sie ist unserer Vorstellung vollkommen neu. Dieser Schlüssel liegt in den mikroskopischen Kormen.

Mun aber lässt sich von diesem sicheren Ausgangspunkte die Sache leicht verfolgen. Mur muss ich auch hier vor der alleinigen Benützung der Dünnschlisse warnen. Es ist Sache des Zufalls, ob man hier ein Bild bekommt. Zunderte lassen sich ansertigen, aber nur ein ganz geübtes Auge vermag sie zu entzissern.

1.6 Eophyllum canadense

Ich übertrage nun den ersten Namen:

Lophyllum auf die mit bloßem Auge sichtbare größte Oflanzenform.

Sie bildet die Algenwiesen im Laurentian, aber freilich nicht in gar riesiger Form, nur durch ihre Menge ist sie riesig. Sie ist enthalten in den Serpentin-Knollen des Laurentiankalks, welche man bisher Gozoon canadense nannte.

Aber hier ist sie nur in ihrer größten Entwicklung: die acervuline Form des Cozoon ist nichts, als kleines Copphyllum und vorzugsweise Brutzellen desselben.

Die Pflanze ist eine Alge: in ihrer eigentümlichen Form stimmt sie mit keiner lebenden vollständig, sedenfalls gehört sie schon zu den höher entwickelten Fucusarten.

Die Zasalzelle ist eine halbrunde becherförmige Zelle, welche im Dolomit aufsetzt, einige kleinere Zellen und dann die nächste in Zecherform treibt, welche immer wieser neue Zellen ansetzt.

Die neuen Knospen, ich nenne sie Brutzellen, sitzen überall auf dem Kande der Jelle auf, und geben dem Blatte dadurch das höckerige Ansehen.

Die Form ist in Tafel I. I. dargestellt.

Das von Carpenter abgebildete Stück Gozoon, welches nachher in so viele Bücher überging, zeigt in dem Kugligen nur Brutzellen des Cophyllum, und ich bin

überzeugt, dass sie sich an dem abgebildeten Stück noch mit blokem Auge erkennen ließen.

Die Durchschnitte der Brutzellen sind leicht verständlich, sobald man sich diese Zellen auf dem Kalk herauflöst, indem man ihn in eine verdünnte Säure legt, oder auch, wenn man sie im Serpentin sucht, wo sie wie lebend gesehen werden können.

Ganze Pflanzen ziehen sich durch die Serpentinlager hindurch.

Ich habe die Zasalzelle in Taf. I. s. abyebildet, eine Brutzelle daselbst 4:5. zeigt eine solche im Serpentin.

Die regelmäßige Lage des Cophyllums rührt wahrscheinlich daher, dass sie sich schon bei Lebzeiten in Kalk eingebettet hat.

1.7 Die Formen

Man nehme nun Taf. II. zur Silfe, um sich eine Vorstellung von dem Leben zu machen, welches sich hier entwickelt.

Alle diese Formen sind teils auf dem Kalk gelöst, teils nach den im Serpentin erhaltenen Pflanzen gezeichnet meist bei 90-sacher Vergrößerung.

Ich wage es nicht, bei dem mir vorliegenden Material hier irgend schon Urten zu bestimmen. Dazu ist die Zeit noch nicht gekommen.

1, 2, 4, 6, 8, 17, 18, 22, 23, sind Prothallien, 3 a u. b. 10. Füllmassen (Steinkerne), 5. 23. zeigen eine Fadenselle. — Sig. 9. ist wahrscheinlich eine Sporangie, Sig. 16. wasserhell eine Füllmasse, wahrscheinlich von einer gestreckten Zelle, wie sie bei den Algen häusig vorkommen.

1.8 Di Arten

Ich lasse nun di Arten folgen, welche durch vollständis ge Exemplare festgestellt sind.

Allein auch hier kann ef sich bloß darum handeln, nach der Gesamtsorm Namen zu geben.

Alle folgende sind mitrostopisch im Kalt.

Ich gebe in Taf. III die 4 von mir unterschiedenen Urten von mikroskopischen Algen des Laurentian, welche alf "Kanal-Systeme" bezeichnet wurden, I. 3. 4. in 80, 2. in 20, maliger Vergrößerung.

Sie leben in Gesellschaft. Linzelne Formen werden nach diesen aufgeführt.

Kampylotlon.

Taf. III. 1/80.

Rampyloklon: von der Biegung seines Stammes und der Zweige. Die Zasalzelle ist rund, abwärts gekehrt. Un diese reiht sich eine gewundene Blattzelle, an diese eine Zecherzelle an und diese treibt entweder wieder eine Blatt- oder eine Zecherzelle.

Wahrscheinlich dieser Urt gehört an Taf. VII. 4. Leucophyllum.

Taf. III. 2. 1/20.

Es sind dies die größten mikroskopischen Pflanzen im Kalk. Ihre Unordnung ist leicht verständlich. Im Eck des Bildes ist eine Zelle 80-mal vergrößert. Die Blätter sind in ein milchweißes Silicat verwandelt.

Pseudozoon.

Taf. III. 3. (1/80).

Denn diese Kanäle wurden von Dr. Carpenter als die Kanalsysteme von Nummuliten gekennzeichnet aber freislich nicht vollständig wurden sie gezeichnet, sondern bloß die oberen geraden (fadens) Zellen des Zildes. Wären die unteren dazu gezeichnet worden, so hätte wohl Niemand sich überreden lassen, dass es sich hier um Kanalsysteme einer Foraminisere handelte.

Kilocarpon.

Taf. III. 4. 1/80. und Taf. IX. 1/140 Taf. X. 1/750. 1/450.

Ebenfalls ein "System".

Diese Algen mussten eine Gallert um sich ansetzen, wie es die Rostocaceen tun. Rur so erklärt sich das lappenartige Aussehen bei regelmäßiger Lagerung des Ganzen.

Wahrscheinlich dieselbe Pflanze ist Tab. IX. und X.

Ich nenne sie Kilo-Karpon, denn die Zelle des deutlich sichtbaren Oogoniums (Tab. X. 2) zeigt eine sehr große Unzahl von Prothallien, welche sich sodann auch in dem Kalk und Serpentin sinden.

Chairoterdos.

Der willkommene (erste) Jund einer Pflanze des Laurentian-Gneises. Tafel IV. und V.

Wie in allen bisherigen Algen bildet se ein Stengel eine Pflanze.

Ein schwacher Wurzelansatz in Form einer platt gewölbten oder becherförmigen Zelle, dann eine gewundene längere, weiter eine becherartige Zelle.

Aun beginnt die Teilung erst mit einer gewundenen Zelle, setzt dann fort in gestreckten, diesen folgen perlschnurartige Zellen, welche mit einer Sporenzelle endigen. Die Sporen liegen geordnet. Taf. V. Sig. 2.

Der nächste Stengel trägt eine leere Sporenzelle. (Taf. IV.)

V. I. ist eine 300-malige Vergrößerung der dritten Pflanze von rechts, der auch die Sporenzelle angehört.

Die erste Pflanze (von rechts) hat Blätterform, gehört aber ohne Zweisel zu derselben Urt.

Eine Zellmembran ist deutlich wahrzunehmen.

Tafel VI. 4. 1/320 wahrscheinlich dieselbe Urt. Poterion.

Tafel VI. Sig. I. Die Becheralge. Sig. 2. Zasalzelle. Margarobes.

Taf. VJ. 3. (1/650).

Perlschnuralge entwickelt sich auf einer Wurzelzelle, welche auf einem geraden Zweige (einer anderen Urt) aufsitzt.

Lichnon.

(Die Lampe) Taf. VII. I. 2. (Sig. 4. die Wurzelzelle) (1/90).

Die Zelle 2. gehört derselben Art an, ist sedoch ohne Stengel im Dünnschliff. Ich habe auf dem Kalk eine Zellhaut vollkommen gleich mit Säure ausgewaschen.

Sig. 3. ist eine Becherzelle, welche nicht zu I. gehört. Salping.

Trompeten-Alge (I/90).

Kilikobendron.

Becherbaum. Tafel VII. 6. (1/90).

Sig. 7. 8. Die Pflanze in ihrer ersten Entwicklung. Eine wundervolle Form bildet Pleurophyllum.

Pleurophyllum.

Ribben-Blatt. Taf. VIII. Sig. I. (1/750).

Die Kelche sitzen unmittelbar im Kalk.

Phiala.

Die Schale. Taf. VIII. 2. (1/90).

Schalenförmige Zellen. Die Stengel daneben zeigen Kopulation.

Das Zierlichste aber ist Theochara.

Theochara.

Gotteflust. Taf. XI. I. 1/90.

in Dolomit verwandelt, glashell.

Linophyton.

Tafel XI. 2. 3. 4.

Ich habe die Formen zusammengestellt, welche alle densfelben Charakter an sich tragen.

Bei Sig. 2. ist zu beachten, dass der eine Jell-Knoten nach rechts, der andere nach links geht, was ich nur nach sorgfältiger Beobachtung zeichnen ließ.

In einem Bilde, welchef leider nicht auf die Tafel kam, sitzt in dieser (wahrscheinlich Kopulations») Zelle in der Mitte ein Kelch.

Möglich also, dass an der Stelle Sig. 2. diese KelchZelle abgebrochen ist.

Sig. 5. zeigt den Fadenansatz einer ähnlichen Urt.

1.9 Überblick

Der allgemeine Charakter dieser Pflanzenformen des Laurentian-Kalks ist (ich wage den Ausdruck) ein höchst roher, einfacher, anfänglicher. Aber etwas haben sie, was sie den Pflanzen der Jetztzeit mindestens gleichstellt: sie sind vermöge ihrer Anlage einer ungemessenen Vermehrung fähig.

Das Individuum selbst ist einfach, ist eine Zelle.

Eine Zelle setzt sich an (nach unten), die nächste kehrt sich nach oben. Tafel VII. Sig. 7.

Ich habe fälle beobachtet, wo mehrere Zellen nach unten sich über einander setzten.

Mir ist es wahrscheinlich, dass hier die Zelle von Kalk überlagert und so genötigt wurde, ihre Wurzelbildung fortzusetzen.

Eigentliche Wurzeln fand ich, jedoch nicht sicher, nur in einem Dünnschliffe.

Aun setzt sich an diese Zelle, meist seitlich an ihrem Rand, oder an einem beliebigen Teile ihrer Obersläche, eine Brut-Zelle (Knospe) in Form eines Blattes oder eines Bechers an. Es teilen sich die Zellen: so entsteht ein Stamm.

Die Befruchtungsorgane scheinen erst nach einem größeren Wachstum sich zu bilden. Tafel V. und IX.

Was die Form der Zellen betrifft, so ist dieselbe unerschöpflich verschieden.

Immer aber bewahrt sie den Charakter der Urpflanze. Merkwürdig ist die Erhaltung.

Aicht bloß ganze Pflanzen, sondern Membrane sind erhalten. Sehr häusig sinden sich die Modelle der Zellböhlen. Diese sind gewöhnlich mit Dolomit ausgefüllt, wenigstens wo sie in Dolomit und Serpentin lagern.

So sind uns Modelle der Johlräume der Pflanzen erhalten. Tafel II. Sig. 10.

Diese Form sindet sich tausendmal im Serpentin wie im Gneis, auch im Dolomit selbst. Der offene Zwischenraum zeigt überall die Linie der Zellscheidewände.

Ebenso häusig sinden sich ganze Brutzellen in Serpentin verwandelt.

Die einfache Behandlung mit Salzfäure liefert diese Zelle in großer Menge. Ja ich habe sogar Kieselskelette erhalten, wo der übrige Teil der Pflanze wahrscheinlich in Kalk verwandelt war.

Wenn man so die Form der Urpflanze gewonnen hat, so nehme man einen beliebigen Dünnschliff des "Cozoon" und man wird die Linien derselben in jedem Teile sinden. Die einen Exemplare freilich sind bloß Abschnitte, andere Zalbschnitte am besten erkennt man deshalb die Pflanze an den seitlichen Linschlüssen.

Uberall zeigt die in Kiesel (wahrscheinlich Glimmer) erhaltene Zellmembrane die Form der Pflanze.

Jetzt erst ist mir auch klar, warum die Chrysotilfasern

überall parallel sich lagern (dieselben, die Dr. Carpenter für eine Zaut mit Tubuli eines Aummuliten ansah).

Diese Chrysotilfasern haben sich um die Pflanze (den Serpentin) in der Urt gelagert, dass sie Oberfläche der Zelle in Parallel-Kreisen umgeben: (in einer Korami-nisereschale stünden sie senkrecht auf der Kammer!)

Wenn ich setzt meine Dünnschliffe durchsehe und sinde darin die deutlichsten Brutzellen an der Pflanze, in der Tiefe des Kelches die runde Öffnung, welche ganz konstant (also hundertfältig) sich sindet, ferner ganz junge Zellen noch in den alten, endlich im Kalk daneben diese Zellen: so muss ich glauben, dass alle, welche am Lozoon arbeiteten (ich eingeschlossen), mit Blindheit geschlagen waren.

Vollends unbegreiflich ist dies hinsichtlich der Pflanzen im Serpentin des Cophyllumkalks. Zier liegen sie sogar für das bloße Auge. Aber weil dieser Serpentin nicht Coozoon war, deshalb untersuchte ihn auch Niemand mehr. Jeder, der die Sache setzt untersucht, wird sich an die Stirne schlagen und ausrufen: wie war das zu übersehen möglich!

Und vollends ist es unbegreislich bei Gelehrten, welche über sede Menge von Gesteinen verfügten, um es ohne Aücksicht auch vernichten zu können.

Insofern ist die Erfahrung mit dem Lozoon ein beseutender Präzedenzfall.

Aur in Linem Punkt muss ich meine frühere Beweissührung berichtigen, indem ich sie erkläre. Ich habe sehr großes Gewicht auf das ursprüngliche, unzersetzte Gestein in den Serpentin-Körnern gelegt und damit gegen die "Kammer" bewiesen.

Richtig ist, dass dies vorkommt.

Allein hier war die erste Frage: was ist Cozoon?

Dies war von Ansany an nicht so sestyestellt.

Wenige konnten sich nur darüber vergewissern, was die Entdecker als "Kozoongestein" anerkennen. Ich gebe zu, dass in dem, was mir nachher Dr. Dawson als "Kozoon" vorlegte, wenig unzersetzte Gestein in den "Kammern" gesunden werden wird.

Der Serpentin ist allerdings in einem flüssigen Zustand gewesen, hat sogar ganze Lager gebildet: ein solches ist die Unterlage des ganzen Cophyllumgesteins, wie insbesondere das breite Serpentinband, unter dem ersten breiteren Kalkband.

Da sind, allerdings selten, Mineralteile, welche polarisieren und daher in der Regel auf das erhaltene ursprüngliche Gestein zu deuten waren.

Dass ich den Serpentin erst im zweiten Stadium der Verwitterung begriffen ansah, der Irrtum rührt daher, dass ich die Zellwände als Gesteinsteile ansah und dass ich zwiel Werth auf die Teile des Gesteinsteile, wo diese noch wirkliche polarisierende Mineraleinschlüsse enthalten.

Diese Linschlüsse könnten allerdings auch Dolomit sein, welcher sich im Serpentin ausschied und so die Polarisationserscheinung bewirkte.

1.10 Ergebnisse

Die wichtigen Ergebnisse meiner Entdeckung sind:

- I. die ersten organischen Formen sind die niedersten Pflanzen, worauf höchst wahrscheinlich
- 2. folgt, dass wirklich die Bildungen der Gegenwart die Erzeugnisse der Fortentwicklung sind es ist also eine bloß einmalige gleichzeitige "Schöpfung" nicht dagegen
- 3. ist eben vermöge des Gesetzes der Entwicklung anzunehmen, dass die niedersten Formen der Laurentianzeit heute längst in höhere sich verwandelt haben: die
 niedersten von heute also können nicht die Nachkommen von damals sein und hieraus schließe ich, dass heute noch derselbe Übergang von Unorganischem zum
 Organischen (Schöpfung) stattsindet.

Möge nun die Frucht langjähriger Arbeit zu neuen Forschungen anregen.

Ein Grund ist gelegt. Die Cophyllumkalke von Canada bieten dem Forscher eine unermessliche Fundgrube der Erkenntnis, denn keine Schichte der Erde hat wie diese erste ihre Toten so wunderbar schön erhalten.

Der klarste Kalksteinniederschlag, noch mehr aber die Serpentinschichten, haben Zäute von kaum messbarer Die de uns ausbewahrt.

Das Bild der Urzelle, welches nun naturgeschichtlich festgestellt ist, ist sast durch ein Wunder erhalten.

Freilich das Werden selbst sieht man doch nicht. Zum Werden kommt der Mensch immer zu spät: wenn er es sieht, ist schon ein Gewordenes da.

Waf führt die einfachsten Stoffe der Erde in diese einfachsten Formen? Dieses Kätsel der Entwicklungslehre wird nie gelöst werden. Auf den wissenschaftlich registrierten Stoffen allein lässt es sich nicht erklären. Diese Tatsache wird auch den Naturforscher und gerade den Naturforscher, als den Mann der Erfahrung, zuerst zur Erkenntnis eines Stoffes treiben, welcher selbst zwar mit den Sinnen nicht mehr wahrgenommen werden kann, dessen Wirkungen aber in die Sinne fallen und damit dem Verstande den Zeweis seines Daseins aufnötigt. Nenne man diesen Stoff, wie man will, er ist da. Das ist zunächst die Zauptsache. Unsere Zeit streitet über die Frage, ob es denn außer der Materie auch einen Geist gebe? Die Zeit wird freilich auch noch kommen, wo man einsieht, dass es ebensowenig einen Geist, (Leben) ohne die Materie gäbe.

Das Entwicklungsgesetz aber ist es gerade, welches den Menschen zu der Überzeugung leitet, dass die Schöpfung auch mit seinem Dasein, wie es setzt ist, noch nicht abgeschlossen sein kann, dass es vielmehr noch höhere Daseinsformen für ihn geben muss, welche zu erreichen, Naturgesetz für ihn ist.

So allein erklären sich hundert Tatsachen des geistigen

und Seelenlebens, welche ohne dieses Gesetz unverständlich wären, kurz, so allein erklärt sich der Mensch selbst.

Es ist daher die Entwicklungslehre, auf den Menschen übertragen, das Gesetz des Fortschritts ja der Unsterblicheteit. Nicht im Kampf um das niedere Dasein, sondern im Kampf um das höchste Dasein geht der Mensch seinen Lauf nach dem Gesetz der Linie, die sich nur im Unendlichen mit einer andern schneidet.

Ich konnte mir nicht versagen, diese Schlussbemerkungen zu machen. Ich glaube in meiner Arbeit gezeigt zu haben, dass ich die erakte Wissenschaft liebe. Aber es gibt eine erakte Wissenschaft auch des Geistigen und nicht bloß des Körperlichen. Zu einer wie der andern gehört, dass man sehen will. Will man sehen, die Tatsachen sind da.

Auf diesem Wege möchte ich nicht bloß die Naturwissenschaft, sondern auch die Wissenschaft des Menschen, die höchste welche es geben kann, durch meine Arbeit um einen Schritt weiter geführt sehen.

2 Das erste Tier

Ich hatte meine Urbeit schon geschlossen, als ich in dem (mit Salzsäure aufgelöstem) Cophyllumkalk noch das erste Tier sinden sollte, welches wir kennen.

Ich besitze es in I vollständigen Exemplar (in Kanadabalsam) und in Bruchstücken, wovon einige nahezu vollständig.

Vergebens sah ich mich nach einem Nachbild unter den lebenden, wie unter den ausgestorbenen um. Es gleicht einigermaßen Serpula oder Vermetus.

Ich nenne es Titanus Bismarki Taf. XII. unserm Reichskanzler zu Ehren.

Ein Wurm mit einem Kieselpanzer: denn derselbe hat der Salzsäure widerstanden.

Der Panzer muss durch Zäute verbunden gewesen sein. Dafür spricht Taf. XIII. Sig. I.

Ein Exemplar ist 0,59 mm. lang, 0,06 mm. durcheschnittlich breit.

Der Panzer besteht auf zahllosen kontraktilen Kingen der Titanus vermay sede Stellung anzunehmen.

Ein Stück (vorausgesetzt, dass ef derselben Art anspehört) zeigt, dass eine partienweise Zusammenziehung der Glieder stattfand, denn der Leib innerhalb des Kieselspanzers ist in gleichmäßig von einander abstehenden Seymenten zusammengezogen, und daher bildet der Panzerscharfe Kanten.

In dem Panzer steckt ein Leib, welcher ebenfalls der Säure widerstanden hat.

Der Panzer ist egelartig geformt, nicht rund, sondern im Durchschnitt flach-linsenförmig, wie der Durchschnitt eines Blutegels. Er nimmt von oben nach unten an Dicke ab. Das dickere Ende ist herzförmig, die scharfe Spitze nach oben gekehrt.

Es bildet eine Art Wohnkammer: der betreffende Teil des Panzers ist deutlich glasig.

Mundöffnung O,12 mm. breit,

Schwanz 0,05 mm. breit.

Durch den Panzer hindurch sieht man einen Körper mit einer Zöhlung in der Mitte.

Durchmesser desselben 0,03 mm.

Auf der Mundöffnung ragt eine Wulst hervor, der eigentliche Mund.

Wenn man bei Taf. XII. Sig. 3. das Mikroskop hoch einstellt, so sieht man nur die herzförmige Öffnung: wird der Tubus gesenkt, so erblickt man durch die Schale und hinter derselben die Mundöffnung. Leider lassen sich solche zarte Dinge in der Zeichnung nicht vollständig wiedergeben.

Sigur 3 hat einen übrigens undeutlichen Lappen, der über die Mundöffnung hervorragt.

Ein gebrochenes Stück Taf. XIII. 2 zeigt eine deutliche Röhre. Das andere Ende des Körpers (der Schwanz) ist zweilappig, wie eine Klappe. Tas. XII. Sig. I. Tas. XIII. Sig. 5. ist ein abgebrochenes Stück, welches vollständig mit Tas. XII. Sig. I. stimmt.

Dass die Form eine organische ist, lässt sich wohl in keiner Weise bezweiseln. Dass es ein Tier und keine Pflanze ist, dafür spricht die Bewegung, welche auf den verschiedenen Stellungen des Geschöpfs geschlossen werden kann.

Die form ist Serpula ähnlich.

Freilich suchte man bis setzt wohl schwerlich ein Tier, das den Anneliden gleicht, in der untersten Schichte, Tieren, welche ihre Stellung im Tierreich fast schon über dem ersten Vierteil desselben einnehmen.

Es wäre aber auch möglich, dass wir hier nur die äußere Gestalt eines höheren Tieres vor uns haben, denn die innere Organisation lässt sich nicht mehr feststellen.

Titanuf unterscheidet sich von allem, was im Cophyllumkalk vorkommt, sofort durch die Textur.

Die Streisen (Glieder) des Panzers sind wie mit dem Grabstichel gezeichnet, die Beweglichkeit muss des halb auch eine vollkommene gewesen sein.

Man könnte im Titanus hienach den Vorgänger der Trilobiten sehen.

Die Bruchstücke Taf. XIII. zeigen alle gleiche Textur.

Gewisse hyaline Ansätze auf Pflanzen von derselben Art, wie die Mundöffnungen, könnten vermuten lassen, dass man es hier mit jungen Tieren zu tun hat, die sich auf anderen Gegenständen ansaugen.

Doch die Sache muss erst in weiteren Exemplaren untersucht werden, wie denn dies Alles mehr eine Ankündigung und Aussorderung zu weiterer Forschung sein soll, als ein wissenschaftlicher Abschluss.

Es sind nur einmal neue organische Formen und damit ist eine neue Schöpfungsperiode festgestellt.

3 Serpentin

Als ich die Arbeit bis hierher vollendet hatte, siel mein Blick auf einen Briefbeschwerer von Serpentin, der auf meinem Arbeitstisch lag. Ich sah hier bläuliche flecken und sofort erkannte ich die vom Laurentian-Serpentin beschriebenen Formen in dem Serpentin von Sachsen wieder.

Bei genauer Untersuchung fand ich die schönsten Linien und Formen von solcher Reinheit und Vollendung, als sie der Paläontologe nur wünschen kann.

Sofort nahm ich alle meine Serpentine, sowohl Dünnschliffe als Zandstücke vor. Wie erstaunte ich aber, als ich in dem größten Teil derselben Pflanzen-Formen von I-2 cm. fand!

Ich fand daneben eine solche Masse kleinerer Formen, dass ich die Unsicht ausspreche:

ein großer Teil der Serpentine, insbesondere der böhmischen und sächsischen, ist nichts als ein großes Algen-Lager, ähnlich den fossilen Diatomeen-Lagern.

Es lagert die verkieselte Pflanze in der ursprünglich flüssigen Serpentinmasse.

Ich zeichne nun sosort die Form auf 3 Briefbeschwerern cf. Tasel XIV. und begnüge mich vorerst damit, die Wissenschaft auf die Tatsache ausmerksam gemacht zu haben. Tafel XIV. 4. ist eine form von II/2 cm., welche ich so bestimmt gesehen, als es nur sein kann.

Ich nenne sie meinem verehrten Freunde K. Zofrath Dr. F. v. Zochstetter in Wien zu Ehren und wegen ihrer knospenartigen Form

Opthalmia Zochstetteri.

Wir haben also ungeheure Schichten eines bis dahin für azoisch gehaltenen Gesteins als reines organisches Lager.

Die Kelche sind mit Granat gefüllt. Offenbar steht dies se Bildung in Verbindung mit der Tätigkeit der Pflanze.

Wie war es möglich, diese Formen zu übersehen?

Aber freilich, ehe man den Schlüssel zur form auf dem kanadischen Laurentian Gestein hatte, war es nicht so leicht, nur daran zu denken und deshalb sah man es auch nicht.

Jede Upotheker-Reibschale, seder Briefbeschwerer zeigt uns in einem Kubikzentimeter eine größere und vielleicht 1000 kleinere Oflanzen-Zellen.

Ich zeichne auf dem Lophyllum-Kalt noch 2 Tafeln Zellenformen, um die Grundform derfelben zur Anschauung zu bringen.

Der Gedanke an das Erlebte beschäftigte mich den ganzen Tag.

Wie ganz anders erschien mir mit Linem Male das bisher so rätselhafte Gestein! Ich war schon im Begriff, mich zur Auhe zu begeben, als mir einfiel, dass ich noch eine Kiste Gesteine von Canada verpackt im Zausgang stehen habe.

Ich wollte insbesondere noch ein Stück wasserhellen Kalkspats wegen der kupfergefärbten Pflanze darin suchen und damit meine ganze Urbeit schließen.

Ich ließ die Kiste öffnen.

Da sielen mir die Laurentian-Gneis in die Zand.

4 Was ist der Laurentian-Gneis?

Diese Frage stellte ich an mich.

Ich besah das Gestein, während ich es ins 3immer trug, und erkannte sosort,

dass auch der Laurentian-Gneis nur ein großes Pflanzen-Lager sei.

Sofort wurden noch Dünnschliffe gefertigt und durch das Mikroskop vollkommen bestätigt, was das bloße Ausge gesehen hatte.

Ich untersuchte in der folge alle meine Zandstücke, etwa 30 Stücke und fand eines wie das andere größtenteils aus Pflanzen (Algen) bestehend.

Die meisten sind schon mit blokem Auge zu erkennen.

Mit schwacher Vergrößerung löst sich die ganze Masse des Gneises in Pflanzen auf.

Ulso eine Formation, welche in ihrer Mächtigkeit auf 30,000 fuß geschätzt ist, ein Pflanzenlager!

Meine Laurentiangneis-Zandstücke sind auf der Gegend von Ottawa und vom Lake Simcoe bis zum Nipissing-See gesammelt, letztere also von einer Fläche von 130 engl. Meilen und alle sind Eine große Pflanze!

Ich fertige nun Tafeln, um eine Vorstellung zu geben.

Das Zandstück I. ist von Templeton bei Ottawa (der Zauptstadt Canadas). Glimmerschiefer.

Es ist aus einer Apatityrube. Es hat fleischroten Kalkspat, graugrüne Apatitkristalle mit 6 seitigen Tafeln von schwarzem Glimmer.

Seine Textur ist sein-blättrig. Auf der Bruchfläche erkennt man deutlich strahlenförmige Parthien. Sosort fallen auch weiße rundliche Stellen in die Augen. Es sind die Kelch-Zellen, welche gegen den Beschauer gekehrt sind.

Bei genauer Besichtigung sindet man die Jellkelche in den größeren Glimmer-Partien, sodann die Jellen, welche den Stamm bilden.

Schwarze Glimmer Tafeln umhüllen die schönsten Kelde. Die seinste Textur ist noch sichtbar.

Eine Pflanze kann schon mit blokem Auge auf I cm. Raum verfolgt werden.

Schon mit bloßem Auge sieht man ferner die Verswandlung der Pflanze in Apatit und Glimmer.

Die Pflanzen nehmen etwa 2/3 der Gesteinsmasse ein.²

Die Upatit-Kristalle sind wahrscheinlich das Produkt des kleinen organischen Lebens.

Eine Mischung von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk wird von der Pflanze zersetzt.

Es trennen sich phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk und so lagern die Apatit-Kristalle im kohlensauren Kalke.

Die Pflanze dieses Gesteins habe ich auf Tasel XVII.
10. abzebildet.

²Vergleiche unten.

Ich nenne sie Dufferinia zu Ehren des Lords Dufferin, des Generalgouverneurs von Canada, als ich dort war.

Einzelzeichnungen Sig. II. 12. 13.

Um einen Dünnschliff daraus zu fertigen, war das Gestein I. zu weich und zu wenig homogen. Der Glimmer blätterte ab, wie die Pflanzen darin lagen.

Sig. 14. eine Pflanze auf einem Apatit-Kristall.

Zandstück 2. vom Muskoka-See. Sehr feldspatreich.

Taf. XVII. 4. Auf demfelben Stücke fig. 5. 6. 7. 8. 9.

Ich konnte nur eine Pflanzen-Art feststellen.

Taf. XVII. Sigur IO-13 sind schwache Vergrößerungen 1/5.

Ich nenne die Pflanze Sig. 4.

Victoria

zu Ehren der Königin Victoria.

Diese Pflanze scheint eine der ältesten und ursprüngslichsten zu sein.

Das zweite Zandstück zeigt ferner die Form

Tafel XIX. Sigur 3.

Ich nenne sie zu Ehren des Vorstandes des Geological Surveys of Canada Mr. Selvyn

Selvynia.

5 Glimmer

In einem kanadischen Glimmer auf dem Laurentian bilde ich Taf. XVII. Sig. I. 2. 3. ab.

Die Jelle Sig. 3. ist in Zämatit verwandelt, ist durche sichtig und zeigt so den Kanal, der durch die Jelle bis zur Wurzel hinabgeht, aufs deutlichste. Sig. 2. ist wahrescheinlich ein Durchschnitt des Kelchrandes.

6 Das "Urgebirge"

Wieder war die Urbeit geschlossen.

War der Laurentian-Gneis von einer Masse Zellen-Pflanzen durchzogen, warum sollte es unser Gneis nicht auch sein?

Und wenn der Gneis es ist, wie verhält sich Granit und Porphyr?

Es ist oft unbegreislich, wie nahe die Tatsache liegt, ohne dass man im Stand ist, sie zu sehen. Trotz des Mikroskops — man sieht eben nichts.

Ich muss die Form meiner Abhandlung hier entschuldigen.

Meine Arbeit galt dem Gozoon. Darauf wurde daf Gophyllum. Sie galt dem Gophyllum. Daran schloss sich Sie Entdeckung der Pflanzenwelt des Serpentins. Sie sollte mit dem Serpentin geschlossen werden. Da fand ich, dass der Laurentian Gneis ein Pflanzenlager enthält, nichts als Pflanze ist.

Auff äußerste ermüdet, war ich froh, endlich Feder und Zeichenstift niederlegen zu können da drängt ef mich wieder in die Forschung hinein: ich kann noch nicht ruhen.

Ich bemerke hier, dass die Entdeckung des Serpentins
— da ich dieses schreibe — erst 2 Tage alt, und das was
ich heute schreibe, die Urbeit von I2 Stunden ist. Gestern
hatte ich das Manuskript für den Druck schon geschlossen,

als der Gedanke sich aufs Neue meldete und mich sesthielt. Der Gedanke war es, welchen ich oben ausgesprochen.

Es war die Arbeit einer Nacht, die Dünnschliffe des Urgebirges zu durchgeben und nun steht es mir fest:

Der Granit ist nichts als Pflanzen, keine Gesteinsmasse daneben, alles Pflanze!

Glimmer und Jornblende sind die Kelchzellen. Der Feldspat ist Füllmasse der Pflanze, Baustoff der Pflanzenzellenhäute. Der Quarz bildet meist Brutzellen.

Der Gneis enthält schon die vorgeschrittenen Formen der Pflanzen.

Insbesondere beim Knotengneis sind die Knoten nichtsalf größere Kelchzellen.

Auch der Porphyr enthält lebende Pflanzen. Derselbe ist der Schlamm des ersten Urgebirges. (Felsit ebenso.)

Erst nach dem Suchen durch das Mikroskop sehe ich die Korm mit blokem Auge — Pflanzen von der vollen Länge der Zandstücke.

Ich gebe diese Arbeiten, wie sie entstanden sind. Es sind Entdeckungen von solcher Bedeutung, dass es wohl nicht als Anmaßung erscheinen kann, wenn ich zugleich einen Blick in meine Werkstätte tun lasse, nebenbei ist es der individuelle Grund, dass ich zu ermüdet bin, um Alles umzuarbeiten.

Zei der nunmehrigen Zeweisführung muss ich die form der Urpflanze als bekannt annehmen.

Die Formen sind in Laurentian-Kalk unumstößlich festgestellt, und zwar schon in verhältnismäßig großer Verschiedenheit. Dort bestehen, wie ich vermute, hunderte von Urten.

Im Kalk sind schon die mikroskopischen Arten enthalten, vielleicht sind sie dort erst entstanden. Im Gneis sind es Pflanzen, welche mit blokem Auge zu erkennen, dabei schon sehr entwickelt in der Korm sind.

Das Prototyp all dieser Pflanzen ist zumeist ein einfascher Trichter.

Die untere Spitze verzweigt sich zur Wurzelzelle.

Der Trichterhalf teilt sich und streckt sich, Jelle reiht sich an Jelle durch Teilung.

Dadurch entsteht der Stamm.

Nun setzen sich sowohl am Rande des Trichters, als auch an der Zellkante neue Trichter an.

Aber auch in Form von Mycelium-Säden strecken sich Zellen auf, welche wieder Trichter treiben. Diese Fadenzellen suchen Vereinigung und verzweigen sich.

Ich bemerke aber hier, dass auch in den Trichtern wirkliche Mineral- (Kristall-?) Einlagerungen vorkommen. Diese erscheinen mir als Produkte des organischen Vorgangs.

Ich bilde die Entwicklung der Urzelle ab Taf. XVIII. I-7. jedoch nur, soweit ich das Bild im Serpentin gewann. Im Granit herrschen die Stammzellen vor, sedoch in der uranfänglichen Form, welche sich denken lässt — der Kristallform.

Mit diesen Vorbegriffen und Vorstellungen, welche ich durch meine Beobachtungen als festgestellt annehmen darf, wollen wir an die Urbeit gehen.

Um die Kontrolle wenigstens zu erleichtern, nehme ich die "Sammlung typischer Gesteine" von A. Fuess in Berlin, Serie II., und beginne mit

Ar. I. dem Granit von Brixen.

Ich werde, was ich im Schliffe sinde, beschreiben und das Wesentliche abbilden, damit der Leser sich selbst orientieren kann. Jum Verständnis dieses Schliffes muss man schon das Bild aus dem Laurentian-Gneis Tas. XVII. 4. XIX. 3 zu Zilse nehmen.

Auf den ersten Blick erscheint Alles als ein Gemisch von Feldspat und Quarz-Körner mit Glimmer und etwas Zornblende. Sind es Sprünge, welche den Schliff durchziehen? Sind es Kristallslächen? Es sind keine Sprünge da, keine Kristalle.

Die Linien zeigen beim ersten Unblick eine gewisse Regel, aber sie ist unverständlich.

Plötzlich springt das Gesetz in die Augen!

Das ganze Gestein löst sich in Pflanzenzellen auf und diese selbst stehen in organischem Zusammenhang.

Taf. XVIII. Sig. 8. folg. mag als Unhaltspunkt für die Auflösung eines Granits dienen.

Merkwürdigeres noch bietet

Ar. 2. Granit von Altendamm.

Brutzellen siehe XVII. Sin. 16. 17. 18.

Eine Fornblende Pflanze Taf. XVII. 15.

Micht minder löst sich

3. Gneisgranit vom St. Gotthardt.

Ein Pflanzenbild darauf XX. Sig. I.

4. Cordierityneis von Mittweida

zeigt Taf. 20. Sig. 2. und 3.

5. Granulit von Zardtmannsborf.

Taf. XIX. Sig. 14. 15. 16.

Granulit (und Granat).

Ich habe schon die Vermutung ausgesprochen, dass auch der Granulit Pflanzen enthalte.

Das bestätigt sich nun vollständig.

Allerdings sind die größeren mit bloßem Auge nicht sofort erkennbar.

Allein wie oft, so muss auch hier die kleinere Form den Schlüssel zur Erkenntnis der großen liefern.

Die kleinen mit bloßem Auge kaum unterscheisbaren rötlichen Punkte im Granulit werden allgemein für "einsgesprengte" Granaten angesehen.

Sie sind die Ausfüllung der mikroskopischen das Gestein horizontal durchwuchernden Pflanze, bezw. ihrer Kelche.

Taf. XIX. Sig. 14. 15. 16.

Ich zeichne einige solcher Pflanzen und bemerke nur, dass dieselben nach allen Seiten fortsetzen, Kelche haben, vorzugsweise aber in horizontaler Aichtung liegen.

Die großen Kristalle sind Ausfüllmassen der größeren Pflanzenart. Ich nenne die kleinere Art zu Ehren des Zerrn Prof. Oswald Zeer

Granatina Zeeri.

Auch hier muss man sich freilich durch das Prototyp der Urpflanze leiten lassen, dann bleibt kein Zweisel.

Dasselbe Verhältnis sindet hinsichtlich des Granats im böhmischen und sächsischen Serpentin statt.

Auch hier sind die Granaten Füllmassen der größten Pflanzenkelche.

Die weißen Granaten von Auerbach sind nichts anders.

Sie tragen noch deutlich den Steinkern ihrer Kelchvertiefungen an sich.

Im umgebenden Gestein ist eine Menge mikroskopischer Pflanzen.

Ich habe vor mir einen Kalkgranat.

Granatoeder von 2 cm., voll von deutlich sichtbaren Pflanzen-Formen. Der Kern rundlich, leicht als Stein-Kern eines Pflanzen-Kelchs zu erkennen. Die Schichten in demselben tragen einzelne Pflanzen (in der heragonalen Stellung des Dodekaeders).

Als ob die Algen Krystalle zu Früchten gehabt hätten.

6. Quarzporphyr von Schwärz bei Zalle.

Eine schlammige Grundmasse mit unzähligen Jellmembranen aber auch lebenden Pflanzen.

Taf. XX. Sig. 4. folg.

Mun füge ich noch bei

Darstellungen

eines Laurentian-Gneises von Canada

Taf. XIX. Sig. I-8.,

eines Fornblendegesteins von Montreal

Taf. XIX. Sig. 9.,

eines Protogyns vom Montblanc

Taf. XIX. Sig. 17. 18. 19. 20.,

eines Gneises vom Montblanc

Taf. XX. Sig. I.

7. Protogyn.

Es war seiner Zeit ein großer Lärm, als man das älteste Gestein der Erde gefunden zu haben glaubte. Man nannte es deshalb Protogyn.

Ich habe eine Zeichnung vom Protogyn des Montblanc gegeben.

Er ist wie der Granit eine Pflanze.

Da sind langgestreckte Pflanzen, ich nenne sie Protogynia.

Zelle an Zelle. Brutzellen nach oben und unten.

Die gelbe Färbung ist von Lisen. Daneben sind wasserbelle Zellen, Zornblende. Es sind die seinen Nadeln des

Chlorits und Talks, wahrscheinlich auch zersetzte Sornblende.

Die wasserhellen Jellen bestehen aus Quarz: sie nehmen den größten Teil des Gesteins ein. Sie lassen sich aber leicht in die Korm der Urpflanze auflösen.

Ich bilde eine Pflanze, mehrere Endzellen und Brutzellen ab.

Ebenso die Wurzel-Zelle. Taf. XIX. Sig. 17-20.

7 Line Gesteinslehre

Ich versuche es nach diesen Ergebnissen, eine Gesteinselehre aufzustellen.

Die Gesteinsarten sind

entweder ursprüngliche oder abgeleitete Zersetzungse Produkte, Schlamm und Laven.

Ursprünglich sind bloß I. die Pflanzenlager, 2. das Gestein auf der Masse des Erdinnern welches dies ist, ist zweiselhaft.

Die meisten unserer "Urgesteine" sind Pflanzenlager und daraus abgeleitete Gesteine. Ich habe aber gar keine Gesteine ohne tote Pflanzen wenigstens gefunden, letztere in den Laven und Schlammgesteinen.

Die Gesteinsart ist also bedingt durch die Pflanzen, auf welchen das Gestein besteht:

- U Die Urgesteine sind die Pflanzen-Layer: sie lassen sich auf die Pflanzen-Formen zurückführen, welche darin leben und sich so zusammensetzen.
- 3 Ef gibt Mittelstufen: Detritus von Pflanzen-Lagern mit eingelagerten lebenden Pflanzen.
- C Es gibt Gesteinsschlamm bloß mit eingelagerten toten Pflanzen.

D Laven.

Das ursprüngliche Mineral, aus welchem die Ur-Gesteine zusammengesetzt sind, ist ein Gemisch von Ouarz, Feldspat und Fornblende (Glimmer).

Diese scheidet die Pflanze.

Die gebildete Pflanze scheidet die übrigen Minerale auf, insbesondere Granat, Leuzit u. s. w.

Die ersten Pflanzenzellen sind Kristall-Kormen.

feldspat zwei- und eingliederig, Quarz sechsgliedrig bildet die Zauptform. Die Zornblende bildet die Kelchzellen.

Doch ist das Verhältnis der Zellen zu ihrem Inhalt noch näher sestzustellen.

Man sehe durch den Polarisations-Apparat und man wird sede Pflanzenzelle im Granit leicht unterscheiden und sedes Individuum leicht herauffinden. Die Streisen für Oligoklas angesehen, sind horizontale Anwachsungsstreisen der Zelle.

Schriftgranit ist Feldspatmasse mit wundervoll schönen Ouarzpflanzen.

Der Granit ist das erste Gestein. Von Unfang an ist Zornblende in ihm, welcher sich in Glimmer verwandelt. Später übernimmt Zornblende die Zauarbeit.

Der Zasalt enthält ganze (ich nenne sie lebende) Pflanzen. Was Zirkel Nephelinbasalt nennt, sind Stammzellen einer Pflanze, welche ich Mycelium Zirkeli nenne. Die "Fluidalstruktur" also Algenzellen.

Die Olivine im Zafalt sind Pflanzen-Zellen (sei ef ursprüngliche, sei es, dass der Olivin-Crystall nachher die Pflanze umschreibt.

Die meisten Zasalte sind daher Wasser-Produkte.

Ebenso enthält Gabbro, Talk-Pflanzen.

Man betrachte die Gestalt der Ur-Pflanze und man wird sie überall wieder sinden.

Man präge sich die Form derselben Tafel XVIII. ein, nehme ein Stück grobkörnigen Granit und man wird die Form so scharf gezeichnet sehen, als die eines Ammoniten im Jura.

Im Zypersthen ist die ursprünglichste Korm der Pflanzenzelle (nach einer rein geometrischen Linie) und so sindet man auch die Zelle teilweise im Granit.

Maher Zusammenhang der Kristallform mit der Korm der Pflanzenzelle! Ursprünglich dasselbe.

Leucit bildet Kelchzell-Auffüllungen mit Anwachsungs-Streisen. Die Punkte in den kleinen Kristallen sind wohl Sporen. Zieraus erklären sich die Polarisations-Erscheinungen.

Die Schiefersteine sind teils ursprüngliche, teils abgeleitete. Im ersteren falle bilden sie sich auf einer Masse von Zellpflanzen, im letzteren fall sind sie ein Mayma mit einer Unzahl toter und weniger lebender Zellen.

Der Pechstein ist ein Pflanzengestein und nicht vulkanisch. In den meisten Gesteinen lassen sich die Pflanzen mit blokem Auge leicht erkennen, wenn man die Grundform weiß.

Ich habe 2 Basalte von Biberich mit 2I/2 cm. langer Pflanze, das Gesteinstück ist 3 cm. lang.

Unbegreiflich, dass man dies Alles bis jetzt übersah.

Man hatte eben den Schlüssel, das Bild der Urpflanze, nicht.

Ich machte den zweiten Dünnschliff aus dem Laurentian-Gneif und sah erst beim Bedecken mit dem Glas die Pflanze mit bloßem Auge.

Die künftige Gesteinslehre ist Pflanzen-Versteinerungslehre.

Sismondi sand ein Lquisetum (wie ich erst heute auf Mohr sehe), im Gneis eingelagert.

Dass der ganze Gneis Pflanze sei, sah er nicht.

Die nähere Darstellung auf Grund genauer Untersuschung der einzelnen Gesteine wird folgen.

Die vorstehenden Thesen sollten nur die ersten Beobeachtungen geben. In der Zauptsache wird die Sache aber so bleiben.

Insbesondere mögen die Mineralogen auf die Pflanze zurückgehen. Es ist wunderbar, in welch engem Zusammenhang Pflanze und Kristall stehen.

Es gibt sehr viele Pseudo-Krystalle durch bloken Druck, Guss-Jormen aus Kelchzellen, welche mathematische Form haben.

Man hätte schon stutzig darüber werden sollen, dass der Granit keine Kristalle enthält. Die Linien im Dünnschliss des Granits sind Pflanzen-Zell-Membranen.

Man nehme den Polarisationsapparat. Auch der Blätterbruch wird oft nur die Anwachsstelle in der Zelle sein.

Die Tschermat'sche Theorie may chemisch richtig sein. Wichtiger aber ist die mechanische Erklärungsweise.

Der Orthoklas ist in Unwachsungsschichten abgesetzt, baher die verschiedenen Polarisationsstreisen. Die Zellwände spielen mit. Dies ist im Labrador leicht erkennbar, welcher Pflanzenstämme von Zolldurchmesser enthält. Seinste Zelllagerung, daher die Lichtbrechung. Sehe es eben an einer Pflanze von I cm. Durchmesser.

Aun haben wir für die Jukunft eine einfache Gesteinselehre. Alles ist Sedimentgesteinslehre.

Im Urgebirge ist die Pflanze, vom Übergangesgebirge mag das Tier Leitfossil sein.

Ich habe den Vorteil sofort genossen.

Es ist zu untersuchen, inwiesern manche Gesteine nicht Umwandlungs Produkte des Stoffes (nicht der Granitspflanzen) enthalten. Diese bleiben.

In sedem Gestein sinden sich Jellen und Steinkerne von Pflanzen.

Man setzt allen Pechstein zu den Vulkan-Gesteinen: der eine ist ein Lager von lebenden, der andere von toten Pflanzen.

Der erste Kalk stellt sich wirklich als Ausscheidungsmasse dar, so der Kalk des Laurentian-Gneises.

Nachher wird er erst Zaustoff für Pflanzen-Arten. Vor mir liegt ein Serpentin von Todtmoof mit einem Pflanzen-Relch von I Ctm. Länge im Durchschnitt, so sein gezeichnet, als irgend ein Zeichner es vermag. Wundervoll wie im Zasalt der Olivin-Kristall Pflanze, die Pflanze Kristall ist.

Der Olivin ist Pflanzenzelle, die Feldspate, der Mesphelin ebenso.

Die großen Kristall-Kelche stechen in die Augen. Die Wurzelzelle, welche dazu gehört, ist ein kleiner Kristall, häufig ist auch die Brutzelle auf dem Kelche ein Kristall. Zuweilen ist die ganze Zelle von dem Kristalle umschrieben. Wie eine mathematische Aufgabe.

Trachyt ist ein Gemisch von lebenden und toten Jellen, ebenso Klingstein.

Ich wäre heute schon im Stande gewesen, die Leitspflanzen für etwa 30 Gesteine zu zeichnen. Wollte es aber lieber Underen überlassen, welche mehr Zeit haben.

Die beliebten Metamorphosen müssen nach meiner Unsicht stark zusammenschrumpfen.

Mechanische Zerreibung, Lösung, Ablagerung — dies sind aber nicht die eigentlichen Metamorphosen.

Die Träume von Verwandlung eines Gesteins ins and dere lösen sich auf.

Denn wenn des Gesteins-Art und Struktur von der Pflanze abhängt, auf deren Körper das Gestein wurde, so kann ein ursprüngliches Gestein nicht — ein anderes werden. Ist so wenig möglich als eine Liche in eine Palme, und eine Palme in eine Liche sich verwandelt.

8 Carrararischer Marmor

Ich bezog eine weiße Platte mit grauen flecken zu eisnem Zuffet welches mir als Kasten für meine Steinschlisse dient.

Ich verschüttete etwas Judzsin und musste die Platte reinigen.

Ich rieb sie.

— Plötzlich was sah ich!

Kelche von I Meter Länge. Taf. XXI.

Ich nenne sie

Marmora Sarwini.

Mein Schreibtisch hat dieselbe Platte, aber nur mit etwas weniger deutlichen Pflanzen.

Ich schrieb also eine ganze Abhandlung über die Urzelle auf der Urzelle, denn der ganze Marmor ist nichts als Pflanze. Wirklich — nicht bloß Ironie des Schicksals.

9 Nachtray

Ich habe den Ophicalit von Krummau in Böhmen, ferner den von Passau untersucht: dieselben, welche Gümbel und v. Zochstetter als Gozoon erklärten. Beide enthalten Pslanzen, sedoch nicht so viele, als das canadische Gestein. Der "Warzenansäze" Gümbels habe ich schon gedacht.

10 Basalt

Ich wollte den Zasalt blos gelegentlich besprechen. Ich konnte mir aber doch nicht versagen, dieses von den Vulkanisten am eisrigsten umworbene Gestein einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.

Ich habe 2 Basalte von Biberich.

Zeide haben 3 cm. lange Pflanzen (ohne alle Unterbrechung) Zelle an Zelle gefügt.

Der Dünnschliff zeigt ein vollständiges zusammenhängendes Pflanzen-Netz. Es kann sich daher bei beiden nicht darum handeln, dass sie etwa blos eingelagerte Pflanzen (Leichen) enthalten. Die Pflanzen sind durchaus erhalten, also, wie ich sie nenne, lebende. Dasselbe Verhältniss ist bei den Alb-(Nephelin) Basalten. Einzelzeichnungen Tas. XXVIII. 1-7.

In sedem Zasaltstück, besonders den leicht angewittereten, lassen sich die Pflanzen erkennen. Die Frage ist setzt nur noch: was ist Zasalt, was ist Lava?

Der Basalt ist ein Eruptivyestein: er rührt aber von Schlammausbrüchen, ebenso der Basalttuff.

Es wäre von grossem Interesse (es ist meines Wissens noch nicht geschehen), dass man die neueren Schlammaus-brüche in der Tiese, wo sie rein erhalten sind, untersucht.

11 Seldspath

Auch über dieses Mineral muss ich noch einige besondere Zemerkungen machen.

Um schönsten ist der Labrador.

Es sind Riesenpflanzen. Die blaue Färbung solgt, wie ich mich setzt an einem grossen Stück der Tübinger Sammlung überzeugt habe, vollständig der Structur der Pflanze, ähnlich der von mir im Silur von Quebec gefundenen Oldhamia antiqua. Die Streifungen und die microscopischen Linlagerungen sind auf Rechnung der Pflanze und des Pflanzen-Wachsthums zu schreiben.

Die gemeinen Feldspäthe sind von Pflanzen ganz durchzogen. Mir scheint die 2- und I gliedrige Form an die Form der Pflanze und Pflanzenzelle sich anzuschliessen. Die Grundsorm der Stammzelle im Granit ist 2und I gliedrig.

Es liegt mir ein Seldspath-Crystall auf der Tübinger Sammlung mit einem Kelch vor, dessen Spitzen ich gerade auf Släche M einschrieb.

Der Crystall ist aufgewachsen.

Das Muttergestein ist Schriftgranit, in welchem die Algen in Quarz verwandelt sind.

Man sieht nun, dass es eine Pflanze ist, ein grosser Kelch, welcher die Crystalle bildet.

In einem Fornblende-Gestein von Montreal sind

völlig entwickelte Pflanzenkelche von einem Fornblendes Erystall umschrieben.

Es wird Aufgabe der Zukunft, das Verhältniss von Crystall-Korm zur Grundform der Pflanze und umgestehrt zu untersuchen.

Perthit von Granville Canada sind die schönsten mascroscopischen Pflanzen. Ebenso gut hätte es ein Schriftsgranit werden können.

Ein Bild eines Zaupngesteins bietet Tafel XXII. Zornblende schräg, Zaupn horizontal schräffirt, das schwarze ist Magnetit, das übrige Gestein (Feldspat). Pflanze. Man sieht an dem Kelche links den Kelchstil als Crystall: einen Kelch in einen Zornblendecrystall verwandelt, zwei Brutzellen in Zaupn: ebenso an der Wurzelzelle und in diese Crystalle eingefügt das Bild der Pflanze!

12 Silur

Die Algen des Urgebirgs setzen im Silur fort. In Ouebec und Montreal habe ich eine ansehnliche Samm-lung von Zandstücken zusammengebracht. Pflanzenbilder daraus Taf. XXII. XXIII.

Von Quebec die Kalk- und Thonschichten, in Montreal Kalk und Zornblendenseiteine.

Im Silur-Kalk von Quebec sind überall die Algen noch die Gesteinsbildner, dann folgen die Lagen von Detritus alias Thonschiefer.

Der Mont real bei Montreal ist ein Zügel von Zornblende.

Ich gebe einige Pflanzenbilder auf demselben in Tafel XXIV. Aber auch hier sind nicht die Pflanzen im Gestein, sondern das Gestein ist noch die Pflanze.

In einer Kelchzelle, aber auch nur dort, fand ich die Bilder

Tafel XXIV. Figur 5. 6. 7.

Ich hielt sie für eine Diatomacee und nenne sie Diatoma Montreali

der Stadt Montreal zu Ehren, deren Gastfreundschaft ich genoss.

Die Pflanzen-Form Taf. XXIV. Sig. 2. nenne ich Varthenon Munderlohi (deutscher Consul in Montreal), der mich auf der Excursion begleitete.

Merkwürdig sind Rieselknollen, die im Silur bei Montreal gefunden werden, amöbenartige Kormen bis zur Grösse eines Kopfes, mit welchem die Anlagen des M'Gill-Colleges garnirt sind. Sie sind nichts als Stamme zellen von Riesenalgen.

Ich nenne sie Zerrn Dawson zu Ehren, der dort wohnt,

Photophoba Dawsoni.

Mögen wir uns über diese Photophoba hinüber die Zand der Versöhnung reichen.

Im Silur, schon in dem Jornblendegestein, sind riesis ge Formen. Eine Kelchzelle von 3 cm. Breite! und zwar dieselbe Form, auf welcher das Labrodorgestein gebildet ist.

Taf. XXIII. Sig. 7.

Ich nenne sie Beyrichia zu Ehren des Zerrn Prof. Beyrich. Line Art Oldhamia.

Im Silurkalk Kelche von 5-6 cm. Man sieht die Wir-kung des jetzt ausgeschiedenen Kalkes als Pflanzenbildners.

In den Unlagen von Montreal sind sog. "Fancy"-Steine, Kalk mit Protuberanzen von 30-40 cm. Durchmesser. Es sind riesige Algen-Zellen. Ich habe am Lagerplatz einen abgeschlagen, der die deutlichste Structur zeigt. Aber auch kleinere Formen gibt es, sa microscopische — das Silur ist noch vorzugsweise Pflanze. Zier beginnt erst das grosse Tierleben.

13 Rückblick

Im Silur findet die gröffte Entwicklung der Individuen statt, dagegen nehmen sie in der Zahl ab.

Durch den Kalkniederschlag schliesst sich die Urpflanze von ihrem Lebenselement, der Kieselerde, ab und nun beginnt die Aera des Thons, des Kalkes. Die Formen werden vielfältiger, seiner.

Beweis für die Entwicklung neuer Arten bei veränderter Lebensbedingung!

In der Tat sinde ich in dem chemischen Vorgany den Schlüssel zum morphologischen.

Jeder Niederschlag ist eine Uenderung der Mischung: das Jurückbleibende ist immer ein Teil, wie das Ausgeschiedene. Mit dem Laurentiankalk war der Ansang zur Entkalkung der Erdobersläche gemacht und damit zusgleich der Auflösung der Kieselerde durch das Wasser ein mechanischer Abschluss gegeben. Die alten Pslanzen, welche durch ihre Bezüge, wie ihre Ausscheidungen die Oberssläche der Erde geändert hatten, welche zuletzt in mechanischen Decken auf ihrem Lebenselemente lagern, sinden ihr Gedeihen nicht mehr wie früher. Nur einzelne Individuen überdauern die Katastrophe, entwickeln sich im Laurentian (Labrador und Jornblende), zulezt in der Kohlenperiode zu Riesen, um dann einer süngeren Genestation zu weichen.

Im Silur finden sich noch die alten Arten von Algen. Ich glaubte mein Werk nicht besser schliessen zu können, als mit Abbildungen einer Anzahl Pflanzen auf dem Silur. Allerdings nicht derer, welche man dort gewöhnlich aufgeführt sindet. Die bekannten Algen auf dem Silur sind ganz andere, als die Urpflanze, welche ich nachwies hätte man sie im Silur erkannt, so hätte sie auch im Granit und Gneis nicht übersehen werden können.

Der Granit und Gneis ist die eigentliche Pflanzenzeit unserer Erde. Im Silur schwindet die Masse der Pflanzen. Die Formen sind noch da, aber der Schlamm herrscht schon vor, welcher die Pflanze die Kieselerde zu lösen verhindert.

(Jedef Geschöpf gräbt sich selbst sein Grab!)

Nachdem auch der Kalk niedergeschlagen ist, wird die Luft das Lebenselement der Pflanze, vorher war es das Wasser.

Damit brach die Kohlenzeit an.

Die Urpflanze verkriecht sich auf die Tiefe des Meeres und verschwindet auf der Erde, setzt aber ihr Leben unter der erhärteten Obersläche sort.

Zwar habe ich noch in einem lithographischen Kalk, auf welchen ich meine Abbildungen zeichnete, einzelne wenige Sporen eingebettet gesehen. Was soll das gegen früher?

Eine wichtige Frage bleibt übrig.

Ich habe oben festgestellt, dass der Basalt Pflanze ist. Aber viele Basalte gehören der Tertiärzeit unserer Erde an.

Ich habe mir die Untersuchung auf spätere Zeiten aufsparen wollen, nehme sie aber doch lieber sogleich vor.

Ich untersuche

Basalt von Biberich.

Zasalt von Neuhausen, Urach,

Zasalt von Kirchheim,

ersterer Feldspat-, beide letztere Nephelin-Basalte.

Unfangs glaubte ich, letztere enthalten todte Pflanzen oder Pflanzen-Reste, bald überzeugte ich mich vom Gespenteil — auch der sog. Nephelin-Basalt ist ein Pflanzen-Gestein mit lebenden Pflanzen (wenig todte Reste.) —

Dies fordert zu neuen Gedanken auf.

Die Pflanze zur Tertiärzeit musste einen langen Weg machen und kam lebend zur Oberfläche!

Die Urpflanze lebte also in der Nacht, sie lebt heute noch dort und bedarf zu ihrem Wachsthum nur des Wassers.

Dies fliesst ihr von der Oberfläche zu.

Wir leben auf einer groffen Sargasso-Decke.

Dass dies so ist, beweisen die wellenförmigen Erdbeben, beweisen die Vulkane.

Die Vulkane kommen mit ihrem Meere, gehen mit ihrem Meere.

Alle unsere tätigen Vulkane liegen nicht zu entfernt vom Meere.

Beweis, dass sie dem Wasser ihre Entstehung verdanken.

Die Tätigkeit des Erdinnern muss eine organische sein, eine unorganische wäre nicht denkbar. Denn alle möglischen blos chemischen Verbindungen hätten längst vollzogen sein müssen. Ohne Zinzutreten eines neuen Stoffes wäre eine Tätigkeit nicht möglich. Dieser Stoff kann kein anderer sein, als Luft oder Wasser. Die Luft ist es nicht, wenigstens blos an offenen Stellen, an schon entstandenen Vulcanen wird sie von geringer Bedeutung.

Auch die früheren wirklichen Revolutionen der Erste hatten ihren Grund in der organischen Tätigkeit der Urpflanze.

Zeute noch wuchert sie unter der festen Erdoberfläche, bildet Gase, und so entstehen die Erdbeben, die Vulcane.

Die Vulcane sind nicht feuerbrände im Innern der Erde. Vielmehr sind es blos Gase, welche beim Austritt aus der Erde sich rückwärts entzünden, mechanisch wirken und dabei das anstehende Gestein schmelzen. Lava.

Daher die periodische Tätigkeit, der Anfang derselben blosse Gasausströmungen. Erdbeben.

Estönnen sich leichtbrennliche Gase bilden, welche wie die schlagenden Wetter sich entzünden und dann bei fortwährendem Zuströmen fortbrennen.

Eben diese Urt der Tätigkeit in Verbindung mit Erdschwankungen spricht dafür, dass die von der Pflanze auß

geschiedenen Gase dem Ventile zuströmen und dort verbrennen, bis der Vorrath erschöpft ist.

Alles dies ist blos mittelst des Wassers möglich.

Der Zasalt ist einer der letzten Schlammausbrüche. Uusbruch der damals wenigstens sicher noch lebenden Urpflanze.

Die Steinkohlen kommen nicht von den Equiseten der damaligen Zeit, sondern verdanken ihr Dasein den Kohlen-Gasen auf den unermesslichen Lagern der Urpflanze. Daher auch das Fehlen der Kohle im Granit: Linschlüsse von Kohlensäure, Anthracit und Graphitlager sind noch davon übrig.

Jedes Meer der Erdzeiten hatte seine eigene Vulcane sie sind aber erloschen, sobald das Wasser seinen Ort wechselte.

Jüngerer Granit? älterer Granit? Geburtstay — Zeugungstag. Verwandtschaft des Granits mit dem Trachyt.

Gibt es Crystalle ohne Pflanzen?

Der Diamant (dafür spricht seine Form) ist Fällmasse von Pflanzenkelchen.

Die Erdwärme rührt nicht von unterirdischem Feuer her, sondern von chemischen Processen daher keine Ungst vor der Erkaltung der Erde, solange Luft und Wasser sie umgiebt.

Ich untersuche einige »Vulkan-Gesteine« und sinde Roca Pichincha von Ouito — lebende Pflanzen. Zauyngestein von Tomlada-Lazio — lebende Pflanzen.

Abbildung Tafel XXII.

Schräg schraffirt Jornblende, gerade schraffirt Jauyn, dunkel Eisen. Zell gezeichnet weisse Glaf oder Feldspatmasse.

Wunderbare Zusammenfügung von Pflanze und Crystall!

Ich nenne diese Pflanze zu Ehren Sr. K. Zoheit des Kronprinzen Rudolph von Vestreich, des eifrigen Natursforscherf,

Stygia Rudolphi.

Die Laven sind wirklich todte Gesteine, sie enthalten blos Leichen von Pflanzen.

Abgerissene Stücke.

Sphaerulit hat macroscopische Pflanzen, todte eingebettet.

Perlit von Untisana — lebende Pflanzen. Phonolit lebende Pflanzen.

14 Die Ergebnisse dieser Entdeckungen

Perlit von Untisana — lebende Pflanzen. Phonolit lebende Pflanzen.

Die Ergebnisse dieser Entdeckungen sind bedeutend.

Wir dürfen uns nun die Erdobersläche beim Zeginn des organischen Lebens sedenfalls nicht mehr als von einem heissen oder gar seuerslüssigen Granit, oder Gneisbrei bedeckt denken. Denn dieser Brei, welcher so lange die Phantasie der Geologen beschäftigte, bezüglich dessen sie sich nur darüber stritten, ob derselbe seuerslüssig oder wasserslüssig gewesen sei, (was man denn auch in die ganz unrichtige Fragesorm sasser des Brei muss setzt einer anderen Porstellung weichen.

Da war von den ersten Atmosphäreniederschlägen Line grosse See über die ganze Erde, in dieser wuchsen Oflanzen in undenkbarer Menge, und zwar die niedersten Arten einer einzelligen Alge oder Flechte.

Diese Pflanzen, die Erzeugnisse der Verbindung des ersten Wassers mit der Erde, bauten sich in Rieselzellen auf, setzten neue Zellen an, starben ab, und das wurde die erste Erdschichte!

Leider haben sie die Erde selbst dem Geologen auf ewig bedeckt. Damit, dass der Basalt als Pflanze nachgewiesen ist, ist sede Zoffnung verloren, semals das Erdinnere Kennen zu lernen.

Diese Pflanzen des Granits müssen ein grosses Volum eingenommen haben, sie bildeten schon im Unfang ihres erstaunlichen Wachsthums Berge und Zügel in der See und diese Berge und Zügel wurden zu unseren heutigen Granit und Gneissbeirgen. Daher die Sächer, die Kuppel-Formen.

Die Gneisbildung war einzig und allein die Folge das von, dass die Schründe, Risse und Tiesen der ursprüngslichen Erdoberfläche durch Tange, Schlamm ausgefüllt waren. Tun erst konnte sich ein eigentliches regelmässiges Sediment bilden.

Es war möglich, wenn eine ebene Grundlage geschaffen war.

Indessen bildeten sich die Pflanzen in der Form weiter.

Wo die Ablagerung eine ursprüngliche, das Wachsthum der Pflanze ein ungehindertes war, sinden wir Gneis in seinen verschiedenen Formen.

Aber es gab auch Stellen, wo Detritus sich ablagerete. Zier entstand aus den Leichen und dem Schlamm des Granite und Gneismeeres der Porphyr.

Allerdings nicht ohne eigenes Leben. Aber das Leben darin ist viel kleiner. Die Formen sind meist microscopische, eine Masse abgerissener Leichen (ohne Zusammenhang mit dem Pflanzenstock) sinden sich. Dagegen haben sich auch Crystalle außuscheiden angefangen.

Man hat sich gewiss schon oft im Stillen wenigstens darüber gewundert, warum im Granit und Gneis der Ouarz nicht crystallisirt, sondern blos in (wie man glaubte) ganz willkürlicher Form vorkommt.

Der Grund ist, weil der Quarz und Feldspat des Granits und Gneises in einen Pflanzenleib gebannt ist. (Zier sind blos die Anfänge einer Crystallisation.) Er ist Produkt der ersten organischen Tätigkeit der Erde. Im Porphyr war er frei und so sehen wir aus der Pflanzenthätigkeit den Stoff der künftigen Crystalle hervorgehen (wie den Apatit, Kalk aus den Gneispflanzen).

Es wäre sehr wichtig, setzt die Entstehung bedeutender Mineralien (einschliesslich der Erze) in diesem Zusammenhang zu erforschen.

Die meisten Minerale sind wol Produkte organischer Tätigkeit, sofern durch letztere der chemische Process wenigstens eingeleitet wurde, der zur Entstehung der Minerale führte.

Diese Tatsachen erklären auch die "Linschlüsse im Ouarz und Feldspat" einzig genügend, besonders was die Regelmässigkeit der Lagerung betrifft, zerstören aber sofort die Zypothese vom ungeheuren Druck, welcher die Kohlensäure darin zusammengepresst hätte.

Wenn ich also setzt sage: Granit, Gneis, Porphyr sind kein Urgebirge, so heisst dies richtiger gesagt:

Die Bestandteile dieser Gebebirge Quarz, Feldspat, Glimmer sind in ihrer jezigen Form in Folge der organischen Arbeit der Erde ausgeschieden und wieder zusammengelagert. Das führt auf die Frage: was war vorher das Da sind wir allerdings durch meine Entdeckungen nur in soserne besser daran, als wir setzt wissen, dass Etwas, nemlich das Urgebirge, "im Ansang" nicht da war, also auch entstand wie das übrige Sedimentgebirge. War es meteorsteinartige Masses

Wir müssen also unsere Zuflucht wieder zur Beobachtung nehmen.

Was die Erde heute noch auswirft, Augit, Feldspat in der Lava ist der Kern der Erde, allerdings ist es aber auch zweiselhaft, ob ganz in dieser Form, ob die Masse nicht auf ihrem Wege zum Lichte selbst schon Beimischungen erhalten hat, ob nicht die Metalle, insbesondere das Eisen (nach dem Gesetz der Schwere) wenigstens teilweise davon zurückgeblieben sind.

Meine Entdeckungen nöthigen nun zu einer besseren Erforschung und Erklärung der Tatsachen bezüglich des Erdinnern.

Ein Wunsch, den ich daran anknüpsen möchte, ist der: nicht ohne Erforschung, ohne ganz gründliche Versuche Zypothesen auf Zypothesen zu häusen. Ich gestehe, ich schlich mich sedesmal auf der Gesellschaft fort, wenn die Rede auf die Vorgänge in der Granitzeit kam und von diesen natürlich fürchterlichen Revolutionen mit einer Sicherheit gesprochen ward wie von einem Theaterstück, das man von der I. Gallerie aus mit ansah. Es gibt in der

Tat nichts wohlseileres als solch wichtige Besprechungen, aber auch keinen endloseren Streit als diesen.

Überhaupt möchte ich dringend rathen, den Weg der Beobachtung, des Versuchs noch lange nicht zu verlassen.

Seit der Aufstellung der Darwin'schen Sätze, welche aber durch tausend Beobachtungen, also Tatsachen, bespründet waren, glaubt Jeder Sätze aufstellen zu dürsen — ohne Beobachtung. Damit ist die Wissenschaft selbst und zwar nicht unverschuldet in starken Misseredit gekommen, sie hörte eben auf, die eracte zu sein und siel damit in einen Sehler, welchen sie an einer andern Wissenschaft rügte.

freilich, man braucht auf das Denken nicht zu verzicheten. Man kann auch im Kämmerlein sich seine Zypothesen machen. Über man hüte sich, auf 2, 3 Tatsachen das Weltganze erklären zu wollen.

Auch die Freude an dem grossen Vaturleben (am Ganzen) will ich nicht verderben. Im Gegenteil, ich möchte sie erst erweitern. Dieses ist nur möglich nach redlicher Arbeit am Ganzen. Dies ist die Beschäftigung mit dem Einzelnen, eine Beschäftigung, die nie ermattet und die grosse Schuld der Zeiten sandkornweise tilgt, diese Arbeit gibt uns allein einen wahren wissenschaftlichen Einblick ins Ganze.

15 Sandsteine

Die Zuronian-Formation ist, wie ich vermuthe, ebenfalls eine Pflanzenschichte, wie die meisten Sandsteine.

Sicher, dass es Pflanzenschichten sind, weiss ich vom Zuntensandstein, Lettenkohlen- und Keuper-Sandstein.

Uls ich nemlich in Tübingen zur Druckerei ging, fand ich ein Stück Stubensandstein, etwa 6 cm. Durchmesser mit den deutlichsten Kelchen. Die Staffel des Zauses von Kneuper-Sandstein zeigte Pflanzen von I/2 Mtr. Länge.

Die Rampe des Zahnhoff von Lettenkohlen-Sandstein ist durchauf Pflanze, wie auch daneben das Pflaster von Zonebed-Sandstein.

Wie hundertmal bin ich schon über diese Platten und Undere sind noch öfter darüber gegangen.

Ju Zause untersuchte ich Dünnschlisse von Zuntemsandstein und Keuper. In ersterem fand ich Kelch an Kelch (von länglicher Form), in letzterem ebenso kleine rundliche Kelche, beide microscopisch. Die Kelchzellen im Zunten Sandstein von Glimmer! Prachtvoll.

Zier ist also die Pflanze überall mit Quarz ausgefüllt. Daher Sandstein!

Wie einfach nun Alles.

Statt Strömen von Meeren ruhige Pflanzen-Seen.

So wird noch auf mancher haarsträubend geschilderten, ja sogar abgebildeten Revolution auf der Erde, wie sie unsere Geologen mit Vorliebe vorführen, ein stagnirendes Wasser.

Wo Platten und regelmässige Schichten-Ablagerungen sind, muss immer an Pflanzen gedacht werden. Die Pflanze ist ein zerbrechlicher Stoff, daher der schieferige Abgang.

16 Meteorstein

Meteorstein von Knyahinya vom 6. Juni 1858.

Wieder war meine Urbeit geschlossen, als ich nochmals meine Schlisse vornahm, um einzelne Gesteine wie Gabbro zu untersuchen.

Ich war mit der Durchsicht am Schluss und hatte mich schon herzlich gefreut, auch in dem Gabbro-Gestein dieselben Pflanzen gefunden zu haben, wie im Granit, — da waren noch 4 Meteorsteine übrig.

Der Zweck, der mich beschäftigte, war, organische Linschlüsse zu sinden. Sollte ich die Meteorsteine ansehen? Ich fürchtete mich fast, so töricht zu sein und in der Tat vor einigen Tagen hatte ich die Schlisse für jetzt als werthlos zurückgelegt.

Endlich entschloss ich mich doch.

Der erste Schliff von einem Stein der Tübinger Sammlung (ganz klein) mit vielen Olivinen zeigte bestenkliche Kormen.

Der zweite ebenfalls mit ziemlich viel Olivin zeigte Pflanzen und zwar Pflanzen mit solcher Sicherheit, dass nicht der kleinste Zweisel blieb.

Der Stein ist von Knyahinya 6. Juli 1858.

Die Schnittfläche ist etwa 70 mm.

Das Aussehen grau-grünlich, man sieht kleine metallissche Punkte, ferner zwei durchsichtige Stellen: im Mis

croscop zeigt er gelb und grauliche Färbung mit schwarzen Einlagerungen.

Die Kormen, welche ich feststelle, sind folgende:

Urania guilielmi

zu Ehren unseres Kaisers. Taf. XVII.

Die Pflanze steht zwischen Alge und Farn.

Ein kreisrundes gewölbtes Blatt.

Von dem Stammzelle-Unsatz gehen I2 Samenzellen aus, welche am Rande des Blattes mit einer runden Oeff-nung endigen.

Um oberen linken Teile steht eine neue Zelle an.

Der Stamm wächst auf einem runden Kelche und ens digt dann mit einer Wurzelzelle. Un demselben Stamm sind mehrere junge Zellen ausgewachsen.

Die farbe des Gesteins ist ein Smalte-Grau.

Das Bild ist bei 90 facher Veryrösserung gezeichnet.

Auf beiden Seiten unten sind Vergrösserungen der Zellen bei 250 und 750. Die Zellen sind von unmessbaren schwarzen Punkten eingefasst.

In der Nähe der Pflanzen ist ein Prothallium von derselben Farbe wie das Blatt, offenbar Urania anythörend.

Aber der ganze Schliff ist nichts als Pflanze.

Urania ist in 8 sehr schönen Exemplaren darin.

Um schönsten aber ist ein Durchschnitt der ganzen Pflanze in der Mitte des Schliffs. Aun die Frage, wie verhält sich die Form der Urania zu denen der Erde?

Dieselbe Pflanze sindet sich nicht. Aber die ganze Structur unserer lebenden Algen oder Farne ist da.

Der Dünnschliff enthält hunderte von Pflanzen.

Ich nehme nun meine Dünnschliffe vor.

Junächst untersuche ich einen Olivin vom Allenthal (von Neumann in Freiberg). Dieselbe ist durchzogen von schlingpflanzartigen Algen mit einigen deutlichen Fruchtorganen.

Merkwürdigerweise zeigt Ar. 2. Meteor-Dünnschliff Tübinger Sammlung (Fundort unbestimmt) ähnliche Pflanzen.

Doch halt —

Der ganze Schliff ist eine Kelchzelle (das übrige Material ging beim Schleisen zu Grunde). Taf. XXVI. Sig. 2. in natürlicher Grösse. Sig. 4. (Lupe).

Dieser Dünnschliff ist völlig durchzogen mit einer schlingpflanzartigen Alge (wie ich sie in den Algen des Laurentian-Serpentins beobachtet habe).

Die Masse ist Olivin.

Um Rande des Kelches sitzen graue Kelche. Taf. XXVI. Hig. 5. 6. 7. 8.

Die Schlingalge ist dunkler Olivin, metallisches (gestiegenes) Eisen ist überall ausgeschieden und bildet nun die Prothallien.

Vielfache Copulation.

Die Erhaltung ist ausgezeichnet.

Ich nenne sie

Zeliola Caroli

unserem Könin zur Ehre.

Ein weiterer Schliff (Fundort unbekannt) Taf. XXVI. Sig. 9. natürliche Grösse. Sig. I. u. 3. Teile 1/90.

Meteorstein von Pultusk

Taf. XXVII. 3. 1/2. Der ganze Schliff.

Desgl. I. u. 2. 1/90.

Veryleiche Taf. XXVIII. Sig. I. Basalt.

Dhurmfala I/90. Taf. XXVII. Sig. 7.

Zainholz. Taf. XXVII. 9. u. 10. 1/2.

Diese Pflanze nenne ich dem mit Unrecht vergessenen schwedischen Naturforscher Imanuel von Swedenborg zu Ehren:

Sphaerothallium Swedenborgi.

Ensisheim. Taf. XXVII. 4. I/2.

Schliff auf der Tübinger Sammlung.

17 Meteoreisen

Nachdem der Meteorstein von Knyahinya und andere untersucht waren, nahm ich Meteoreisen vor.

Uls sicherstes Kennzeichen des ächten Meteor-Lisens geleten die Widmannstättischen Siguren.

Thre wahre Gestalt geht auf Tasel XXIX. Sig. 19. (Meteoreisen von Toluca) hervor. Es sind Pslanzen und nichts als Pslanzen. Pallaseisen.

Besonders merkwürdig!

Die Olivine sind die Kelchzellen.

Das Schweseleisen die Füllmasse (Mark), das dunkle Eisen das Jolz (wenn der Ausdruck erlaubt ist), dass weisse Lisen die Zell-Membrane der Meteoreisen-Pflanze.

Die Crystallform ist ganz sicher hier zugleich Pflanzenform. (Siehe v. Kokscharow, Materialien zur Mineralogie Ausslands Taf. 75. 76.

Es stimmt das specifische Gewicht der Erde mit dem Gestein, oder vielmehr Metall der Meteoriten.

Die Pflanzen gleichen wenigstens den tellurischen: inse besondere der "acervulinen Form" des Cozoon.

Ob diese Meteoreisen und Steine nicht Teile der Erde sind, welche in frühester Zeit losgelöst und ihren eigenen Weg eine Zeit lang genommen, später aber sich wieder mit der Erde vereinigt haben?

Wie aber können Pflanzen Eisen werden?

Können sie Eisen, Olivin sein?

Die Erhaltung der Formen, wie sie im Leben sind, eine solche Erhaltung der Organe ist wirklich wunderbar, und könnte zu letzterer Meinung führen.

Im Zornblende-Gestein von Montreal sind Teile der Pflanze metallisches Lisen.

Ich nenne die Pflanze des Meteoreisens von Toluca Ustrosideron Quenstedti

zu Ehren meines Lehrers, die des Pallasits zu Ehren des Kaisers von Aussland:

Mexandrea.

Gibt es nicht Protisten von Mineral und Pflanzen, wie von Pflanze und Tier?

Es ist die Übereinstimmung der siderischen und tellurischen Pflanzen zu untersuchen.

Nun ist ein sicheres Erkennungkeichen für Meteoreisen gegeben.

Das Lisen auf dem Zasalt von Grönland ist nichts als Pflanze, ist also Meteoreisen.

18 Die Urzelle — Crystall-Pflanze — das Tier

Bis setzt hatte man keine Kenntniss von der wirklichen Form der Urzelle. Erst im Laufe meiner Untersuchung wurde sie mir klar und klar, dass sie auch die Grundsorm des thierischen Körpers sei. Dies geschah aber erst, nachdem ich Alles Bisherige gesehen und geschrieben hatte.

Man wusste nur, dass die Zelle eigentlich die Linheit des thierischen Körpers sei, dieser aus sener zusammengesetzt wird.

Man kannte eine Unzahl Formen dieser Zelle, man kannte Verbindungen dieser Zellen zu Gefässen und Organen. Aber ein Ding, welches Urzelle und Urbild auch des menschlichen Körpers sein könnte, davon hatte man keine Ahnung.

Dieses Urbild glaube ich in der Urzelle entdeckt zu haben, deren Wachsthum ich auf Tasel XVIII. dargestellt habe. Die Weiterentwicklung derselben ist die Figur Tas. I. und Tas. XVIII. 8. XIX. 3. Die nähere Begründung später.

Die Entstehung der Urzelle, das bemerke ich hier, rauss mit dem Stoff im Zusammenhang stehen. Sie entstand aus dem Stoff der Erdoberfläche in Verbindung mit dem der Utmosphäre, des Uethers. Die Stoffe sind verbraucht, sind in andere teilweise unlösliche Formen übergeführt und so ist eine Zwischenwand zwischen Utmosphäre und dem Erdinnern geschaffen, eine Absperrung, welche eine sortdauernde Erzeugung derselben im früheren Maase unmöglich macht.

Die Bau-Stoffe sind durch das festwerden der Erde andere geworden und das Wachsen in der Menge ist abgeschnitten, andere Urten entstanden auf anderen Stoffen.

Die Urzelle hatte (solange ihr der Zaustoff zu Gebot stand) die Kähigkeit, sich ins Unglaubliche zu vermehren, aber auch die Kähigkeit sich zu entwickeln.

Doch vor Allem ihre Grundform.

Was ich als Ansang gefunden, ist eine halbkugelige Schaale, deren Baustoff nichts anders sein kann, als ein Silicat.

Ich möchte übrigens die Frage hier offen lassen, ob die erste Korm nicht blos ein Plättchen ist, das sich zur Zalbkugel erst entwickelt. Da diese ganz einfache Korm ihrer Natur nach sehr schwer nachzuweisen ist, so möchte ich diese Krage der Zukunft überlassen. Soviel ist aber gewiss, die erste Zelle tritt bald als eine Zalbkugel auf.

Ist sie nach oben, oder nach unten gerichtet?

Ich habe auf Tafel XVIII. die Entwicklung der Zelle in ihrem ersten Stadium abgebildet.

Ich möchte auch die Frage offen lassen, ob das, was ich als den Unfang bezeichnet habe, wirklich das erste Stadium der Entwicklung ist: ob also nicht die erste Zelle nach abwärts gerichtet ist und dann erst der zweite Abschnitt der Zell-Bildung, nach oben, eintritt.

Ich habe einige Tatsachen beobachtet, welche dafür sprechen.

Im Kalk stehen die Jellen, so lange die Pflanze im Kalk wächst, nach unten: erst wenn sie aus dem Kalk hervortreten, entstehen die Jellen, welche sich nach oben richten. Das lässt sich bei grösseren Arten beobachten, welche den Serpentin durchsezen, also in die Lust- oder Wasserschichte eingetreten sind.

Ob die Zellen im Licht oder Wasser gelebt haben? Im Laurentian waren es Wasserpflanzen.

Nun wir haben als form eine Zalbkugel.

Un dieser bildet sich ein Ansatz, Wurzelzelle. Die Zelle wird zum Trichter. Der Trichter schnürt sich ab: dadurch entstehen Stamm-Zellen: die letzte ist die Kelchzelle, welche der eigentlichen Fortpflanzung dient. Das hindert aber nicht, dass sich überall an der Zelle Ansäze zu neuen Zellen und neue Zellen bilden.

Die Quer-Durchschnitts-Korm der Zelle ist die runde.

Ob ein Gesetz ihre Länge beherrscht, ist zweiselhaft, eine Grenze hat das Wachsthum, aber nach welchem Gesetz ist nicht sicher.

(Unwendung auf die Säule im Crystall).

Ich glaube annehmen zu dürfen, dass ein solches Gesetz besteht. Das Pflanzen-Individuum hat im Kelch seinen Abschluss gefunden. Ich muss solche Fragen offen lassen.

Es schnüren sich aber auch weitere Zellen innerhalb der Zelle ab. Es erfolgt eine Teilung in zwei Reihen und sofort.

Die Teilungkelle ist ebenso gut Kelch als Stammzelle.

Wir haben also die Wurzel, Stamm und Kelche (Ende)Zellen der Urpflanze.

Die einzelnen Jellen sind zugleich Crystalle und bleiben es nach dem Tode dadurch geht die Pflanze in das Mineral über.

Die eigentliche Pflanze ist da, sobald eine Zelle ein selbständiges Ganze auf der Zaustoffmasse sich abscheidet.

Auf dieser entsteht dann, indem sie sich vom Boden loslöst und ihre Nahrung nicht durch die Wurzel vom Boden oder durch den Kelch auf der Luft, dem Wasser zieht, was nach oben oder aussen offene Nahrungsorgane voraussetzt — das Tier. Die Bewegung ist eine Folge davon.

Titanuf Bismarki Tafel XII. XIII. ist ein Schlauch, der sich seststen, aber auch frei bewegen kann, der seine Nahrung nicht mehr auf dem Stein, der Erde, zieht, sondern frei wählt, sich nach der Nahrung bewegt.

Damit glaube ich auch den Begriff des Tiers einigers massen festgestellt zu haben.

Die Urzelle besteht auf Wurzel, Stamm und Kelch-Zelle. Es sind die 3 Johlräume des organischen Körpers, welche auf dem Weg der Abschnürung entstehen.

Was freilich diese Abschnürungen, diese Entwicklung bewirkt, wissen wir nicht.

Der Crystall ist die mit dem Entstehen stillstehende, abgeschlossene Zelle: die Pflanze — wächst — bleibt aber mit der Erde in Verbindung, das Tier wird, wächst und löst sich zu selbständiger freier Bewegung los.

Auch dies sind blos Entwürfe, Grundlinien. Möge die Zukunft sie bestätigen und verbessern.

19 Der Krystall

Ich habe schon oben zur Untersuchung darüber aufgesfordert, ob der Crystall wenigstens mit der Ur-Pflanzenselle nicht in einem gewissen Zusammenhang stehe.

Unsere Abbildungen Tab. XXII. XXVII. Sig. 5. 6. 8. legen die Frage nahe, ob der Crystall auf der Pflanze, oder die Pflanze auf dem Crystall entstanden sei.

Soviel aber ist mir sofort klar: wir müssen unsere Crystalle einer neuen Prüfung unterwersen, nemlich in der Richtung, ob wir es wirklich mit Crystallen zu thun haben.

Ich habe gezeigt, dass gewisse Crystalle (Granit, Leusit etc.) Füllmassen von Pflanzen-Zellen sind. Daher also auch wohl das Gesetz der Symmetrie. Dieses ist nicht ein Gesetz der Molecüle, sondern der Pflanzen-Symmetrie, der Pflanzenzelle.

Vor Allem den Augenschein.

Ich nehme eine Reihe Crystalle vor.

Das Ergebniss ist:

Die Crystallform ist eine Umschreibung der Pflanzenform in der Art, dass sich überall eine Pflanze in dem Crystall eingezeichnet sindet, oder der Crystall um die Pflanze liegt.

Quarz. Tafel XXX. 9. 10.

Ich finde in zwei dünnen Quarzen die Figuren der Urpflanzenform ein, aber auch auf der Seite aufgezeichenet. Die Einschlüsse und gewisse dunkte und helle Stellen bezeichnen die Gestalt der eingelagerten Pflanze.

Die matten flächen des Quarzes auf dem Diheraeder, welche als zwillingsbildung gedeutet wurden, sind Pflanzensormen. Sig. 14. Die gewundenen Quarze verdanken ihre Gestalt der spiraligen Zellstellung der Pflanzen.

Urayonit, Zerrengrund. Zwillinge, Drillinge. Tafel XXX. 5.

Uuf der geraden Endfläche sind soviele Pflanzen als Crystalle.

Das Merkwürdigste ist die Säule.

Der Mittelpunkt der Säulenfläche fällt mit dem Kelchmittelpunkt der Pflanze (gegen den Beschauer gestehrt) zusammen. Sig. 3.

Ein Pflanzen-Individuum und zwar das erste, streckt die Kelchspitze in den Kelchhals des zweiten und so fort. Dieser Pflanzenkelch liegt also wie ein Kranz in der Mitte des Crystalls horizontal und berührt dessen Peripherie.

Ein Wunder, aber wahr.

Corund. Saphir. Sig. II. 12.

Der Corund ist die Ausfüllung eines Pflanzenkelchs. Ein Saphir auf der Tübinger Sammlung zeigt dies deutslich.

Er ist in der Mitte horizontal gebrochen. Die Bruchfläche zeigt den Pflanzenkelchdurchschnitt. Die Ecken legen sich in die Spitzen des Kelches.

Die Kelchblätter selbst sind in Glimmer verwandelt.

Pinit. Taf. XXX. Sin. 15. 16.

Soviel Pflanzen, soviel Säulen. (Wahrscheinlich dasselbe Gesetz beim Turmalin, überhaupt bei der Säulensform.)

Auf der unteren Endfläche der Säule ein Zäpschen (Wurzelzelle), auf der oberen Endfläche ebenso.

Auf jeder Säulenfläche eine Pflanze.

Smarayd, Beryll. Ebenso. Tasel XXX. Sig. 13.

Kupferglanz. Sig. 2.

Mehrere Crystalle an einander gewachsen nach dem Gestetz der Zellbildung.

Die oberste grösste ein Kelch mit eingeschriebenen Linien.

Die "dendritische" form der Metalle wahrscheinlich Pflanzen-Grundform.

In einem Meteorstein eine Pflanze in Aickel verwandelt.

Diamant.

Kelchauffüllung: schliesst Brutzellen ein.

20 Schluff

Ich glaube, man kann drei Zeitalter der Erde annehmen, das Alter des Siliciums (der Kieselerde), das des Alluminiums (des Thons), das des Calciums (des Kalks).

Solange der gröffte Teil des Lebens unter Wasser war, mussten natürlich die Lebensvorgänge auch andere sein, als heute, wo die meisten Pflanzen-Arten wenigstens Luftspflanzen sind, und auf einer Erde sich nähren, welche in keiner Weise ebenso gedacht werden kann, wie die Erdsobersläche vor der ersten Pflanzenentwicklung.

In den Granitpflanzen scheint die Umwandlung die gewesen zu sein, dass auf der todten Pflanze die Stosse ausschieden, welche in Gas, oder in Wasser-Lösung sich überführen liessen und dass dann (vielleicht erst zur Gneiszeit) das Wasser seine in Lösung befindlichen Silicate etc. in den Zellen absetzte.

Mit Aücksicht hierauf habe ich auch die schwarze Farbe der darauf folgenden Thonschiefer, welcher meist von Kohlen herrührt, ferner die mächtigen Graphit- und Unthrazitlager im Granit und Gneis und die Steinkohlenschichten selbst erklärt.

Nach f. v. Zochstetter hat der Urkalk von Zöhmen bituminösen Geruch!

Es wäre in der Tat merkwürdig, dass von den Tangen, welche nach anderer Meinung 50 M. mächtige Kohlen-

schichten hinterlassen konnten, nicht Eine Pflanze erhalten ist.

Sind die Tange im Silur erhalten, so müssen sie noch viel mehr im Kohlengebirge sich auffinden lassen, vorausgesetzt, dass sie da sind.

Man findet aber dort eben keine Tange mehr, sondern blos den geschichteten Kohlenstoff.

Wenn man genau untersucht, ist der Kohlensandstein ebenfalls ein Pflanzen-Lager, das aber nicht hinreicht, um die Kohlenslöze zu erklären und desschalb erkläre ich letztere aus dem von der Granitpslanze ausgeschiedenen Kohlenstoff. Diese Pflanzen sind richtige Tange. Kommen sa solche Kohlenslöze nach Mohr schon im Porphyr vor, der nach meiner Deutung nichts ist, als der erste wahre Schlamm dieser Erde mit eingebetteten lebenden Pflanzen.

Wenn Meteorsteine als Pflanzen, oder wenigstens die Pflanzen im Meteorstein nachgewiesen sind, so könnte das erste Leben unserer Erde auch von einem anderen Planeten auf die Erde übertragen worden sein.

Schöner als im Graphit von Piemont (die Ltikette hat in Klammer Passau?) habe ich die Pflanzen-Zellen nicht gesehen. Sie sind wahrscheinlich in Feldspat er-halten. Der Graphit selbst aber ist auch eine Pflanze, und nicht etwa Mayma, in welchem die Feldspat-Pflanze liegt.

Ist dies vielleicht nicht der Unfang von Pflanzen der heutigen chemischen Zusammensetzung?

Diese Frage soll eine offene sein.

Man lese F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, I. Band, über Graphit Seite 352, über Unthracit Seite 355 und vergleiche das dort Gesagte mit dem Ergebniss meiner Untersuchung, so wird sich das Geheimniss der Unthracitslöze im Granit und Gneis lösen. Zirkel ist, wie ich, der Unssicht, dass sich die Färbung der jüngeren Gesteine durch Unthracit erkläre.

Woher sollen diese Anthracit-Layer kommen, wenn der Granit nicht Pflanzen enthält, oder Pflanze war?

Ich halte wenigstens dafür, dass es keine einfachere Ersklärung für ihr Entstehen giebt.

Ich muss noch einmal auf die Verschiedenheit der Gesteine, welche man Serpentin nennt, hier zurückkommen. In dem canadischen Gneis Serpentin ist das ursprüngliche Mineral wahrscheinlich Olivin oder Augit. Die Lager von Serpentin sind sicher Auslaugungen, Niederschläge aus wässeriger Lösung. Pikrolith etc. sind ebenso unzweistelhaft wässerige Niederschläge, während in dem Serpentin von Snarum noch die Gestalt des Olivins sich erhalten hat, was Ouenstedt so überzeugend nachwies. Freilich may sener Olivin schon Pflanzen eingeschlossen haben und daher die eigenthümliche Textur.

Der Umstand, dass unkundige Leute alle grünen durchsichtigen talkerde- und kieselerdehaltigen Minerale Serpentin nannten, kann natürlich zu nichts weiterem führen, als dass man die Serpentine nunmehr genauer untersucht und unterscheidet. Veryl. über Serpentin v. Draschke in Tschermak Mineralogische Mitteilungen I. 1871. S. 1. Kennt man die Form der Urpflanze, so wird es leicht sein, die ursprünglichen Serpentine und die abgeleiteten zu unterscheiden.

Man hat den Pflanzen überhaupt noch sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Noch in den 50 ger Jahren sprach man kaum von Pflanzen (Algen) in dem obern Übergangsgebirge. Erst im Kohlengebirge waren sie wirklich anerkannt.

Wer sich mit dem Gegenstand, welchen ich vorgelegt habe, beschäftigen. will, muss zuerst das Silur genauer ansehen und sich hier davon überzeugen, dass die Korm, welche ich schon im Laurentian nachgewiesen habe, im Sielur millionensach vorkommt. Der Riesensorm im Marmor von Carrara habe ich schon erwähnt. Man muss mit Einem Wort sich mit dem Gegenstand erst vertraut machen. Oldhamia antiqua ist schon ein gutes Object für die Studien.

Zat man aber die Form dieser Urpflanze einmal sestyestellt, so wird es ein Leichtes sein, sie in den früheren Formationen zu erkennen.

Ich möchte die Forscher dort hauptsächlich auf die besser erhaltenen Brutzellen und darauf aufmerksam maschen, dass die Zellscheidewände stets durch schwarze Punkte, nämlich zurückgebliebene Kohlen, manchmal sogar durch Kohlensäure-Linschlüsse angedeutet sind. Nimmt man den Polarisationsapparat zu Zilse, so wird sede Zelle, welche so abgegränzt ist, auch verschieden polarisiren, weil die Lage des Gesteins in seder Zelle eine verschiedene ist.

Freilich das gebe ich zu, dass ein Teil des Pflanzen-Gesteins in Folge späterer Vorgänge auch unkenntlich wird. Ein zersetzter Granit kann nie als Untersuchungs-Material verwendet werden.

Der gelbbraune "Alabaster", welcher von den Italienern in Vasen, Statuetten in den Zandel gebracht wird, ist eine Pflanze. Unser Keuper, Muschelkalkypps ist es.

Ich erstaunte, als ich den Linwurf hören musste: "Wie auf den Bestandteilen einer Pflanze: Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, in den Kelchen Kieselerde, Thonerde, Kalk, Bittererde, Lisenoppd entsteher" Alls ob dies die Frage wäre.

Einmal sind die Bestandteile keiner Pflanze bloß Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff: das Knochengerüste von Kiesel, Kalk, die Aschenbestandteile sind vergessen, vergessen sind die Kiesel-Skelette der Diatomaceen, die Kieselzellen der Equiseten etc. Zier wird sicher nicht aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff Kieselerde, sondern die Kieselerde ist durch die Pflanze hindurchgegangen, von der Pflanze abgelagert.

Man vergleiche Nägeli und Schwendener, das Mis

croscop (1877) S. 488.

Nun glaube ich aber eben mit der Serpentinpflanze nachgewiesen zu haben, dass sogar an die Stelle der Urpflanze, mag sie bestanden haben, aus was sie will, ein Bittererde-Silicat treten kann. Dass aber Pflanzen aus der Granitzeit anders organisirt waren, als die der Jetztzeit, versteht sich von selbst und waren sie anders, so waren natürlich auch ihre Ausscheidungen anders als heute.

Übrigens scheiden viele Pflanzen heute noch vorzugsweise Kieselerde in den Fruchtschalen, Samenhülsen aus.

Was die "Ausscheidungen" betrifft, so erinnere ich an die verschiedensten Minerale in den Ammonitenkammern, welche dort und nur dort vorkommen. Sind sie von den Ammoniten ausgeschieden: Gewiss nicht. Es ist also das Wort "Ausscheidung" cum grano salis zu verstehen. Das Mineral liegt da: Welches der Zusammenhang mit der Pflanze ist, ist noch nicht — aber dass ein Zusammenhang besteht, ist sestzelle von Assenbelchen vorkommt, als Gegenbeweis dagegen dienen, dass kein Pflanzenkelch da ist. Ist die Pflanze einmal sestzellt, so sehe die Wissenschaft eben, wie sie die Tatsache erklären kann.

Freilich bei uns fängt man nicht mit dem Auge an, sondern mit der Rechnung. Statt zu sehen, zu betrachten, zu versuchen, macht man sich auf seinem beschränkten Wissen die Rechnung fertig. Wenn es nun aber doch so ist? Wenn eine unbefangene nur halbwegs sorgfältige Beobachtung die Tatsache bestätigt, was dann?

Der scharssinnige Arayo (und es sind nicht einmal ale Leute, welche absprechende Behauptungen ausstellen, scharssinnig) bewies vor den Augen und Ohren von ganz Frankreich, dass eine Eisenbahn unmöglich seie. Es hat Jahrhunderte angestanden, bis gegen die Behauptungen aller Fachgelehrten die Versteinerungen als Tier-Reste aneerkannt wurden.

Die seinen Linien im Granit mit schwarzen Punkten gezogen, kann man unmöglich auf blossen Crystallen ersklären, sie können also nicht blos die Peripherie eines Misnerals andeuten. Über auch zufällige Linien sind sie nicht. Es herrscht ein Gesetz darin und dieses Gesetz ist die Sorm der Pflanze: nur die einzelnen Zellen haben die Sorm des Crystalls, sind aber keine vollkommenen Crystalle.

Erst am Schlusse der Arbeit, gestattete ich mir einen Blick auf die Pflanzenarten zu thun.

Ich fasse die äussere Structur des Gesteins ins Auge, welche durch die Pflanze, auf welcher es sich zusammensetzt, bedingt ist.

Insbesondere zwei geschliffene Granite von Kullgren Uddevalla in Schweden ("Granit of slera sorter", wie er im Zandel heisst) machen mich darauf aufmerksam, dass die Pslanzensorm des Granits auch die von Slechten sein könnte. Es sind kurze Kelchzellen, welche senkrecht oder neben einander stehend, das Gestein bilden (Cladonia?).

Erst im Gneis sindet sich horizontale Layerung des Gesteins bedingt durch lange Pflanzen, welche nun mehr den See-Algen ähnlich sind.

Ich ziehe auf der Gesteins-Structur der Granit-Pflanze den Schluss, dass die Erdoberfläche zur Granitzeit nicht unter Wasser, sondern erst von Dampf umgeben war. Die Pflanzen des Granits wären dann Landpflanzen. Im Wasser würden die Pflanzen-Schichten sosort in horizontalen Layern sich angesetzt haben.


Die Flechten scheinen mir überhaupt die erste Pflanzenform zu sein, welche unmittelbar aus Mineralsubstanzentstehen.


Erst im Gneis-Alter der Erde sinden sich die ächten Wasserpflanzen, in Wasser abyelagerte Pflanzen.

Mit der Structur der Pflanzen hängt die Form der heutigen Gebirge (Pflanzenberge) zusammen.


Man sieht, wie schwer es ist, von angewöhnten hergebrachten Vorstellungen sich loßumachen und mit unparteiischen Augen zu sehen.

1: Tafel I







3: **C**afel 3




4: **T**afel 4




5: **Tafel** 5







7: **C**afel 7




8: **T**afel 8







10: **T**afel 10




11: Tafel II




12: **T**afel 12




13: **T**afel 13




14: **Tafel 14**



15: **Tafel 15**



16: **T**afel I6





17: **T**afel 17





19: **T**afel 19







21: **Tafel 2**I




22: **Tafel 22**



23: **T**afel **23**





25: **Tafel 25**

